

## ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ БАЗИСАХ

В теории приближений изучаются методы приближения функций более простыми, хорошо изученными функциями. При этом исследуемая приближаемая функция может быть задана как в аналитическом, так и дискретном виде (в виде экспериментальной таблицы).

Пусть дана некоторая функция  $f(x)$  на отрезке  $x \in [a, b]$ , которая является довольно сложной для исследования. Требуется заменить эту функцию некоторой простой, но хорошо исследуемой функцией (например, многочленом). Для этого с помощью  $f(x)$  строят таблицу (ее называют *сеточной* функцией),

$x_i$	$x_0$	$x_1$	$\dots$	$x_n$
$y_i$	$y_0$	$y_1$	$\dots$	$y_n$

(3.1)

которую можно заменить (сгладить) простой функцией с контролируемой погрешностью.

Рассмотрим два подхода к такой замене:

1. Пусть приближенная функция является многочленом  $n$ -й степени,

$$\bar{f}(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad (3.2)$$

где  $n+1$  - число узлов в таблице (3.1), с неизвестными параметрами  $a_i$ ,  $i = \overline{0, n}$ , так приближает сеточную функцию  $f(x)$ , что

$$y_i = \bar{f}(x_i), \quad i = \overline{0, n}. \quad (3.3)$$

В этом случае говорят, что функция  $\bar{f}(x)$  *интерполирует* сеточную функцию (3.1), а сама задача приближения называется *задачей интерполяции*. Точки  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$  называют *узлами интерполяции*, а условие (3.3) – *условием интерполяции*. Появляется возможность вычислить значения  $\bar{f}(x)$  не только в узлах интерполяции, но и между ними в точках  $\xi \in (x_{i-1}, x_i)$ ,  $i = \overline{1, n}$ , причем  $\bar{f}(\xi) \approx f(\xi)$ .

2. При большом количестве точек  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$  интерполяция требует большой гладкости (по  $n$ -й производной), что практически выполнить невозможно. Поэтому сглаживание сеточной функции (3.1) осуществляют путем минимизации некоторого функционала, построенного с помощью (3.1) и многочлена (3.2) степени  $m$ , например, квадратичного функционала:

$$S(a_0, a_1, \dots, a_m) = \sum_{i=0}^n [y_i - \bar{f}(x_i)]^2, \quad m \ll n. \quad (3.4)$$

Процедуру сглаживания в этом случае называют *аппроксимацией* заданной функции функцией (3.2), в частности, аппроксимацию с использованием функционала (3.4) называют аппроксимацией с помощью *точечного метода наименьших квадратов*.

Если коэффициенты сглаживающей функции (3.2) определяются путем минимизации функционала

$$S(a_0, a_1, \dots, a_m) = \int_a^b [f(x) - \bar{f}(x)]^2 dx,$$

сглаживание называют *интегральным методом наименьших квадратов*.

Если в качестве сглаживаемой функции задана экспериментальная таблица (3.1), то в методах сглаживания практически ничего не изменяется. Изменяются методы оценки погрешности сглаживания.

### 3.2. Задача интерполяции

Пусть на отрезке  $x \in [a, b]$  задана функция  $f(x)$ , с помощью которой построена сеточная функция (3.1) или задана экспериментальная таблица (3.1).

При сглаживании функции (или экспериментальной таблицы) с помощью интерполяции в соответствии с условием интерполяции (3.3) значение интерполирующей функции и значение заданной функции в узлах сетки должны быть одинаковыми, следовательно, погрешность интерполяции в узлах  $x_i$ ,  $i = \overline{0, n}$  равна нулю (рис. 3.1).




Рис. 3.1. К задаче интерполяции

Задача интерполяции имеет не единственное решение, но в одном случае, когда интерполирующей функцией является многочлен  $n$ -й степени ( $n+1$  - число узлов интерполяции) вида (3.2) интерполяция имеет единственное решение, т.е. коэффициенты  $a_0, \dots, a_n$  определяются единственным образом.

Действительно, используя таблицу (3.1), составим СЛАУ относительно неизвестных коэффициентов  $a_0, \dots, a_n$ :

$$\begin{cases} i=0 & a_0 + a_1 x_0 + \dots + a_n x_0^n = y_0 \\ i=1 & a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_1^n = y_1 \\ \dots & \dots \\ i=n & a_0 + a_1 x_n + \dots + a_n x_n^n = y_n. \end{cases} \quad (3.6)$$

Неоднородная СЛАУ (3.6) имеет единственное решение для коэффициентов

$a_0, \dots, a_n$ , т.к. определитель матрицы этой СЛАУ не равен нулю:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdot & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdot & x_1^n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & x_n & \cdot & x_n^n \end{pmatrix} \neq 0,$$

поскольку все значения узлов интерполяции различны между собой и ни одна из строк не является линейной комбинацией других строк. Таким образом, *задача многочленной интерполяции имеет единственное решение*, т.к. коэффициенты  $a_0, \dots, a_n$  могут быть выбраны единственным образом.

### 3.2.1. Интерполяционный многочлен Лагранжа

Для многочленной интерполяции можно не решать СЛАУ (3.6), а составить многочлен (3.2) следующим образом :

запишем систему многочленов  $n$ -й степени

$$l_0 = \frac{(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\dots(x_0-x_n)} = \begin{cases} 1, & x = x_0 \\ 0, & x = x_i, \quad i = \overline{1, n} \end{cases}$$

$$l_1 = \frac{(x-x_0)(x-x_2)\dots(x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)\dots(x_1-x_n)} = \begin{cases} 1, & x = x_1 \\ 0, & x = x_i, \quad i = \overline{0, 2, n} \end{cases}$$

.....

$$l_n = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)(x_n-x_1)\dots(x_n-x_{n-1})} = \begin{cases} 1, & x = x_n \\ 0, & x = x_i, \quad i = \overline{0, n-1}. \end{cases}$$

Составим линейную комбинацию этих многочленов (их количество равно  $n+1$ ) с коэффициентами линейной комбинации, равными значениям  $y_i$  сеточной функции (3.1), получим многочлен  $n$ -й степени:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}. \quad (3.7)$$

Многочлен (3.7) называют *интерполяционным многочленом Лагранжа  $n$ -й степени*, т.к. он, во-первых, удовлетворяет условию интерполяции

$$L_n(x_i) = y_i, \quad i = \overline{0, n},$$

и, во-вторых, имеет  $n$ -ю степень.

Интерполяционный многочлен Лагранжа обладает тем недостатком, что в случае, когда добавляются новые узлы интерполяции в таблице (3.1), все слагаемые в (3.7)

необходимо пересчитывать.

Выпишем наиболее употребляемые многочлены  $L_1(x)$  и  $L_2(x)$ :

1) Для таблицы с двумя узлами интерполяции  $x_i, x_{i+1}$

$x_i$	$x_{i+1}$
$y_i$	$y_{i+1}$

$$L_1(x) = y_i \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} + y_{i+1} \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i};$$

2) Для таблицы с тремя узлами интерполяции  $x_{i-1}, x_i, x_{i+1}$

$x_{i-1}$	$x_i$	$x_{i+1}$
$y_{i-1}$	$y_i$	$y_{i+1}$

$$L_2(x) = y_{i-1} \frac{(x - x_i)(x - x_{i+1})}{(x_{i-1} - x_i)(x_{i-1} - x_{i+1})} + y_i \frac{(x - x_{i-1})(x - x_{i+1})}{(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})} + y_{i+1} \frac{(x - x_{i-1})(x - x_i)}{(x_{i+1} - x_{i-1})(x_{i+1} - x_i)}.$$

### 3.2.2. Интерполяционный многочлен Ньютона

В вычислительной математике аналогом понятия производной является понятие *разделенной разности*.

Разделенной разностью сеточной функции (3.1) *нулевого порядка* в узлах  $x_i, i = \overline{0, n}$  называются значения этой функции в этих узлах  $f(x_i) = y_i, i = \overline{0, n}$ .

**Определение 1.** Разделенной разностью функции (3.1) *первого порядка* в узлах  $x_i, i = \overline{0, n-1}$  называют отношение

$$f(x_i, x_{i+1}) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}, \quad i = \overline{0, n-1}$$

**Определение 2.** Разделенной разностью функции (3.1) *второго порядка* в узлах  $x_i, i = \overline{0, n-2}$  называют отношение

$$\begin{aligned} f(x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) &= \frac{f(x_{i+1}, x_{i+2}) - f(x_i, x_{i+1})}{x_{i+2} - x_i} = \frac{\frac{f(x_{i+2}) - f(x_{i+1})}{x_{i+2} - x_{i+1}} - \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}}{x_{i+2} - x_i} = \\ &= \frac{\frac{y_{i+2} - y_{i+1}}{x_{i+2} - x_{i+1}} - \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}}{x_{i+2} - x_i}, \quad i = \overline{0, n-2}. \end{aligned}$$

**Определение 3.** Разделенной разностью функции (3.1) *n-го порядка* в узле  $x_0$  называют отношение

$$f(x_0, x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, \dots, x_n) - f(x_0, \dots, x_{n-1})}{x_n - x_0}.$$

С использованием разделенных разностей многочлен Ньютона записывается в форме:

$$N_n(x) = f(x_0) + f(x_0, x_1)(x - x_0) + f(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \dots + f(x_0, x_1, \dots, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}). \quad (3.8)$$

Таким образом, при добавлении нового узла интерполяции (повышении степени интерполяционного полинома) в многочлене Ньютона появляется лишь одно новое слагаемое, в то время как все предыдущие остаются без изменений.

### 3.2.3. Погрешность многочленной интерполяции

Ясно, что в узлах интерполяции погрешность интерполяционного многочлена  $L_n(x)$  или  $N_n(x)$  равна нулю:

$$\begin{cases} L_n(x_i) - y_i \\ N_n(x_i) - y_i \end{cases} = 0, \quad i = \overline{0, n}.$$

Погрешность  $L_n(x) - f(x)$ , представляющая собой разность между значением интерполяционного многочлена  $L_n(x)$  и значением функции  $f(x)$  в точке  $x$ , не совпадающей с узлом интерполяции имеет вид:

$$f(\bar{x}) - L_n(\bar{x}) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (\bar{x} - x_0)(\bar{x} - x_1) \dots (\bar{x} - x_n), \quad \xi \in (x_0, x_n) \equiv (a, b). \quad (3.9)$$

$\bar{x}$  - точка, в которой ищется погрешность (не совпадает с узлами интерполяции).

Поскольку точка  $\xi \in (a, b)$  неизвестна, то вместо погрешности (3.9) вводится верхняя оценка погрешности в виде

$$|f(\bar{x}) - L_n(\bar{x})| \leq \frac{\max_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!} |(\bar{x} - x_0)(\bar{x} - x_1) \dots (\bar{x} - x_n)|, \quad (3.10)$$

которая и используется на практике.

**Пример 3.1.** Построить интерполяционный полином Лагранжа, совпадающий с функцией  $f(x) = 3^x$ ,  $x \in [-1, 1]$  в точках  $x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = 1$ . Вычислить значение сеточной функции и оценить погрешность многочленной интерполяции в точке  $x^* = 0,5$ .

Р е ш е н и е.

Составим сеточную функцию и занесем ее в таблицу. Поскольку  $n = 2$ , то необходимо построить интерполяционные многочлены  $L_2(x)$  и  $N_2(x)$ .

$x_i$	$x_0 = -1$	$x_1 = 0$	$x_2 = 1$
$y_i$	$y_0 = 1/3$	$y_1 = 1$	$y_2 = 3$

$$L_2(x) = y_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + y_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + y_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} =$$

$$= \frac{2}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + 1. \text{ Проверим условия интерполяции } L_2(-1) = 1/3; L_2(0) = 1; L_2(1) = 3.$$

Значение сеточной функции в точке  $x^* = 0,5$  вычислим по интерполяционному многочлену  $y(0,5) \approx L_2(0,5) = 1,8333$ .

Верхнюю оценку погрешности интерполяционного многочлена определим в соответствии с выражением (3.10)

$$|f(x^*) - L_2(x^*)| \leq \frac{\max_{x \in [-1,1]} |f'''(x)|}{3!} |(x^* - x_0)(x^* - x_1)(x^* - x_2)|;$$

$$\max_{x \in [-1,1]} |f'''(x)| = \max_{x \in [-1,1]} |3^x \cdot \ln^3 3| = 3^1 \cdot \ln^3 3 = 3,978;$$

$$\left| 3^{0,5} - \left( \frac{2}{3} \cdot 0,25 + \frac{4}{3} \cdot 0,5 + 1 \right) \right| \leq \frac{3,978}{6} |(0,5+1)(0,5-0)(0,5-1)| = 0,249.$$

Поскольку функция  $f(x) = 3^x$  известна, то можно вычислить точное значение абсолютной погрешности в точке  $x^* = 0,5$

$$\left| 3^{x^*} - L_2(x^*) \right| = \left| 3^{0,5} - \left( \frac{2}{3} \cdot 0,25 + \frac{4}{3} \cdot 0,5 + 1 \right) \right| = 0,1012,$$

т.е. верхняя оценка погрешности примерно в 2,5 раза превышает абсолютную погрешность в точке  $x^* = 0,5$ .

**Пример 3.2.** Для заданной таблицы

$x_i$	$x_0 = -1$	$x_1 = 0$	$x_2 = 2$
$y_i$	$y_0 = 1/3$	$y_1 = 1$	$y_2 = 9$

составить интерполяционный многочлен Ньютона.

Р е ш е н и е.

Таблица задана с неравномерным шагом, поэтому для решения задачи воспользуемся многочленом Ньютона с разделенными разностями (формула (3.8))

$$N_2(x) = f(x_0) + f(x_0, x_1)(x - x_0) + f(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1),$$

где  $f(x_0) = y_0 = 1/3$ ;

$$f(x_0, x_1) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{1 - 1/3}{0 + 1} = \frac{2}{3};$$

$$f(x_0, x_1, x_2) = \frac{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} = \frac{\frac{9 - 1}{2 - 0} - \frac{1 - 1/3}{0 + 1}}{2 + 1} = \frac{10}{9}.$$

Таким образом,  $N_2(x) = \frac{10}{9}x^2 + \frac{16}{9}x + 1$ .

Условия интерполяции соблюдены:  $N_2(-1) = 1/3$ ;  $N_2(0) = 1$ ;  $N_2(2) = 9$ .



### 3.2.4. Сплайн-интерполяция

Интерполяция, использующая сразу все  $n$  узлов таблицы (3.1), называется *глобальной интерполяцией*.

Начиная с  $n \geq 7$  глобальная многочленная интерполяция становится неустойчивой в том смысле, что погрешности возрастают, т.к. записанный интерполяционный многочлен требует гладкости по производным 7-го и выше порядка (рис. 3.3).

Поэтому обычную многочленную интерполяцию осуществляют максимум по 3-4 узлам (для 3-х узлов - 2-ой степени, 4-х узлов - 3-й степени). Интерполяцию по нескольким узлам таблицы (3.1), называют *локальной*.




Рис. 3.3. Неустойчивость глобальной многочленной интерполяции при  $n \geq 7$




Рис. 3.4. Локальная интерполяция по каждому трем узлам

Однако, такая локальная интерполяция с помощью  $L_n$  или  $N_n$  страдает тем недостатком, что интерполирующая функция в узлах стыковки многочлена имеет непрерывность только нулевого порядка, т.е. интерполяционный многочлен принадлежит классу функций  $C^0$  (см. рис. 3.4 для  $L_2, N_2$  в узле  $x^*$ ).

От этих недостатков свободна сплайн-интерполяция, которая требует непрерывности в узлах стыковки локальных многочленов по производным соответственно порядка один, два, и т.д.

**Определение.** сплайном - степени  $m$  дефекта  $r$  называется  $(m-r)$  раз непрерывно дифференцируемая функция, которая на каждом отрезке  $[x_i - x_{i-1}]$ ,  $i = \overline{1, n}$ , представляет собой многочлен степени  $m$ .

Наиболее распространенными в науке и технике являются сплайны 3-й степени дефекта один, т.е.

$$\left. \begin{array}{l} m = 3 \\ r = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow m - r = 3 - 1 = 2,$$

т.е. дважды непрерывно дифференцируемый многочлен 3-й степени на каждом отрезке  $[x_i, x_{i+1}]$ ,  $i = \overline{1, n}$ . Сплайны, удовлетворяющие условию интерполяции, называются *интерполяционными*.

Основным достоинством интерполяционного кубического сплайна дефекта один является следующее: этот сплайн обладает минимумом интегральной кривизны на всем заданном отрезке  $[a, b]$  по сравнению с другими интерполяционными функциями  $\bar{f}(x)$ , т.е.

$$\int_a^b [S''(x)]^2 dx \leq \int_a^b [\bar{f}''(x)]^2 dx.$$

Геометрически это означает, что если тяжелую упругую нить повесить на ряд гвоздей, то она примет форму кубического сплайна дефекта 1, приведенную на рис. 3.5.




Рис. 3.5. Тяжелая упругая нить, геометрически представляющая собой кубические сплайны дефекта один

Выведем интерполяционные кубические сплайны  $S_i(x)$ ,  $i = \overline{1, n}$  дефекта один в соответствии с таблицей (3.1). Кубический сплайн  $S(x)$  на отрезке  $x \in [x_{i-1}, x_i]$  имеет четыре неизвестных коэффициента. Количество отрезков  $[x_{i-1}, x_i]$  в соответствии с таблицей (3.1) равно  $n$ . Для определения  $4 \times n$  коэффициентов имеются следующие условия в узлах интерполяции:

$$\text{условие интерполяции} \quad S(x_i) = y_i, \quad i = \overline{0, n};$$

$$\text{непрерывность сплайнов} \quad S(x_i - 0) = S(x_i + 0), \quad i = \overline{1, n-1};$$

$$\text{непрерывность производных 1-го порядка} \quad S'(x_i - 0) = S'(x_i + 0), \quad i = \overline{1, n-1};$$

$$\text{непрерывность производных 2-го порядка} \quad S''(x_i - 0) = S''(x_i + 0), \quad i = \overline{1, n-1}.$$

Таким образом, всего имеется  $(n+1) + 3(n-1) = 4n-2$  условий. В качестве двух недостающих условий задают значения производных 1-го или 2-го порядка в узлах  $x_0$  и  $x_n$ . Для вывода используем значения  $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$ . В этом случае сплайн

называется *естественным*.

Пусть  $S''(x) = q(x)$ . На отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$  рассмотрим поведение функции  $q(x)$  (см. рис.3.6).




Рис. 3.6. Поведение функций  $S''(x)$  на элементарных отрезках

Поскольку сплайн является многочленом 3-й степени, то на каждом отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$  2-я производная будет линейна. Найдем ее с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа 1-й степени  $L_1(x)$ :

$$q(x) = q_{i-1} \frac{x - x_i}{x_{i-1} - x_i} + q_i \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}. \quad (3.11)$$

Выражение (3.11) уже удовлетворяет условиям непрерывности производных 2-го порядка. Действительно, подставим в (3.11)  $x = x_i - 0$ , получим  $q(x_i - 0) = q_i$ . Затем, выписывая выражение (3.11) для отрезка  $x \in [x_i, x_{i+1}]$

$$q(x) = q_i \frac{x_{i+1} - x}{h_{i+1}} + q_{i+1} \frac{x - x_i}{h_{i+1}}, \quad x \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = \overline{1, n-1}$$

и подставляя в него  $x_i + 0$  вместо  $x$ , получим  $q(x_i + 0) = q_i$ , что и требовалось показать.

Для нахождения сплайна проинтегрируем дважды выражение (3.11), получим

$$S(x) = q_{i-1} \frac{(x_i - x)^3}{6h_i} + q_i \frac{(x - x_{i-1})^3}{6h_i} + C_1 x + C_2, \quad (3.12)$$

где  $C_1$  и  $C_2$  найдем из удовлетворения значений сплайна (3.12) в узлах  $x_{i-1}$ ,  $x_i$  условиям интерполяции

$$\begin{cases} S(x_{i-1}) = y_{i-1} = q_{i-1} \frac{(x_i - x_{i-1})^3}{6h_i} + q_i \frac{(x_{i-1} - x_{i-1})^3}{6h_i} + C_1 x_{i-1} + C_2 \\ S(x_i) = y_i = q_{i-1} \frac{(x_i - x_i)^3}{6h_i} + q_i \frac{(x_i - x_{i-1})^3}{6h_i} + C_1 x_i + C_2. \end{cases}$$

Решая эту СЛАУ относительно  $C_1$ ,  $C_2$  и подставляя их в (3.12), найдем следующее

выражение для сплайна степени 3 дефекта 1:

$$S(x) = q_{i-1} \frac{(x_i - x)^3}{6h_i} + q_i \frac{(x - x_{i-1})^3}{6h_i} + \left( \frac{y_{i-1}}{h_i} - q_{i-1} \frac{h_i}{6} \right) (x_i - x) + \left( \frac{y_i}{h_i} - q_i \frac{h_i}{6} \right) (x - x_{i-1}), \quad x \in [x_{i-1}, x_i]. \quad (3.13)$$

В этом сплайне узловые значения для вторых производных  $q_i$  пока неизвестны.

Будем искать их из условий непрерывности первых производных в узлах  $x_i$ .

Для нахождения производной  $S'(x_i + 0)$  запишем (3.13) для отрезка  $[x_i, x_{i+1}]$

$$S(x) = q_i \frac{(x_{i+1} - x)^3}{6h_{i+1}} + q_{i+1} \frac{(x - x_i)^3}{6h_{i+1}} + \left( \frac{y_i}{h_{i+1}} - q_i \frac{h_{i+1}}{6} \right) (x_{i+1} - x) + \left( \frac{y_{i+1}}{h_{i+1}} - q_{i+1} \frac{h_{i+1}}{6} \right) (x - x_i), \quad x \in [x_i, x_{i+1}]. \quad (3.14)$$

Вычисляя от (3.13) и (3.14) производные первого порядка и подставляя в них значение  $x = x_i$ , получим

$$S'(x_i - 0) = q_{i-1} \frac{h_i}{6} + q_i \frac{h_i}{3} + \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i},$$

$$S'(x_i + 0) = -q_i \frac{h_{i+1}}{3} - q_{i+1} \frac{h_{i+1}}{6} + \frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}}.$$

Приравняем эти выражения в соответствии с условиями непрерывности первых производных в узлах интерполяции  $x_i$ , получим

$$q_{i-1} \frac{h_i}{6} + q_i \frac{h_i + h_{i+1}}{3} + q_{i+1} \frac{h_{i+1}}{6} = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i}, \quad i = \overline{1, n-1}; \quad (3.15)$$

$$q_0 = q_n = 0. \quad (3.16)$$

Система (3.15) с заданными краевыми условиями (3.16) – СЛАУ относительно  $q_i = S''(x_i)$ ,  $i = \overline{1, n-1}$  имеет трехдиагональную матрицу и, следовательно, ее можно решать методом прогонки. Подставляя найденные  $q_i$ ,  $i = \overline{0, n}$  в (3.13), получим кубические сплайны дефекта один на каждом отрезке  $x \in [x_{i-1}, x_i]$ ,  $i = \overline{1, n}$ .

Таким образом, определяющими выражениями для определения кубических сплайнов дефекта один являются выражения (3.13), (3.15), (3.16).

**Пример 3.3.** Для заданной таблицы с  $h = x_i - x_{i-1} = 1 = \text{const}$  построить интерполяционный кубический сплайн дефекта один, выписав соответствующие уравнения на каждом отрезке  $x \in [x_{i-1}, x_i]$ ,  $i = \overline{1, 4}$ . Проверить непрерывность сплайна и

его производных до второго порядка включительно в узле  $x^* = 2$ .

$i$	0	1	2	3	4
$x_i$	$x_0 = 1$	$x_1 = 2$	$x_2 = 3$	$x_3 = 4$	$x_4 = 5$
$y_i$	$y_0 = 1$	$y_1 = 3$	$y_2 = 6$	$y_3 = 9$	$y_4 = 21$

$q_i$	0	18/7	-30/7	102/7	0
-------	---	------	-------	-------	---

**Р е ш е н и е.**

Под заданной таблицей сформируем дополнительную строку для вторых производных  $S''(x_i) \equiv q_i$  сплайнов, которая заполняется по мере их вычисления (сразу можно вписать в нее  $q_0 = q_4 = 0$ ).

Для узлов  $x_1 = 2; x_2 = 3; x_3 = 4$  с учетом  $q_0 = q_4 = 0$  составляется СЛАУ (3.15) относительно неизвестных  $q_1, q_2, q_3$

$$\begin{aligned} i=1: & \begin{cases} \frac{2}{3}q_1 + \frac{1}{6}q_2 = \frac{y_2 - y_1}{1} - \frac{y_1 - y_0}{1} = 1 \\ \frac{1}{6}q_1 + \frac{2}{3}q_2 + \frac{1}{6}q_3 = \frac{y_3 - y_2}{1} - \frac{y_2 - y_1}{1} = 0 \end{cases} \\ i=2: & \begin{cases} \frac{1}{6}q_1 + \frac{2}{3}q_2 + \frac{1}{6}q_3 = \frac{y_3 - y_2}{1} - \frac{y_2 - y_1}{1} = 0 \\ \frac{1}{6}q_2 + \frac{2}{3}q_3 = \frac{y_4 - y_3}{1} - \frac{y_3 - y_2}{1} = 9. \end{cases} \end{aligned}$$

Вычисляются прогоночные коэффициенты по формулам

$$A_i = \frac{-c_i}{b_i + a_i A_{i-1}}; \quad B_i = \frac{d_i - a_i B_{i-1}}{b_i + a_i A_{i-1}}, \quad i = 1, 2, 3;$$

$$a_1 = c_3 = 0, \quad A_1 = -\frac{1}{4}; B_1 = \frac{3}{2}; A_2 = -\frac{4}{15}; B_2 = -\frac{2}{5}; A_3 = 0; B_3 = \frac{102}{7} \quad \text{и} \quad \text{значения}$$

$$q_i = A_i q_{i+1} + B_i, \quad i = 3, 2, 1:$$

$$q_3 = A_3 q_4 + B_3 = B_3 = 102/7;$$

$$q_2 = A_2 q_3 + B_2 = -\frac{4}{15} \cdot \frac{102}{7} - \frac{2}{5} = -\frac{30}{7};$$

$$q_1 = A_1 q_2 + B_1 = -\frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{30}{7}\right) + \frac{3}{2} = \frac{18}{7}.$$

Заносим эти значения в дополнительную строку таблицы и для каждого из четырех интервалов выписываем уравнения сплайна (3.13).

$$i = 1 : S_I(x) = q_0 \frac{(x_1 - x)^3}{6 \cdot 1} + q_1 \frac{(x - x_0)^3}{6 \cdot 1} + \left( \frac{y_0}{1} - q_0 \cdot \frac{1}{6} \right) (x_1 - x) + \\ + \left( \frac{y_1}{1} - q_1 \cdot \frac{1}{6} \right) (x - x_0) = \frac{18}{42} (x - 1)^3 + (2 - x) + \frac{108}{42} (x - 1), \quad x \in [1; 2];$$

$$i = 2 : S_{II}(x) = q_1 \frac{(x_2 - x)^3}{6 \cdot 1} + q_2 \frac{(x - x_1)^3}{6 \cdot 1} + \left( \frac{y_1}{1} - q_1 \cdot \frac{1}{6} \right) (x_2 - x) + \\ + \left( \frac{y_2}{1} - q_2 \cdot \frac{1}{6} \right) (x - x_1) = \frac{18}{42} (3 - x)^3 + \left( -\frac{30}{42} \right) (x - 2)^3 + \\ + \frac{108}{42} (3 - x) + \frac{282}{42} (x - 2), \quad x \in [2; 3];$$

$$i = 3 : S_{III}(x) = q_2 \frac{(x_3 - x)^3}{6 \cdot 1} + q_3 \frac{(x - x_2)^3}{6 \cdot 1} + \left( \frac{y_2}{1} - q_2 \cdot \frac{1}{6} \right) (x_3 - x) + \\ + \left( \frac{y_3}{1} - q_3 \cdot \frac{1}{6} \right) (x - x_2) = -\frac{30}{42} (4 - x)^3 + \frac{102}{42} (x - 3)^3 + \frac{282}{42} (4 - x) + \\ + \frac{276}{42} (x - 3), \quad x \in [3; 4];$$

$$i = 4 : S_{IV}(x) = q_3 \frac{(x_4 - x)^3}{6 \cdot 1} + q_4 \frac{(x - x_3)^3}{6 \cdot 1} + \left( \frac{y_3}{1} - q_3 \cdot \frac{1}{6} \right) (x_4 - x) + \\ + \left( \frac{y_4}{1} - q_4 \cdot \frac{1}{6} \right) (x - x_3) = \frac{102}{42} (5 - x)^3 + \frac{276}{42} (5 - x) + 21(x - 4), \quad x \in [4, 5].$$

Проверим правильность построения сплайна для узла  $x^* = 2$ . К данному узлу примыкают кривые  $S_1(x)$  и  $S_2(x)$ .

$$S_1(2 - 0) = 3; \quad S_{II}(2 + 0) = 3;$$

$$S_1'(2 - 0) = \frac{120}{42}; \quad S_{II}'(2 + 0) = \frac{120}{42};$$

$$S_1''(2 - 0) = \frac{108}{42}; \quad S_{II}''(2 + 0) = \frac{108}{42}.$$