

Сглаживающая аппроксимация

При наличии значительного числа экспериментальных точек обработка данных с помощью полиномиальной интерполяции не имеет смысла из-за наличия погрешностей в измерениях. Способы локальной интерполяции, например, с помощью сплайнов, также не дают приемлемых результатов.

В этом случае дискретно заданную функцию сглаживают в среднем, чаще всего многочленом, коэффициенты которого находят с помощью минимизации отклонения сглаживающей функции от заданных точек в *некотором среднеинтегральном смысле* (рис 3.7).

Одним из таких методов является *метод наименьших квадратов* (МНК). Суть его заключается в следующем.

Пусть дана экспериментальная таблица (3.1).

x_i	x_0	x_1	\dots	x_n
y_i	y_0	y_1	\dots	y_n

Поставим ей в соответствие функцию вида

$$F(x, a_0, a_1, \dots, a_m) = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x) + \dots + a_m \varphi_m(x), \quad (3.28)$$

где $\varphi_j(x)$, $j = \overline{1, m}$ - базисные функции, a_j - коэффициенты, подлежащие определению. В частности, если в качестве базисных функций использовать степенные $\varphi_j(x) = x^j$, задача сводится к поиску полинома степени m ($m < n$), приближающего исходную таблицу:
 $F(x, a_0, a_1, \dots, a_m) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m$.

С целью определения коэффициентов a_j будем искать такую функцию $F(x, a_0, a_1, \dots, a_m)$, отклонение значений которой от заданных таблицей (3.1) значений y_i , $i = \overline{0, n}$ минимально в некотором среднеинтегральном смысле.


$$S(a_0, a_1, \dots, a_m) = \sum_{i=0}^n [F(x_i, a_0, a_1, \dots, a_m) - y_i]^2, \quad (3.29)$$

Необходимым условием минимума функции многих переменных является равенство нулю ее частных производных первого порядка по независимым переменным. В функционале (3.29) такими независимыми переменными являются коэффициенты a_0, a_1, \dots, a_m разложения (3.28), которые до их определения являются не постоянными, а варьируемыми переменными.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial S}{\partial a_0} = 2 \sum_{i=0}^n [F(x_i, a_0, a_1, ..., a_m) - y_i] \phi_0(x_i) = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial a_1} = 2 \sum_{i=0}^n [F(x_i, a_0, a_1, ..., a_m) - y_i] \phi_1(x_i) = 0 \\ \\ \frac{\partial S}{\partial a_m} = 2 \sum_{i=0}^n [F(x_i, a_0, a_1, ..., a_m) - y_i] \phi_m(x_i) = 0. \end{array} \right. \quad (3.30)$$

(3.30) представляет собой систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) порядка

$m+1$ относительно неизвестных a_0, a_1, \dots, a_m . Ее матрица является симметрической и положительно определенной. Решения a_0, a_1, \dots, a_m доставляют *минимум* функционалу (3.29).

Введем в рассмотрение следующие объекты:

- матрицу Φ размерности $(n+1) \times (m+1)$, содержащую значения базисных функций

в узлах таблицы $\varphi_j(x_i)$,
$$\Phi = \begin{pmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) & \dots & \varphi_m(x_0) \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & \dots & \varphi_m(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \varphi_0(x_n) & \varphi_1(x_n) & \dots & \varphi_m(x_n) \end{pmatrix},$$

- вектор наблюдения y размерности $n+1$, содержащий табличные значения y_i ,

$$y = (y_0, y_1, \dots, y_n)^T,$$

- искомый вектор коэффициентов a размерности $m+1$, $a = (a_0, a_1, \dots, a_m)^T$.

Тогда СЛАУ (3.30) может быть представлена в виде

$$\Lambda a = \beta, \tag{3.31}$$

где $\Lambda = \Phi^T \Phi$, $\beta = \Phi^T y$.

Решение данной СЛАУ может быть осуществлено любым из известных методов линейной алгебры. Подставляя найденные в результате решения СЛАУ значения a_0, a_1, \dots, a_m в (3.28), получаем непрерывную функцию $F(x)$, наилучшим образом приближающую дискретную функцию (3.1) в среднеквадратическом смысле.

Качество такого приближения может быть оценено, например, величиной среднеквадратичного отклонения $\delta = \left(\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (F(x_i) - y_i)^2 \right)^{1/2}$.

В интегральном методе наименьших квадратов рассматривается интегрируемая с квадратом функция $y = f(x)$, $x \in [a, b]$, которая трудна для исследования (например, трудно вычислить производные).

Будем аппроксимировать эту функцию некоторой функцией $F(x)$ с минимизацией заштрихованной площади (см. рис. 3.8), например, с помощью многочлена




Рис. 3.8. К интегральному методу наименьших квадратов

$$F(x, a_0, a_1, \dots, a_m) = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x) + \dots + a_m \varphi_m(x),$$

где a_0, a_1, \dots, a_m находят из условия минимизации следующего квадратичного функционала:

$$S(a_0, a_1, \dots, a_m) = \int_a^b [F(x, a_0, a_1, \dots, a_m) - f(x)]^2 dx.$$

Необходимые условия минимума данного функционала имеют вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a_0} = 2 \int_a^b [F(x, a_0, \dots, a_m) - f(x)] \varphi_0(x) dx = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial a_1} = 2 \int_a^b [F(x, a_0, \dots, a_m) - f(x)] \varphi_1(x) dx = 0 \\ \dots \dots \dots \frac{\partial S}{\partial a_m} = 2 \int_a^b [F(x, a_0, \dots, a_m) - f(x)] \varphi_m(x) dx = 0, \end{cases}$$

Таким образом, задача сводится к решению следующей СЛАУ:

$$\Lambda a = \beta, \tag{3.32}$$

где Λ - матрица размерности $m+1 \times m+1$, элементами которой являются скалярные произведения базисных функций (скалярное произведение интегрируемых на отрезке

$[a, b]$ функций $p(x)$ и $q(x)$ определяется как $(p, q) = \int_a^b p(x)q(x)dx$),

$$\Lambda = \begin{pmatrix} (\varphi_0(x), \varphi_0(x)) & (\varphi_1(x), \varphi_0(x)) & \dots & (\varphi_m(x), \varphi_0(x)) \\ (\varphi_0(x), \varphi_1(x)) & (\varphi_1(x), \varphi_1(x)) & \dots & (\varphi_m(x), \varphi_1(x)) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\varphi_0(x), \varphi_m(x)) & (\varphi_1(x), \varphi_m(x)) & \dots & (\varphi_m(x), \varphi_m(x)) \end{pmatrix},$$

β - вектор размерности $m+1$ с элементами $\beta_j = \int_a^b f(x)\varphi_j(x)dx$, $j = \overline{1, m}$,

a - вектор искомых коэффициентов размерности $m+1$, $a = (a_0, a_1, \dots, a_m)^T$.

В нормальной СЛАУ (3.32) относительно коэффициентов a_0, a_1, \dots, a_m правые части могут не интегрироваться в силу сложности исследуемой функции $f(x)$. В этом случае правые части вычисляются с помощью методов численного интегрирования, которые рассматриваются ниже.

Пример 3.5. Точечным методом наименьших квадратов аппроксимировать заданную таблицу линейным и квадратичным полиномами.

x_i	2	3	4	5
y_i	7	5	8	7

Решение.

В случае линейного аппроксимационного полинома имеем $F(x, a_0, a_1) = a_0 + a_1x$, т.е. $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x$.

Матрица Φ принимает вид $\Phi = \begin{pmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) \\ \varphi_0(x_2) & \varphi_1(x_2) \\ \varphi_0(x_3) & \varphi_1(x_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$

Вектор наблюдений y выглядит следующим образом $y = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}.$

Составим систему уравнений (3.31) для рассматриваемого случая:

$$\Lambda = \Phi^T \Phi = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 14 \\ 14 & 54 \end{pmatrix}, \quad \beta = \Phi^T y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 96 \end{pmatrix}.$$

Решая систему $\Lambda a = \beta$, получаем вектор искомых коэффициентов $a = \begin{pmatrix} 5,7 \\ 0,3 \end{pmatrix}$.

Таким образом, искомый полином $F(x) = 5,7 + 0,3x$.

Оценим погрешность такой аппроксимации:

$$\delta = \left(\frac{1}{4} \sum_{i=0}^3 (F(x_i) - y_i)^2 \right)^{1/2} = 1,0368.$$

В случае квадратичного аппроксимационного полинома имеем $F(x, a_0, a_1, a_2) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, т.е. $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x$, $\varphi_2(x) = x^2$.

Матрица Φ принимает вид $\Phi = \begin{pmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) & \varphi_2(x_0) \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & \varphi_2(x_1) \\ \varphi_0(x_2) & \varphi_1(x_2) & \varphi_2(x_2) \\ \varphi_0(x_3) & \varphi_1(x_3) & \varphi_2(x_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \\ 1 & 5 & 25 \end{pmatrix}.$

Вектор наблюдений y остается без изменений $y = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}.$

Систему уравнений (3.31) для рассматриваемого случая выглядит следующим образом:

$$\Lambda = \Phi^T \Phi = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 9 & 16 & 25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \\ 1 & 5 & 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 14 & 54 \\ 14 & 54 & 224 \\ 54 & 224 & 978 \end{pmatrix},$$

$$\beta = \Phi^T y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 9 & 16 & 25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 96 \\ 376 \end{pmatrix}.$$

Решая систему $\Lambda a = \beta$, получаем вектор искомых коэффициентов $a = \begin{pmatrix} 8,45 \\ -1,45 \\ 0,25 \end{pmatrix}.$

Таким образом, искомый полином $F(x) = 8,45 - 1,45x + 0,25x^2$.

Оценим погрешность такой аппроксимации:

$$\delta = \left(\frac{1}{4} \sum_{i=0}^3 (F(x_i) - y_i)^2 \right)^{1/2} = 1,0062.$$