

MANUAL

El Calendario

Cómo funciona un calendario construido sobre el Sol, la Luna y los eclipses

Este documento explica las reglas del calendario: qué es un año, una estación, un mes, una semana y un día, y qué son los midsisons, los métonos, los eclípenos, los casaleros y los aponovos. No trata de la aplicación informática, sino del calendario en sí.

Índice

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. La idea del calendario | 10. Los métonos |
| 2. Los fenómenos de base | 11. Los eclipses y los eclípenos |
| 3. La coincidencia: el día sideral | 12. Los casaleros |
| 4. Lunas selectas e invertidas | 13. Los aponovos |
| 5. El día y la semana | 14. La jerarquía de ciclos |
| 6. El mes | 15. Festividades |
| 7. Las tres formas de contar meses | 16. Ejemplo completo: 8 de octubre de 2026 |
| 8. La estación y el midsison | 17. Días fuera de cuenta y casos especiales |
| 9. El año | 18. Glosario |

1. La idea del calendario

La mayoría de calendarios usan reglas aritméticas: un mes tiene 30 o 31 días, cada cuatro años se añade un día, etc. Este calendario funciona al revés: **no tiene ninguna regla de longitud fija**. Cada unidad de tiempo empieza y termina cuando ocurre un fenómeno astronómico real.

- El **año** cambia en el **solsticio de invierno**.
- Las **estaciones** cambian en los **solsticios y equinoccios**.
- Los **meses** y las **semanas** se cuentan desde la **luna nueva**.
- Los ciclos largos (**métonos, eclípenos, aponovos**) los marcan las coincidencias entre el Sol, la fase de la Luna, su distancia a la Tierra y los eclipses.

Por eso es un calendario **lunisolar y observacional**: el año sigue al Sol, el mes sigue a la Luna, y los dos se ajustan solos, sin necesidad de reglas de corrección. Una fecha de este calendario se obtiene mirando qué ha pasado en el cielo hasta ese día.

Unidad de referencia. Todo se cuenta en días de calendario (el día civil completo). Los fenómenos se sitúan en el día en el que ocurren, aunque para decidir si dos fenómenos "coinciden" se usa una medida más fina: el **día sideral** (capítulo 3).

2. Los fenómenos de base

El calendario se construye con cuatro tipos de fenómeno. Todo lo demás son combinaciones de estos.

2.1 Solsticios y equinoccios (SOE)

Los cuatro momentos del año en los que el Sol alcanza su posición extrema (solsticios) o cruza el ecuador celeste (equinoccios). En el calendario se les llama en conjunto **SOE**.

SOE	Fecha aproximada	Qué abre	Adjetivo
Solsticio de invierno	21–22 de diciembre	Invierno y el año nuevo	invernal
Equinoccio de primavera	19–21 de marzo	Primavera	primaveral
Solsticio de verano	20–21 de junio	Verano	estival
Equinoccio de otoño	22–23 de septiembre	Otoño	otoñal

2.2 Las fases de la Luna

La Luna pasa por cuatro fases principales en unos 29,53 días (el *mes sinódico*): **luna nueva**, cuarto creciente, **luna llena** y cuarto menguante. El calendario se fija sobre todo en la luna nueva (que abre meses y semanas) y en la luna llena. A lo que depende de las fases se le llama **fasal**.

2.3 Apogeo y perigeo (apoperi)

La órbita de la Luna no es un círculo: es una elipse. El punto más lejano a la Tierra es el **apogeo** y el más cercano el **perigeo**. La Luna pasa de un apogeo al siguiente en unos 27,55 días (el *mes anomalístico*). Al apogeo y al perigeo se les llama en conjunto **apoperi**, y a lo que depende de ellos, **apopérico**. Las coincidencias con un apogeo se llaman **apóricas** y las coincidencias con un perigeo, **péricas**.

2.4 Eclipses

Un eclipse de Sol solo puede ocurrir en luna nueva, y un eclipse de Luna solo en luna llena. Los eclipses pueden ser **totales**, **anulares**, **híbridos**, **parciales** o (los de Luna) **penumbrales**. El calendario llama **eclipse absoluto** a los más significativos: los eclipses de Sol totales, anulares o híbridos, y los eclipses totales de Luna. Los parciales y los penumbrales no son absolutos.

3. La coincidencia: el día sideral


Muchas piezas del calendario se definen como "dos o más fenómenos que coinciden". Para que coincidan no basta con caer el mismo día de calendario: tienen que ocurrir a **menos de un día sideral** de distancia.

Día sideral: el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa sobre sí misma respecto a las estrellas: **23 h 56 min 4 s** (86 164 segundos). Dos fenómenos separados por menos de un día sideral ocurren **dentro de la misma rotación de la Tierra**.

Apofasal: tres fenómenos en la misma rotación

Cuando en un mismo momento coinciden **un fenómeno de referencia** (un SOE o un midsison), **una fase lunar** (nueva o llena) y **un apoperi** (apogeo o perigeo), se dice que es **apofasal**. La condición es estricta: **las tres parejas** tienen que estar a menos de un día sideral entre sí. Así se garantiza que las tres cosas ocurren en la misma rotación.

A) Apofasal: las tres parejas están a menos de un día sideral



B) No apofasal: cada uno coincide con el solsticio, pero no entre sí




Figura 1. El caso B ocurrió de verdad en el solsticio de invierno de 1566: hay luna nueva y apogeo junto al solsticio, pero separados 35 horas entre sí. No es apofasal.

4. Lunas selectas e invertidas

Cuando una **luna nueva o llena** coincide (a menos de un día sideral) con un **apogeo o un perigeo**, la luna recibe un apellido:

Combinación	Tipo	Nombre propio	Por qué
Luna nueva + apogeo	Selecta	Remota	La luna invisible, en su punto más lejano.
Luna llena + perigeo	Selecta	Brillante	La luna llena más cercana y grande ("superluna").
Luna nueva + perigeo	Invertida	Velada	Está muy cerca, pero no se ve.
Luna llena + apogeo	Invertida	Tenue	Se ve entera, pero pequeña y lejana.

La idea es que en una luna **selecta** la distancia "acompaña" a la fase (oscura y lejana, o llena y cercana), y en una **invertida** la contradice. Estos cuatro nombres (remoto, brillante, velado, tenue) se aplican igual a métonos, midsisóns y eclípenos cuando son apofasales.




Figura 2. La luna nueva está del lado del Sol y la llena en el lado opuesto. Si el apogeo apunta hacia el Sol, las lunas son selectas; si apunta al lado contrario, invertidas.

Aponovo. Una luna nueva selecta (luna remota: nueva en apogeo) se llama **aponovo**. Es una pieza clave del calendario (capítulo 13). Ocurre más o menos una vez cada 14 lunaciones (unos 413 días), aunque a veces pasan varios años sin ninguna.

5. El día y la semana

El mes empieza con la luna nueva, y la semana también. Por eso las semanas no se repiten de forma continua como en el calendario gregoriano: **cada luna nueva reinicia la cuenta**.

5.1 El día de luna nueva: Terra

El día de la luna nueva se llama **Terra** y es especial: **no pertenece a ninguna semana ni a ningún mes**. Es la bisagra entre una lunación y la siguiente. Al día siguiente empieza la primera semana del nuevo mes.

5.2 Los días de la semana

Cada semana tiene siete días con nombres de astros, en el orden de los días de la semana clásicos:

Nº	Día	Astro	Nº	Día	Astro
0	Terra	la Tierra (día de luna nueva)	5	Marto	Marte
1	Luno	la Luna	6	Júpeno	Júpiter
2	Sole	el Sol	7	Saturino	Saturno
3	Merco	Mercurio	8	Liminol	día límite de la lunación
4	Venuro	Venus	9	Caelumbra	reservado (ver capítulo 17)

5.3 Las semanas

Una lunación dura 29 o 30 días de calendario, así que el mes tiene cuatro semanas completas de siete días (**Primana**, **Segana**, **Terana** y **Curana**) y, en las lunaciones de 30 días, una quinta semana de un solo día: **Limana**, formada por el día Liminol (día 29). El día Terra (día 0) no pertenece a ninguna semana.

Inicio	0 Terra					
Primana	1 Luno	2 Sole	3 Merco	4 Venuro	5 Marto	6 Júpeno
Segana	8 Luno	9 Sole	10 Merco	11 Venuro	12 Marto	13 Júpeno
Terana	15 Luno	16 Sole	17 Merco	18 Venuro	19 Marto	20 Júpeno
Curana	22 Luno	23 Sole	24 Merco	25 Venuro	26 Marto	27 Júpeno
Limana	29 Liminol					

Figura 3. Una lunación completa. Colores: Terra (negro), Primana (azul), Segana (verde), Terana (amarillo), Curana (naranja), Limana (violeta).

5.4 El día desdoblado

El día en que cae un solsticio o un equinoccio se marca como **desdoblado** (por ejemplo, «Merco desdoblado»): es un día que pertenece a la vez a la estación que termina y a la que empieza. La excepción es cuando ese mismo día también hay luna nueva: entonces es simplemente Terra.

6. El mes

Un mes es una **lunación**: el tiempo entre dos lunas nuevas (unos 29,5 días). Lo que define el nombre del mes es su posición respecto a los solsticios y equinoccios.

6.1 Meses ordinarios

Cada estación tiene sus propios meses. El primer mes de la estación empieza con la primera luna nueva después del SOE que abre la estación, el segundo con la siguiente, y así sucesivamente:

Estación	1.º mes	2.º mes	3.º mes (embolismal)
Invierno	Prierno	Seguerno	Terno
Primavera	Pinera	Seguera	Tera
Verano	Prano	Segano	Tano
Otoño	Pridor	Sedor	Tor

6.2 Meses híbridos

Una estación dura entre 89 y 94 días, unas tres lunaciones. Pero las lunas nuevas no esperan a los solsticios: casi siempre hay una lunación que **empieza en una estación y termina en la siguiente**. Esa lunación que contiene el SOE es un **mes híbrido**, y su nombre mezcla las dos estaciones:

Mes híbrido	Contiene	Mezcla
Oterno	el solsticio de invierno	Otoño + Invierno
Invera	el equinoccio de primavera	Invierno + Primavera
Primano	el solsticio de verano	Primavera + Verano
Verdor	el equinoccio de otoño	Verano + Otoño

Las reglas, para un día cualquiera, son estas:

1. Si el día es **luna nueva**, es Terra y no tiene mes.
2. Si el día es un **SOE**, pertenece al mes híbrido de ese SOE.
3. Si el día está entre la **última luna nueva antes de un SOE** y ese SOE, pertenece al mes híbrido del SOE que viene.
4. Si el día está entre un **SOE y la primera luna nueva que lo sigue**, pertenece al mes híbrido del SOE que acaba de pasar.
5. En cualquier otro caso, es un mes ordinario: el número de mes es el número de lunas nuevas que han pasado desde el último SOE.

Consecuencia importante: **la última lunación de cada estación se convierte siempre en el mes híbrido siguiente**. Si la luna nueva cae justo el día del SOE, no hay mes híbrido: la lunación empieza con el SOE.

6.3 Oterno liminal

El mes híbrido de invierno tiene una particularidad: el solsticio de invierno es también el **cambio de año**. La parte de Oterno anterior al solsticio pertenece al año que termina; la parte posterior al solsticio, hasta la primera luna nueva, pertenece ya al año nuevo y se llama **Oterno liminal** (de *liminal*: en el umbral).

6.4 Apellido del mes

Si la luna nueva que abrió el mes era **selecta** (un aponovo), el mes se llama **selecto** (por ejemplo, «Pridor selecto»). Si era **invertida**, el mes es **invertido**.

6.5 El mes embolismal y los años de 12 y 13 meses

Un año solar tiene unos 365,24 días y una lunación 29,53 días, así que en un año caben **12,37 lunaciones**. Con los cuatro meses híbridos y los dos meses ordinarios de cada estación salen exactamente **12 lunaciones** (4 híbridos + 8 ordinarios). Cuando el año tiene una lunación de más, esa lunación aparece como **tercer mes** de alguna estación: Terno, Tera, Tano o Tor. Es el **mes embolismal**, equivalente al mes 13 de otros calendarios lunisulares.

Ocurre en aproximadamente **7 de cada 19 años** (el 37 %), justo la proporción del ciclo metónico. Como el verano y la primavera son las estaciones más largas, el mes embolismal suele ser **Tano** o **Tera**; **Tor** es poco frecuente y **Terno** rarísimo (solo 8 veces desde 1434), porque el invierno es la estación más corta.

Un año común: 2026




Figura 4. Del solsticio de invierno de 2025 al de 2026: 12 lunaciones. Oterno liminal, Prierno, Segurno, Invera, Pinera, Segura, Primano, Prano, Segano, Verdor, Pridor, Sedor y Oterno. Ninguna estación tiene tercer mes.

Un año embolismal: 2023




Figura 5. Del solsticio de invierno de 2022 al de 2023: 13 lunaciones. La primavera tuvo cuatro lunas nuevas y apareció **Tera**, el tercer mes de primavera. Fíjate en que ese año el Oterno liminal duró un solo día, porque la luna nueva cayó el 23 de diciembre.

7. Las tres formas de contar meses

El calendario mide la Luna de tres maneras distintas. Cada una da lugar a un tipo de mes:

Tipo	Basado en	Desde ... hasta	Duración	Para qué se usa
Mes fasal	Las fases de la Luna	De una luna nueva a la siguiente	≈ 29,53 días	Es el mes del calendario: da nombre al mes (Prierno, Verdor...) y a las semanas y días.
Mes apopérico	El apogeo y el perigeo	De un apogeo al siguiente, pasando por un perigeo	≈ 27,55 días	Describe si la Luna se está acercando o alejando («lleva 7 días alejándose») y define las coincidencias apóricas y péricas.
Mes aponoval	Los aponovos	El número de mes fasal dentro de un aponovo	El aponovo dura de 14 a más de 100 meses	Indica en qué mes del aponovo actual estamos (capítulo 13).

El mes fasal y el apopérico no coinciden: como el apopérico es dos días más corto, el apogeo se va adelantando respecto a las fases. Cuando un apogeo vuelve a caer sobre una luna nueva, hay un nuevo aponovo. El mes aponoval mide precisamente ese desfase entre los dos ritmos de la Luna.

8. La estación y el midsison

Cada estación empieza en su SOE y termina en el SOE siguiente: el invierno va del solsticio de invierno al equinoccio de primavera, etc. El **día del SOE no pertenece a ninguna estación**: es el día desdoblado que hace de frontera.

8.1 El midsison

El **midsison** es el **punto medio exacto** entre dos SOE consecutivos: el momento en que ha pasado el mismo tiempo desde el SOE anterior que el que falta para el siguiente. Hay cuatro al año (midsison invernal, primaveral, estival y otoñal) y caen, más o menos, a principios de febrero, de mayo, de agosto y de noviembre.

8.2 Las tres partes de una estación




Figura 6. Una estación se divide en dos mitades por su midsison.

Así, una fecha puede ser «Otoño iniciante», «Primavera cenítica» (el día del midsison) o «Invierno terminante».

8.3 Apellidos del midsison

Igual que los métonos (capítulo 10), un midsison puede coincidir con una fase o un apoperi y entonces recibe apellidos: **nuevo** o **lleno** si coincide con una luna nueva o llena; **apórico** o **périco** si coincide con un apogeo o perigeo; **selecto** o **invertido** según la luna; **apofasal remoto**, **brillante**, **velado** o **tenue** si coinciden las tres cosas en la misma rotación; y **eclipsado** si además hay un eclipse absoluto. Por ejemplo: «Midsison invernal apórico» (4 de febrero de 2027).

9. El año

El año empieza y termina en el **solsticio de invierno**, el momento de la noche más larga, a partir del cual los días vuelven a crecer. El primer mes completo del año es **Prierno**, que empieza con la primera luna nueva tras el solsticio (antes de él solo hay el Oterno liminal).

El día del solsticio de invierno **no pertenece a ningún año**: es el día de cambio de año.

9.1 Cómo se numeran los años

Los años no se cuentan desde un único origen fijo, sino **desde el último métono invernal nuevo** (capítulo 10): el año 1 empieza al día siguiente de ese métono, y cada solsticio de invierno suma uno. Cuando llega un nuevo métono invernal nuevo, la cuenta vuelve a empezar.

Ejemplo. El último métono invernal nuevo fue el 21 de diciembre de 2014. Desde entonces han pasado 11 solsticios de invierno (2015 a 2025), así que el 8 de octubre de 2026 está en el **año 12**. El próximo métono invernal nuevo será el 21 de diciembre de 2033, y con él volverá a empezar el año 1.

Como los métonos invernales nuevos llegan cada 8, 11 o 19 años, un ciclo de años dura uno de esos tres valores.

10. Los métonos

Un **métono** es un **SOE que coincide** (a menos de un día sideral) con una luna nueva o llena, o con un apogeo o perigeo. Su nombre viene del **ciclo metónico**, descubierto por el astrónomo griego Metón: cada 19 años solares, las fases de la Luna vuelven a caer casi en las mismas fechas. Por eso las coincidencias entre solsticios y lunas nuevas se repiten con esos ritmos.

10.1 Tipos de métono

Criterio	Opciones
¿Qué SOE?	invernal, primaveral, estival, otoñal
¿Con qué coincide?	Fasal: con una fase → nuevo (luna nueva) o lleno (luna llena). Apopérico: con un apoperi → apórico (apogeo) o périco (perigeo).
¿La luna o el apoperi son especiales?	selecto o invertido (capítulo 4)
¿Coinciden las tres cosas?	apofasal: SOE, fase y apoperi en la misma rotación. Entonces se llama remoto (nueva + apogeo), brillante (llena + perigeo), velado (nueva + perigeo) o tenue (llena + apogeo).

Un mismo SOE puede ser a la vez métono fasal y métono apopérico. Si además las tres cosas coinciden, es apofasal.

10.2 Los tres métonos importantes

De todos los métonos, el calendario usa tres tipos para contar el tiempo. Los tres son **invernales**:

Sigla	Nombre	Condición	Frecuencia
IN	Métono invernal nuevo	Solsticio de invierno + luna nueva	Cada 8, 11 o 19 años
IA	Métono invernal apórico	Solsticio de invierno + apogeo	En rachas, cada 4 años
IAR	Métono invernal apofasal remoto	Solsticio de invierno + luna nueva + apogeo, los tres en la misma rotación	Rarísimo: tres desde el año 1000 (1194, 1327 y 1433)

10.3 El ritmo de los métonos invernales nuevos




Figura 7. Métonos invernales nuevos entre 1900 y 2100. Cada punto reinicia la cuenta de años.

10.4 Contadores de métonos

Los métonos IN y los IA se van **numerando desde el último métono IAR**. Por ejemplo, desde el métono IAR de 1433 ha habido 42 métonos invernales nuevos más, así que en 2026 estamos en el **métono IN nº 43**. A su vez, los métonos IAR se numeran desde el último eclípeno IAR (capítulo 11). El número sube el día siguiente al métono (ver 17.1).

11. Los eclipses y los eclípenos

Un **eclípeno** es un **métono fasal que además coincide con un eclipse** (a menos de un día sideral). Es decir: un SOE, una luna nueva o llena y un eclipse, a la vez. Si la luna es nueva, el eclipse es de Sol; si es llena, de Luna.

Los eclípenos reciben los mismos apellidos que los métonos: **invernal, primaveral, estival u otoñal; nuevo o lleno; selecto o invertido**; y, si son apofasales, **remoto, brillante, velado o tenue**. Además se indica el tipo de eclipse: total, anular, híbrido, parcial o penumbral.

11.1 Los eclípenos importantes

Sigla	Nombre	Condición
Eclípeno IN	Eclípeno invernal nuevo	Solsticio de invierno + luna nueva + eclipse de Sol
Eclípeno IAR	Eclípeno invernal apofasal remoto	Solsticio de invierno + luna nueva + apogeo + eclipse de Sol (anular o total), todo en la misma rotación

El eclípeno IAR es el fenómeno más raro del calendario y hace de **origen de la era**: todo se cuenta a partir de él. El único conocido es el del **21 de diciembre de 1433**, en el que coincidieron el solsticio de invierno, una luna nueva remota (en apogeo) y un eclipse anular de Sol. Es también el último métano IAR: los de 1194 y 1327 no tuvieron eclipse.

Los eclípenos IN se numeran desde el último eclípeno IAR. Desde 1433 ha habido 7 más (1479, 1498, 1517, 1786, 1862, 1870 y 1889), así que en la actualidad estamos en el **eclípeno IN nº 8**.

12. Los casaleros

Un **casalero** es el **primer fenómeno notable que ocurre después de un eclípeno invernal nuevo**. Indica qué «responde» primero al eclípeno. Tiene dos tipos:

Tipo	Si lo primero que ocurre es...
Casalero metónico	un métono (de cualquier estación y tipo)
Casalero eclipelar	un eclipse absoluto (de Sol total, anular o híbrido, o total de Luna)

No cuenta el propio eclipse del eclípeno. Para elegir el eclípeno de referencia se usan solo los eclípenos IN cuyo eclipse es **anular o total**.

Ejemplo. El último eclípeno IN anular o total fue el del 21 de diciembre de 1889 (eclipse total de Sol). Lo primero que ocurrió después fue un métono primaveral nuevo, el 20 de marzo de 1890. Por tanto, el casalero vigente es un **casalero metónico** (de 1890, referido al eclípeno de 1889).

13. Los aponovos

Un **aponovo** es una **luna nueva selecta**: una luna nueva que coincide con un apogeo (una luna remota). Funcionan como una cuenta paralela a la de los años:

- Los aponovos se **numeran desde el último métono IAR**. El aponovo actual es el siguiente al último que ha pasado: desde 1433 ha habido 389, así que estamos en el **aponovo nº 390**.
- El periodo entre un aponovo y el siguiente se divide en **meses aponovales**: el mes aponoval 1 empieza con el aponovo, el 2 con la siguiente luna nueva, etc.

Los aponovos suelen llegar cada 14 lunaciones (413 días), pero el ritmo no es regular. Hay rachas en las que aparecen uno tras otro y periodos de varios años sin ninguno (el hueco más largo registrado es de 3 278 días, casi 9 años).

Aponovos recientes
24-03-2020 · 11-05-2021 · 29-06-2022 · 16-08-2023 · 02-10-2024 · 20-11-2025 · 07-01-2027 · 25-02-2028 · 13-04-2029
El aponovo del 2 de octubre de 2024 coincidió con un eclipse anular de Sol.

14. La jerarquía de ciclos

Todas las cuentas encajan unas dentro de otras. Cada nivel se reinicia cuando ocurre el fenómeno del nivel superior:




Figura 8. Ciclos anidados, con los valores del 8 de octubre de 2026 entre paréntesis.

15. Festividades

Las festividades marcan los fenómenos más importantes del calendario. Si en un mismo día coinciden varias, solo se celebra la de mayor prioridad. La tabla está ordenada de mayor a menor prioridad:

Festividad	Cuándo
Cambio de eclípeno invernal apofasal remoto	Eclipse + solsticio de invierno + apogeo + luna nueva
Cambio de métono invernal apofasal remoto	Solsticio de invierno + apogeo + luna nueva
Cambio de eclípeno invernal nuevo	Eclipse + solsticio de invierno + luna nueva
Cambio de métono invernal nuevo	Solsticio de invierno + luna nueva
Cambio de métono invernal apórico	Solsticio de invierno + apogeo
Cambio de año	Solsticio de invierno
Bienvenida de la primavera	Equinoccio de primavera
Mitad del año	Solsticio de verano
Entrada del otoño	Equinoccio de otoño
Midsison aponoval	Un midsison que cae el mismo día que un aponovo
Midsison invernal / primaveral / estival / otoñal	El día del midsison de cada estación
Inicio del primer mes del año	La primera luna nueva después del solsticio de invierno (el día Terra que abre Prierno)
Cambio de aponovo	Luna nueva en apogeo (un nuevo aponovo)

Cuando el solsticio de invierno es un métono o un eclípeno, la luna nueva cae el mismo día que el cambio de año. En ese caso no hay una festividad aparte de «Inicio del primer mes del año»: queda absorbida por el cambio de métono o eclípeno.

16. Ejemplo completo: 8 de octubre de 2026

Así se lee una fecha del calendario paso a paso:

Día	Júpeno. La última luna nueva fue el 11 de septiembre, hace 27 días; el día 27 es el sexto día (Júpeno) de la cuarta semana.
Semana	Curana (días 22 a 28).
Mes	Verdor , el mes híbrido del equinoccio de otoño. Empezó con la luna nueva del 11 de septiembre, contiene el equinoccio del 22 de septiembre y terminará con la luna nueva del 10 de octubre. Después vendrán Pridor (11 oct.) y Sedor (10 nov.), y el 9 de diciembre empezará Oterno.
Estación	Otoño iniciante. El otoño empezó el 22 de septiembre y su midsison será el 6 de noviembre.
Año	Año 12 , contado desde el métono invernal nuevo del 21 de diciembre de 2014.
Métonos	Métono IN nº 43 y métono IA nº 44 (el último IA fue el 21-12-2005), contados desde el métono IAR de 1433. Métono IAR nº 1.
Eclípenos	Eclípeno IN nº 8 , contado desde el eclípeno IAR de 1433.
Aponovo	Aponovo nº 390, mes aponoval 11. El último aponovo fue el 20 de noviembre de 2025 y han pasado 10 lunas nuevas desde entonces. El siguiente será el 7 de enero de 2027.
Luna	Lleva 7 días alejándose: el último apoperi fue un perigeo, el 1 de octubre.
Casalero	Casalero metónico (20-03-1890) del eclípeno de 1889.
Festividades	La anterior fue la «Entrada del otoño» (hace 16 días) y la próxima será el «Midsison otoñal» (dentro de 29 días).

17. Días fuera de cuenta y casos especiales

17.1 Días que no pertenecen a una unidad

Como cada unidad empieza con un fenómeno, el día del propio fenómeno hace de frontera y queda fuera de la unidad:

Día	Queda fuera de...	Cómo se muestra
Luna nueva	la semana y el mes	Día Terra , semana «-», mes «-»
Solsticio o equinoccio	la estación	Estación «-», día desdoblado
Solsticio de invierno	el año	Año «-»
Día de un métono o eclípeno	la cuenta de métonos o eclípenos	El número sube al día siguiente

17.2 Casos especiales

- **Luna nueva el día anterior al SOE.** Si la luna nueva cae el día anterior al SOE pero dentro del mismo día sideral, hay métono, pero para los meses cuenta el día de calendario. La estación siguiente empieza entonces con una lunación entera de mes híbrido (o de Oterno liminal) y solo tiene un mes ordinario. Pasó, por ejemplo, en el invierno de 1938-1939.
- **Oterno liminal muy corto o inexistente.** Si la luna nueva cae uno o dos días después del solsticio de invierno, el Oterno liminal dura uno o dos días (2022). Si cae el mismo día del solsticio, no hay Oterno liminal.
- **Liminol y Caelumbra.** Liminol (día 29) solo existe en las lunaciones de 30 días. Caelumbra queda reservado: con lunaciones de 29 o 30 días, nunca se llega al día 30 desde la luna nueva.
- **Origen de la era.** El calendario solo puede fecharse a partir del 21 de diciembre de 1433, el único eclípeno invernal apofasal remoto conocido. Antes de esa fecha no hay origen desde el que contar. En el rango estudiado (hasta 2100) no habrá otro, así que la era de 1433 seguirá vigente.

18. Glosario

Apofasal	SOE o midsison, fase lunar y apoperi a menos de un día sideral entre sí (misma rotación).
Apopérico	Relativo al apogeo y al perigeo. Apórico: con apogeo. Périco: con perigeo.
Apoperi	Un apogeo o un perigeo de la Luna.
Aponovo	Luna nueva selecta (nueva + apogeo). También, el periodo hasta el siguiente.
Casalero	Primer métono o eclipse absoluto tras un eclípeno invernal nuevo. Metónico o eclipelar.
Cenítico/a, iniciante, terminante	Día del midsison, antes del midsison y después del midsison.
Día sideral	23 h 56 min 4 s; la medida de coincidencia.
Eclipse absoluto	Eclipse de Sol total, anular o híbrido, o eclipse total de Luna.
Eclípeno	Métono fasal que coincide con un eclipse.
Fasal	Relativo a las fases de la Luna (nueva o llena).
Mes embolismal	Tercer mes de una estación (Terno, Tera, Tano, Tor): el mes 13 de un año.
Mes híbrido	Lunación que contiene un SOE: Oterno, Invera, Primano, Verdor.
Métono	SOE que coincide con una fase (fasal) o con un apoperi (apopérico).
Midsison	Punto medio entre dos SOE consecutivos.
Remoto, brillante, velado, tenue	Nueva + apogeo, llena + perigeo, nueva + perigeo, llena + apogeo.
Selecto / invertido	Fase y distancia que se acompañan / se contradicen.
SOE	Solsticio o equinoccio.
Terra	Día de luna nueva; no pertenece a ninguna semana ni mes.