

# Calcolo Differenziale - Sommario

*Tutto sul calcolo differenziale.*

---

## 0. INTRODUZIONE

---

### Introduzione al Calcolo Differenziale

*Introduzione al calcolo differenziale: cenni storici ed esempio meccanico del rapporto incrementale e derivata*

---

## 1. Origine storico del concetto

**OSS 1.1.** (*Contesto storico*) Ci troviamo nella seconda metà del XVII secolo, un periodo caratterizzato dagli straordinari contributi di due giganti della matematica: Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz. Questi due luminari sono diventati figure fondamentali nello sviluppo del *calcolo differenziale*, introducendo concetti rivoluzionari come la *derivata*, che poi diventerà materia d'esame per quanto ci concerne.

Focalizziamoci ora sul genio di Isaac Newton: autodidatta straordinario, Newton, già a soli 21 anni, ha delineato la concettualizzazione della *velocità*. È interessante notare che le seguenti definizioni, sebbene non siano direttamente oggetto d'esame, possono essere considerate come un cenno alla *fisica newtoniana* ([Introduzione Alla Fisica](#)).


## Esempio meccanico del calcolo differenziale

### Definizione 1.1. (legge oraria)

Sia  $x \mapsto x(t)$  una funzione che associa al tempo  $t$  la *posizione* di un punto mobile su un asse  $x$ .

Allora  $x(t)$  si dice legge oraria.

**FIGURA 1.1.** (*Legge oraria*)



### Definizione 1.2. (velocità media dati due istanti di tempo)

Si definisce la **velocità**, dati due istanti di tempo  $t_1$  e  $t_2$  la velocità media  $v(t_1, t_2)$  nel seguente modo:

$$v(t_1, t_2) = \frac{x(t_1) - x(t_2)}{t_1 - t_2}$$

Sul numeratore abbiamo **l'incremento** dello spazio, sul denominatore **incremento** del tempo.

**ATTENZIONE!** Per **"incremento"** si intende semplicemente la differenza tra il punto finale e iniziale; quindi non dev'esserci necessariamente un **"incremento"**: può esserci nessuna variazione o anche un **"decremento"** (ovvero una specie di incremento negativo).

Ora voglio legare questo concetto di **velocità** ad una sola variabile di tempo  $t$ ; allora definisco la **velocità** istantanea mediante il concetto di **limite** ([Definizione di Limite di funzione > ^0f845a](#)).

### Definizione 1.3. (velocità istantanea)

Sia  $x(t)$  una legge oraria.

Allora chiamo la velocità istantanea  $v(t)$

$$v(t) = \lim_{t_1 \rightarrow t_2} v(t_1, t_2)$$

Ora abbiamo il **concetto** meccanico della derivata: nei successivi capitoli ci prescindiamo dai presupposti fisici e ci dirigiamo verso all'astrazione puramente matematica.

## A. TEORIA DEL CALCOLO DIFFERENZIALE

### A1. Definizione di rapporto incrementale

#### Rapporto Incrementale

*Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un punto.*

### 1. Definizione di rapporto incrementale

#### #Definizione

**Definizione 1.1. (rapporto incrementale di una funzione relativo un punto del dominio)**

Sia  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $I$  un **intervallo** (**Intervalli**).

Sia  $x_0$  un punto del dominio  $I$ .

Allora chiamo il **rapporto incrementale**  $R_{x_0}^f(x)$  della funzione  $f$  relativamente al punto  $x_0$  come

$$R_{x_0}^f(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

#### #Proposizione


**Proposizione 1.1. (rapporto incrementale come funzione)**

Allora si può pensare al **rapporto incrementale**  $R_{x_0}^f(x)$  come una funzione che lega ad un qualsiasi punto  $x$  in  $I$ , escluso  $x_0$  in quanto si avrebbe la forma indeterminata  $\frac{0}{0}$ , un altro punto della retta reale.

$$R_{x_0}^f : I \setminus x_0 \rightarrow \mathbb{R}$$

**OSS 1.1.** Osserviamo che questa definizione ha anche un *significato geometrico*: infatti  $R_{x_0}^f$  è anche la *pendenza* (coefficiente angolare) della *retta secante* dei punti  $(x_0, f(x_0))$  e  $(x, f(x))$ .

**FIGURA 1.1.** (*Significato geometrico*)



## A2. Definizione di derivata e derivabilità

### Derivata e derivabilità

Definizione di derivata, derivabilità in un punto, derivabilità generale, funzione derivata.\*

## 1. Derivata

#Definizione

### Definizione 1.1. (derivata di una funzione relativa ad un punto)

Sia  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in I$ .

Sia  $R_{x_0}^f(x)$  il *rapporto incrementale* ([Rapporto Incrementale > ^ccc58b](#)).


Allora definisco la *derivata* di  $f$  in  $x_0$  il *limite* ([Definizione di Limite di funzione > ^0f845a](#)) del rapporto incrementale con  $x$  che tende a  $x_0$ .

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} R_{x_0}^f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Naturalmente si definisce tale **se** tale limite esiste.

**OSS 1.1.** Come precedentemente osservato in [Rapporto Incrementale > ^c7cbf0](#), la **derivata in un punto** ha la sua interpretazione geometrica. Ovvero questa è semplicemente la **pendenza** della **retta tangente** in un punto: infatti se prendendo due punti sulla funzione, di cui una **"mobile"** e l'altra **"fissa"**, poi facendo avvicinare il punto mobile a quello fisso, noteremo che la retta secante dei due punti si **"convergerà"** ad una retta sola (ovviamente supponendo che esista).

**FIGURA 1.1.** (*Interpretazione geometrica di derivata*)



## 2. Derivabilità

### #Definizione

#### Definizione 2.1. (derivabilità in un punto)

Sia  $f : I \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in I$ .

Se **esiste finito** la **derivata** ([^478a87](#))

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} R_{x_0}^f(x) \in \mathbb{R}$$

Allora  $f$  si dice **derivabile nel punto**  $x_0$ .

### #Definizione

#### Definizione 2.2. (derivabilità di una funzione)

Sia  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  *derivabile* ([^6e7606](#)) in *ogni* punto del suo dominio  $I$ , allora  $f$  si dice *derivabile* (e basta).

**OSS 2.1.** Notiamo che queste due definizioni "*seguono*" lo schema delle definizioni di *continuità* ([Definizione di continuità > ^ddf65d](#), [Definizione di continuità > ^d2f56f](#))

### 3. Funzione derivata

#Definizione

#### Definizione 3.1. (funzione derivata)

Sia  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  *derivabile*.

Chiamo la *funzione derivata* la funzione

$$f : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto f'(x)$$

## A3. Proprietà fondamentali delle derivate

### Proprietà delle derivate

*Proprietà fondamentali delle derivate: Continuità delle funzioni derivabili, derivata di operazione tra funzioni, derivata di funzione composta, derivata della funzione inversa.*

## 1. Proprietà fondamentali

### Continuità della funzione derivabile

#Teorema

#### Teorema 1.1. (continuità delle funzioni derivabili)

Sia  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $I$  intervallo,  $x_0 \in I$ .

Sia  $f$  *derivabile* in  $x_0$  ([Derivata e derivabilità > ^6e7606](#)).

Allora  $f$  è *continua* in  $x_0$  ([Definizione di continuità > ^ddf65d](#)).

$$f \text{ derivabile} \implies f \text{ continua}$$

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del [teorema 1.1.](#) (^dac6dc)

Intanto sappiamo che  $I$  è un intervallo, quindi *tutti* i suoi punti all'interno ne sono *punti di accumulazione*: pertanto possiamo prendere  $\lim x \rightarrow x_0$  per un qualsiasi  $x_0 \in I$ .

Ora dimostriamo che  $f$  è *continua* usando il fatto che  $f$  è *derivabile*:

$$\begin{aligned} f \text{ continua} &\iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \\ &\iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - f(x_0) = 0 \\ &\iff \lim_{x \rightarrow x_0} \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{= f'(x) \in \mathbb{R}} \underbrace{(x - x_0)}_{x - x_0 \rightarrow 0} \stackrel{?}{=} 0 \\ &\iff f'(x) 0 \rightarrow 0 = 0 \blacksquare \end{aligned}$$

#### #Proposizione

##### Proposizione 1.1. (la non derivabilità delle funzioni continue)

Vale il viceversa del [teorema 1.1.](#) (^dac6dc)? La risposta è *no*, in quanto esistono controesempi di funzioni *continue* ma non derivabili (dunque negando l'implicazione  $p \implies q$ )

#### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** della [proposizione 1.1.](#) (^e5ee1a)

Per l'esempio di una funzione continua non derivabile rivolgersi a [Esempi di derivate](#).

## Derivata di operazioni tra funzioni

#### #Teorema

##### Teorema 1.2. (derivata di operazioni tra funzioni)

Siano  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  delle funzioni.

Sia  $x_0 \in I$ .

Allora  $f \pm g, f \cdot g, \frac{f}{g}$  sono *derivabili*.

In particolare valgono le seguenti:

$$\begin{aligned}
i. (f \pm g)' &= f' \pm g' \\
ii. (fg)' &= f'g + fg' \text{ (regola di Leibniz)} \\
iii. \frac{f}{g} &= \frac{f'g - fg'}{g^2}
\end{aligned}$$

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** dei punti *i.*, *ii.*, *iii.* del **teorema 1.2.** (^fd716f)

i. Sia  $R_{x_0}^{f+g}(x)$  il seguente:

$$\begin{aligned}
R_{x_0}^{f+g}(x) &= \frac{f(x) + g(x) - f(x_0) - g(x_0)}{x - x_0} \\
&= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \\
&= R_{x_0}^f(x) + R_{x_0}^g(x) \\
&\implies f'(x) + g'(x)
\end{aligned}$$

Questo vale analogamente per la sottrazione.

ii. Sia  $R_{x_0}^{fg}(x)$  il seguente:

$$\begin{aligned}
R_{x_0}^{fg}(x) &= \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\
&= \frac{f(x)g(x) - f(x)g(x_0) + f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\
&= \frac{f(x)(g(x) - g(x_0))}{x - x_0} + \frac{g(x_0)(f(x) - f(x_0))}{x - x_0} \\
&= f(x) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} + g(x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\
f \text{ continua} &\implies f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0) \\
x \rightarrow x_0 &\implies f(x)g'(x) + g(x)f'(x)
\end{aligned}$$

iii. Sia  $R_{x_0}^{\frac{f}{g}}$  il seguente:



$$\begin{aligned}
R_{x_0}^f(x) &= \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{x - x_0} \\
&= \frac{f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x)}{g(x)g(x_0)} \cdot \frac{1}{x - x_0} \\
&= \frac{f(x)g(x_0) - f(x)g(x) + f(x)g(x) - f(x_0)g(x)}{x - x_0} \cdot \frac{1}{g(x)g(x_0)} \\
&= \left( -f(x) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} + g(x) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) \cdot \dots \\
&= (g(x)f'(x_0) - f(x)g'(x_0)) \cdot \frac{1}{g(x)g(x_0)} \\
f \text{ continua} &\implies \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2} \blacksquare
\end{aligned}$$

(svolto la dimostrazione del punto iii. da me stesso per esercizio)

## 2. Derivate di funzioni particolari

### Derivata della funzione composta

#Teorema

#### Teorema 2.1. (derivata di funzione composta)

Siano  $f : I \rightarrow J$ ,  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ ;  $x_0 \in I$ ,  $f(x_0) = y_0 \in J$ .

Sia  $f$  derivabile in  $x_0$ ,  $g$  derivabile in  $f(x_0)$ .

Allora  $g \circ f$  è **derivabile** in  $x_0$  e vale che

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del **teorema 2.1.** (^250330)

*Nota: la prima parte della dimostrazione sarà l'idea della dimostrazione per cui vogliamo "orientare" la dimostrazione; la seconda parte sarà la dimostrazione vera e propria, anche se leggermente artificiale e forzata.*

L'idea della dimostrazione consiste nella seguente:

$$\begin{aligned}
R_{x_0}^{g \circ f}(x) &= \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} \\
&= \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\
&= g'(f(x)) \cdot f'(x_0) \\
&\implies g'(f(x)) \cdot f'(x)
\end{aligned}$$

Tuttavia c'è un problema: in uno dei passaggi moltiplico la frazione per  $\frac{f(x)-f(x_0)}{f(x)-f(x_0)}$ , che è equivalente a 1. Tuttavia se ci troviamo nel caso in cui  $f(x) = f(x_0)$ , avremmo un problema in quanto la frazione precedentemente definita non sarebbe più definita.

Allora per evitare questo problema creiamo, in una maniera artificiale, una funzione continua che ci permette di evitare questo problema.

Sia

$$H(y) = \begin{cases} \frac{g(y)-g(f(x_0))}{y-f(x_0)} & \text{se } y \neq f(x_0) \\ g'(f(x_0)) & \text{se } y = f(x_0) \end{cases}$$

Trovo che  $H$  è continua in  $f(x_0)$ , in quanto per ipotesi  $g$  è *derivabile* in  $f(x_0)$ . Inoltre posso verificare che vale la seguente relazione:

$$R_{x_0}^{g \circ f}(x) = H(f(x)) \cdot R_{x_0}^f(x)$$

In particolare per  $f(x) = f(x_0)$  abbiamo

$$\begin{aligned} R_{x_0}^{g \circ f}(x) &= H(f(x_0)) \cdot R_{x_0}^f(x) \\ &\iff \\ \frac{g(f(x_0)) - g(f(x_0))}{x - x_0} &= g'(f(x_0)) \frac{f(x_0) - f(x_0)}{x - x_0} \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

A questo punto prendendo i rispettivi limiti, ottengo

$$(g \circ f)' = \lim_{x \rightarrow x_0} H(f(x)) \cdot R_{x_0}^f(x) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) = g'(f(x)) \cdot f'(x) \blacksquare$$

## Derivata della funzione inversa

#Teorema

### Teorema 2.2. (derivata della funzione inversa)

Sia  $f: I \rightarrow J$  una funzione *biiettiva* ([Funzioni > ^d193b2](#)), dunque *invertibile* ([Funzioni > ^7b369f](#)); sia  $f$  *derivabile* in  $x_0$  con  $f'(x) \neq 0$ .


Allora  $f^{-1}(x)$  è *derivabile* in  $x_0$  e si ha

$$(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$$

**OSS 2.2. (Interpretazione geometrica)** Anche questo teorema ha un suo significato geometrico: infatti se prendo la funzione originale, la inverte prendendo la sua simmetrica e scambiando le assi, allora prendendo lo stesso

punto mi accorgo che la sua *tangente* esiste ed è proprio la *inversa* di quella originale.

**FIGURA 2.2.** (*Interpretazione geometrica della derivata della funzione inversa*)



**DIMOSTRAZIONE** del *teorema 2.2.* (<sup>97198c</sup>)

Si tratta semplicemente (con dei trucchetti) di calcolare il rapporto incrementale  $R_{f(x_0)}^{f^{-1}}(y)$ .

$$\begin{aligned}
 R_{f(x_0)}^{f^{-1}}(y) &= \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(f(x_0))}{y - f(x_0)} \\
 &= \frac{f^{-1}(y) - x_0}{y - f(x_0)} \\
 &\Rightarrow \lim_{y \rightarrow f(x_0)} \frac{f^{-1}(y) - x_0}{y - f(x_0)} \\
 \begin{cases} x = f^{-1}(y) \\ y = f(x) \\ x \rightarrow x_0 \end{cases} &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} \\
 &= \frac{1}{R_{x_0}^f(x)} \blacksquare
 \end{aligned}$$

## A4. Seconda, terza, ..., k-esima derivata

### Derivata Successiva e Classe C

*Definizione di derivata seconda, terza, ..., di ordine k; definizione di classe C.*

# 1. Derivata di ordine k-esimo

## #Definizione

### Definizione 1.1. (derivata di ordine k-esimo)

Sia  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $I$  un *intervallo* (*Intervalli*).

Sia  $f$  *derivabile* (*Derivata e derivabilità > ^12c1df*).

Allora ha senso considerare la *funzione derivata*

$$f' : I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto f'(x)$$

Ma quindi si può chiedere se la *funzione derivata* è anch'essa *derivabile*; in tal caso chiamo la *derivata* della *funzione derivata* la *derivata seconda* e la indico con

$$f'' \text{ oppure } f^{(2)}$$

Per *induzione* (*Assiomi di Peano, il principio di induzione > ^76b850*) posso definire la derivata di ordine *k-esimo* come il seguente:

$$\begin{aligned} f^{(0)} &= f \\ f^{(k+1)} &= f^{(k)}, \forall k \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

## 2. Classe C

## #Definizione

### Definizione 2.1. (classe C di una funzione reale)

Sia  $f$  *derivabile* e sia la sua *funzione derivata*  $f'$  anch'essa *derivabile* (*Definizione di continuità > ^d2f56f*), allora dico che  $f$  è di *classe*  $\mathcal{C}^1$ ;

$$f \in \mathcal{C}^1$$

Generalizzando, se  $f$  è *derivabile* fino all'ordine  $f^{(k)}$ ; ovvero

$$f', f'', \dots, f^{(k)}$$

sono tutte derivabili, allora  $f$  si dice di *classe*  $\mathcal{C}^k$ .

$$f \in \mathcal{C}^k$$

Inoltre se  $f$  è *derivabile* per *qualunque* ordine, allora si dice che  $f$  è di classe  $\mathcal{C}^\infty$ ;

$$f \in \mathcal{C}^\infty$$

### 3. Esempi

#Esempio

#### Esempio 3.1. (funzione esponenziale)

Consideriamo la classica funzione **esponenziale**  $e^x$  ([Funzione esponenziale e Logaritmica](#)); se consideriamo la sua **derivata**  $(e^x)'$ , notiamo che è la stessa.

Allora per **qualsunque** ordine viene derivata, questa rimane la stessa; pertanto  $e^x$  è **sempre** derivabile.

$$e^x \in \mathcal{C}^\infty$$

#Esempio

#### Esempio 3.2. (funzione potenza)

Consideriamo la **funzione potenza**  $x^n$  ([Funzioni di potenza, radice e valore assoluto](#)); se consideriamo la sua derivata  $(x^n)' = nx^{n-1}$ , vediamo che fino ad un certo punto (precisamente all'ordine  $n + 1$ -esimo) questa si annulla; però la funzione **costante** è sempre derivabile.

Allora anche  $x^n \in \mathcal{C}^\infty$ .

#Esempio

#### Esempio 3.3. (funzione seno)

Consideriamo adesso la **funzione seno**  $\sin x$  ([Funzioni trigonometriche](#)); derivando  $\sin x$  fino al quarto ordine vediamo che risulta la stessa funzione. Infatti

$$\begin{aligned} &(\sin x)' = \cos x \\ \implies &(\cos x)' = -\sin x \\ \implies &(-\sin x)' = -\cos x \\ \implies &(-\cos x)' = \sin x \\ \implies &\dots \end{aligned}$$

Allora  $\sin x \in \mathcal{C}^\infty$ .

#Esempio

### Esempio-Esercizio 3.4. (funzione valore assoluto per identità)

Consideriamo la funzione  $f(x) = x \cdot |x|$ .

Si può dimostrare che questa è derivabile fino al *primo ordine*  $f'(x)$ ; però  $f'$  non è derivabile. La dimostrazione è stata lasciata al lettore per esercizio.

Allora  $x \cdot |x| \in \mathcal{C}^1$ .

## A5. Teorema di Fermat, di Rolle, di Cauchy e di Lagrange

### Teorema di Fermat

*Teorema di Fermat: cenno storico, enunciato e dimostrazione. Modello di applicazione (collegamento).*

## 0. Cenni storici alla figura di Pierre Fermat

*(Paragrafo scritto da me poi rielaborato da ChatGPT)*

Pierre de Fermat (1601-1665) è stato un giudice francese di notevole fama. Oltre al suo ruolo di giurista nelle corti francesi, Fermat coltivava la matematica come passatempo, dimostrando però di essere molto più di un dilettante: infatti si guadagnò l'appellativo "*il principe dei dilettanti*".

Tra i suoi contributi più significativi, possiamo citare la sua corrispondenza con Blaise Pascal sul problema della suddivisione della posta, il celebre teorema di Fermat (che esporremo a breve) e l'enigmatico ultimo teorema di Fermat.

Particolarmente noto è l'ultimo teorema di Fermat, su cui il matematico francese sostenne di avere una dimostrazione. Tuttavia, non la pubblicò mai, affermando che la dimostrazione "*non stava dentro nel margine dentro nella pagina*"<sup>(1)</sup>.

Ai giorni nostri, il teorema è stato finalmente dimostrato dal matematico Sir Andrew J. Wiles, il cui trattato estende per più di 100 pagine. Insomma, forse questa *meravigliosa dimostrazione* era un po' troppo lunghetta? Forse, comparandoci a Fermat, potremmo scrivere sul nostro esame che la nostra dimostrazione è troppo meravigliosa e lunga per poter essere contenuta, ai fini di giustificare la nostra omissione di eventuali dimostrazioni.

---

(1) «È impossibile separare un cubo in due cubi, o una potenza quarta in due potenze quarte, o in generale, tutte le potenze maggiori di 2 come somma della stessa potenza. Dispongo di una meravigliosa dimostrazione di questo teorema, che non può essere contenuta nel margine troppo stretto della pagina» ("Arithmetica", Diofanto di Alessandria (note di P. de Fermat))

---

## 1. Enunciato del teorema di Fermat

#Teorema

### Teorema 1.1. (di Fermat)

Sia  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in I$ .

Se valgono che:

- i.  $x_0$  è punto di *massimo* (minimo) *relativo* (Funzioni > ^f3e49c).
- ii.  $x_0$  è punto *interno* per il dominio  $I$  (Punti interni, esterni e di frontiera > ^c78831); quindi  $x_0$  non si trova agli estremi.
- iii.  $f$  è *derivabile* in  $x_0$  (Derivata e derivabilità > ^6e7606).


Allora vale che

$$f'(x_0) = 0$$

ovvero  $x_0$  è un *punto stazionario* (vedere la definizione sottostante)

A parole, questo teorema dice che "se  $f$  è derivabile in un punto di massimo o minimo interno al dominio, allora la sua derivata è nulla."

**FIGURA 1.1.** (Idea grafica)



## Punto stazionario

### #Definizione

#### Definizione 1.1. (punto stazionario, cenno)

Se vale che  $f'(x_0) = 0$ , allora  $x_0$  si dice *punto stazionario*

## 2. Dimostrazione del teorema di Fermat

### #Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del *teorema 1.1.* (^8ab68b)

Consideriamo un punto  $x_0$  che sia *massimo relativo* per un certo intorno  $r$ , interno al dominio  $I$  e per cui  $f$  è derivabile.

Allora considero gli intervalli  $I_- = [x_0 - r, x_0]$  e  $I_+ = [x_0, x_0 + r]$ .

- Nel primo intervallo abbiamo che  $x_0 \geq x_0 - r \implies x_0 \geq x \in I_-$  e che  $f(x_0) \geq f(x) \in I_-$ .

Allora considerando il rapporto incrementale  $R_{x_0}^f(x)$ , scopriamo che questa è sempre positiva in quanto  $x - x_0 \leq 0$  e  $f(x) - f(x_0) \leq 0$ ; allora per la *permanenza del segno* (usandone la contronominale) (*Teoremi sui Limiti di Funzione* > ^06a2e3)

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} R_{x_0}^f(x) \geq 0$$



- Nel secondo intervallo abbiamo che  $x_0 + r \geq x_0 \implies x \in I_+, x \geq x_0$  ma comunque  $f(x) \leq f(x_0)$  in quanto  $x_0$  è di massimo.  
Allora riconsiderando il rapporto incrementale  $R_{x_0}^f(x)$  vediamo che questa è negativa, in quanto abbiamo il prodotto tra un segno *negativo* e *positivo*. Allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} R_{x_0}^f(x) \leq 0$$

Ma sappiamo che, in quanto  $f$  è *derivabile* in  $x_0$ , deve esistere il limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R_{x_0}^f(x) \in \mathbb{R}$$

Allora l'unico modo per far valere tutte le condizioni ottenute è quella di imporre

$$f'(x_0) = 0 \blacksquare$$

### 3. Modello di applicazione

Questo teorema ci è utile in quanto ci permette di costruire un *modello* per risolvere un certo tipo di problemi: vedere dunque la *sezione 3* di [Modelli di problemi su derivate](#).

## Teorema di Rolle

*Teorema di Rolle: enunciato, dimostrazione e interpretazione grafica.*

### 1. Enunciato del teorema di Rolle


#Teorema

#### Teorema 1.1. (di Rolle)

Sia  $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ , sia  $f$  *continua* su  $[a, b]$  e *derivabile* su  $]a, b[$ .  
Sia inoltre  $f(a) = f(b)$ . Riassumendo ho la situazione in *figura 1.1.*  
Allora si verifica che

$$\boxed{\exists \xi \in ]a, b[ : f'(\xi) = 0}$$

**FIGURA 1.1.** (*Situazione grafica delle supposizioni*)



## 2. Dimostrazione

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del *teorema di Rolle* (^2d8bff)

Prima di dimostrare il teorema a tutti gli effetti, svolgo la seguente osservazione preliminare.

---

**OSS 2.1.** (*Osservazione preliminare*) Notiamo che  $f$  è *continua* per tutto il suo dominio, quindi per il *teorema di Weierstraß* (Teoremi sulle funzioni continue > ^918fc1) sappiamo che *esistono* almeno un *massimo* e *minimo* di  $f$  (Funzioni > ^e1ab12).

---

Ora distinguo due casi, dove "*posiziono*" questi punti di max e min precedentemente osservati:

1. Tutti i punti di *massimo* e *minimo* assoluto sono agli estremi, dunque gli stessi: allora in questo caso se il massimo assoluto è lo stesso del minimo assoluto di una funzione allora si tratta di una *funzione costante* del tipo  $f(x) = c \in \mathbb{R}$ .  
Però calcolandone la derivata  $(c)' = 0$  troviamo che la proposizione

$$f'(x) = 0$$

è *sempre* vera nel suo dominio.

2. Almeno uno fra *massimo* e/o *minimo* assoluto della funzione è *punto interno* a  $[a, b]$  (*Punti interni, esterni e di frontiera* > ^c78831). Dunque chiamo quel punto  $\xi$ .


Però sapendo che  $f$  è *non-costante*, *derivabile*, *continua* e il punto scelto è *interno*, allora per il *teorema di Fermat* (*Teorema di Fermat* > ^8ab68b) trovo che

$$f'(\xi) = 0 \blacksquare$$

### 3. Interpretazione geometrica (dimostrazione grafica)

**OSS 3.1.** (*Interpretazione-dimostrazione grafica del teorema*) Si nota che è possibile dare una buona interpretazione grafica a questo teorema; anzi è addirittura possibile dare una dimostrazione *grafica* considerando i casi disegnati nella dimostrazione.

**FIGURA 3.1.** (*Disegno*)



## Teorema di Cauchy

Teorema di Cauchy: enunciato e dimostrazione. Osservazione grafica (da vedere dopo aver visto quella di Lagrange)

## 1. Enunciato del teorema di Cauchy

#Teorema

### Teorema 1.1. (di Cauchy)

Siano  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  *continue* in  $[a, b]$  ([Definizione di continuità > ^ddf65d](#)), *derivabili* in  $]a, b[$  ([Derivata e derivabilità > ^6e7606](#)).

Sia inoltre  $\forall x \in ]a, b[, g'(x) \neq 0$ . (*ipotesi supplementare*)

Allora vale che

$$\exists \xi \in ]a, b[ : \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

## 2. Dimostrazione

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del *teorema di Cauchy* ([^0c9255](#))

Prima di tutto "*do un senso*" all'ipotesi supplementari: provo dunque  $g(b) - g(a)$  (

Infatti supponendo che, per assurdo, se fosse tale allora per il *teorema di Rolle* ([Teorema di Rolle > ^2d8bff](#)) avrei un  $\xi$  per cui si annullerebbe  $g'(\xi)$ . Infatti si avrebbe la divisione per una quantità che è uguale a 0.

Pertanto è necessario che  $g'(x) \neq 0 \implies g(b) \neq g(a)$ .

Ora considero una funzione che chiameremo "*phi grande*"  $\Phi$ :

$$\Phi(x) = f(x)(g(b) - g(a)) - g(x)(f(b) - f(a))$$

Quindi considerandola scopro le seguenti.

- Il dominio di  $\Phi$  è lo stesso di  $f, g$ .
- $\Phi$  è *continua* in  $[a, b]$  in quanto si tratta di una *sottrazione* tra funzioni continue ([Teoremi sulle funzioni continue > ^41a8ec](#)).
- $\Phi$  è *derivabile* in  $]a, b[$  per motivo analogo di prima ([Proprietà delle derivate > ^fd716f](#)).

Dato che  $\Phi$  è continua, posso calcolare  $\Phi(a)$  e  $\Phi(b)$ .

1.  $\Phi(a)$  diventa

$$\begin{aligned}
\Phi(a) &= f(a)(\dots) - g(a)(\dots) \\
&= f(a)g(b) - f(a)g(a) - f(b)g(a) + f(a)g(a) \\
&= f(a)g(b) - f(b)g(a)
\end{aligned}$$

2.  $\Phi(b)$  diventa invece

$$\begin{aligned}
\Phi(b) &= f(b)(\dots) - g(b)(\dots) \\
&= f(b)g(b) - f(b)g(a) - f(b)g(b) + f(a)g(b) \\
&= f(a)g(b) - f(b)g(a)
\end{aligned}$$

Ora scopro che

$$\Phi(b) = \Phi(a)$$

Quindi per il *teorema di Rolle* ([Teorema di Rolle > ^2d8bff](#)) ho

$$\exists \xi \in ]a, b[ : \Phi(\xi) = 0$$

Ora considero la sua derivata  $\Phi'$  e la "*calcoliamo*" in  $\xi$ . Svolgendo i conti ottengo

$$\begin{aligned}
\Phi'(x) &= (f(x)(g(b) - g(a)))' - (g(x)(f(b) - f(a)))' \\
&= f'(x)(g(b) - g(a)) - g'(x)(f(b) - f(a)) \\
\implies \Phi'(\xi) &= f'(\xi)(g(b) - g(a)) - g'(\xi)(f(b) - f(a)) = 0 \\
&= \boxed{\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}} \blacksquare
\end{aligned}$$

**OSS 2.1.** Se nel *teorema di Cauchy* ([^0c9255](#)) supponessimo di *non* far valere l'ipotesi aggiuntiva  $g'(x) \neq 0$ , allora si potrebbe comunque dire che

$$\boxed{\exists \xi \in ]a, b[ : f'(\xi)(g(b) - g(a)) = g'(\xi)(f(b) - f(a))}$$

### 3. Interpretazione grafica

*Nota: qui si consiglia fortemente prima di leggere l'interpretazione grafica del teorema di Lagrange ([Teorema di Lagrange](#)) per poter capire bene questa osservazione.*

**OSS 3.1.** (*Interpretazione grafica*) Con il *teorema di Lagrange* abbiamo visto che la sua interpretazione grafica consiste nell'intravedere che esiste un punto per il quale la sua tangente è parallela alla retta secante di  $a, b$  ([Teorema di Lagrange > ^a12a1e](#)).

Ora ci chiediamo come sarebbe possibile interpretare il *teorema di Cauchy* da un punto di vista grafico.

Immaginiamo innanzitutto che  $f, g$  siano delle *leggi orarie* ([Introduzione al Calcolo Differenziale > ^56240d](#)) che vivono in  $[a, b]$ .

Ora immaginiamo di "*appiattare*" la funzione  $f$ , "*distorcendo*" la funzione  $g$ : quindi disegniamo una specie di piano cartesiano in cui la retta delle ascisse viene rappresentata da  $f(x)$ , la retta delle ordinate invece da  $g(x)$ .

Immaginandoci questo piano, posizioniamo il punto  $A : (f(a), g(a))$  e l'altro punto  $B : (f(b), g(b))$ .

Possiamo disegnare una specie di *funzione* che parte da  $A$  e finisce in  $B$ : però in realtà non si tratta di una vera funzione in quanto non vi è nessun nesso tra  $f$  e  $g$ , quindi questa linea può comportarsi come vuole.

Ora immagino il vettore  $\overrightarrow{AB}$  ([Vettori Applicati > ^8447d6](#)) come il "*vettore di spostamento*" e il "*vettore velocità*" rappresentato da

$$\overrightarrow{P} : (f'(\xi), g'(\xi))$$

ovvero prendendo un qualsiasi punto della *linea* disegnata prendo la sua tangente.

Allora per il *teorema di Cauchy* sappiamo che

$$f'(\xi)(g(b) - g(a)) = g'(\xi)(f(b) - f(a))$$

Allora considerando la matrice quadrata  $2 \times 2$   $M_2(\mathbb{R})$  ([Matrice > ^a95650](#))

$$A = \begin{pmatrix} f(b) - f(a) & g(b) - g(a) \\ f'(\xi) & g'(\xi) \end{pmatrix}$$

Ora prendendo il *determinante* ([Determinante > ^2bb1d4](#)) sappiamo che per *Cauchy* abbiamo


$$\det A = 0$$

Di conseguenza i vettori

$$\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{P}$$

sono *paralleli*.

**FIGURA 3.1.** (*Idea dell'interpretazione geometrica*)



**OSS 3.2.** (*Cosa succede in uno spazio a tre dimensioni*) Vedere [Conseguenze del teorema di Cauchy e di Lagrange](#) in quanto la ritengo una pagina più appropriata per contenere tale informazione. Vedere l'[osservazione 1.2.](#).

## Teorema di Lagrange

*Teorema di Lagrange: enunciato, dimostrazione e interpretazione grafica.*

### 1. Enunciato del teorema di Lagrange

#Teorema

#### Teorema 1.1. (di Lagrange)

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  *continua* in  $[a, b]$  e *derivabile* in  $]a, b[$  ([Definizione di continuità > ^ddf65d](#), [Derivata e derivabilità > ^6e7606](#)).

Allora si verifica il seguente:

$$\exists \xi \in ]a, b[ : f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

## 2. Dimostrazione del teorema di Lagrange

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del *teorema di Lagrange* ([^ef03c2](#))

Per dimostrare il *teorema di Lagrange* basta considerare il *teorema di Cauchy* ([Teorema di Cauchy > ^0c9255](#)) per  $g(x) = x$ ; possiamo verificare che  $(x)'$  non sarà *mai* 0, in quanto la derivata della funzione identità è 1; infatti  $1 \neq 0$ .

Infatti per questo motivo si potrebbe considerare il *teorema di Lagrange* come un *corollario* del *teorema di Cauchy*. ■

## 3. Interpretazione grafica


**OSS 3.1.** (*Interpretazione grafica*) Osserviamo che l'espressione

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

è *equivalente* al *rapporto incrementale*  $R_a^f(b)$  ([Rapporto Incrementale > ^ccc58b](#)).


Quindi il *teorema di Lagrange* ci sta semplicemente dicendo che se considerando la *retta secante* (che chiamiamo  $r_{ab}$ ) tra il punto  $(a, f(a))$  e  $(b, f(b))$  allora dev'esserci *almeno* un punto per cui la sua tangente è *parallela* a  $r_{ab}$ .

**FIGURA 3.1.** (*Idea grafica*)



**FIGURA 3.2.** (*Idea grafica 2, tratto da "Le Matematiche" di A. D. Aleksandrov, A. N. Kolmogorov, M. A. Lavrent'ev*)





## A6. Teorema di de l'Hôpital

### Teorema di De l'Hôpital

*Uno dei strumenti più potenti e versatili dell'analisi matematica: il teorema del marchese De l'Hôpital*

## 0. Curiosità storiche

### TRATTO DAL SITO

<http://scienzaemusica.blogspot.com/2012/06/de-lhopital-e-il-quesito-dellesame-di.html>

L'Hôpital nacque in una ricca famiglia.

Il padre, Anne-Alexandre, era un *"pezzo grosso"* dell'epoca; infatti, tra le altre cose, fu generale dell'esercito del Re.

Se, da piccolo, il piccolo Guillaume intraprese una *carriera militare*, in seguito dovette abbandonarla a causa di rilevanti *problemi alla vista*.

Ergo, il suo interesse si spostò verso la Matematica.

Nei primi anni '90 del XVII secolo, de l'Hôpital ingaggiò Johann Bernoulli affinché gli insegnasse il calcolo infinitesimale.

Il marchese si mostrò così interessato all'argomento che lo imparò in breve tempo e che riassunse in un manuale intitolato *"Analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes"*, datato 1696.

Il suddetto rappresenta il *primo manuale di calcolo infinitesimale d'Europa!*

Rouse Bell scrive a proposito del libro di de l'Hôpital:

*"Il merito di aver redatto il primo trattato che spiega i principi e l'uso del metodo va tutto a de l'Hôpital...Questo lavoro ebbe ampia circolazione; rese la notazione differenziale di uso comune in Francia e contribuì a diffonderla in Europa."*

Sappiamo che de l'Hôpital, dal 1694, pagò Bernoulli ben 300 franchi all'anno per raccontargli delle sue scoperte, descritte poi nel suo testo.

Nel 1704, a seguito del decesso di de l'Hôpital, Bernoulli raccontò dell'accordo, asserendo che molti dei risultati nell'*Analyse des infiniment petits* erano opera sua!

## 1. Enunciato del teorema

### #Teorema

#### Teorema 1.1. (di De l'Hôpital)

Siano  $f, g : [a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$ .

Supponiamo che  $f, g$  siano *derivabili* (Derivata e derivabilità > ^12c1df).

Supponiamo inoltre che per ogni punto ( $a$  *escluso*) nel dominio la derivata  $g'$  *non* si annulla mai;

$$\forall x \in ]a, b[, g'(x) \neq 0$$

Supponiamo infine che il *limite destro* di  $b$  per  $f, g$  sono nulli.

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = 0$$

Se esiste il limite

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \tilde{\mathbb{R}}$$

Allora esiste il limite

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

$$\boxed{\exists L \in \tilde{\mathbb{R}} : \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \implies \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = L}$$

## 2. Dimostrazione del teorema

**OSS 2.1.** (*Osservazione preliminare*) Supponendo  $g(b) = 0$  e  $g'(x) \neq 0$  per  $]a, b[$ , potrà esserci mai un  $x_0 \in ]a, b[$  tale che  $g(x_0)$  si annulla? No, in quanto se no avremmo  $g(x_0) = g(b) = 0$  e per il *teorema di Rolle* ([Teorema di Rolle > ^2d8bff](#)) avremmo un  $\xi$  in  $]a, b[$  tale che la derivata  $g'$  si annullerebbe; il che è *assurdo*, in quanto contraddice con le supposizioni iniziali.

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del *teorema di De l'Hôpital* ([^67a7cd](#))

Prima di tutto per comodità "*prolungo*" le funzioni  $f, g$  in  $b$  ponendo  $f(b) = g(b) = 0$ ; ciò è consentito e non sarebbe restrittivo in quanto le funzioni rimarrebbero comunque *continue* e *derivabili* in  $]a, b[$ .

Ora tenendo in conto l'osservazione preliminare (**OSS 2.1.**, [^ce8190](#)), ha senso considerare la frazione

$$\frac{f(x)}{g(x)}, \forall x \in ]a, b[$$

Allora "*facendo finta di conoscere*" il limite

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \mathbb{R}$$

Che tradotto "*alla Cauchy*" ([Definizione di Limite di funzione > ^0f845a](#)) vorrebbe dire

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in ]a, b[ \\ b - \delta < x < b \implies \left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - L \right| < \varepsilon$$

Ora considero un punto nell'intervallo  $x \in ]b - \delta, b[$  e applico il *teorema di Cauchy* ([Teorema di Cauchy > ^0c9255](#)) alle funzioni  $f, g$  in  $[x, b]$ .

Ovvero

$$\exists \xi \in ]x, b[: \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(x)}{g(b) - f(x)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

e sappiamo che  $x < \xi < b$ .

Pertanto considerando che  $x$  non è altro che un punto tra  $b - \delta$  e  $b$ , si potrebbe "maggiorare"  $\xi$  come  $b - \delta < \xi < b$ .

Allora questa uguaglianza vale per l'intorno considerato per  $x$ : mettendo tutto assieme e riconsiderando la definizione "alla Cauchy" del limite precedentemente scritto, abbiamo

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in ]a, b[ \\ b - \delta < x < b \implies \left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| < \varepsilon$$

che è proprio la *definizione* del limite

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = L \blacksquare$$

**OSS 2.2.** (Il teorema vale anche per il limite verso l'infinito) Se al posto di  $b$  un numero *finito* pongo  $b = +\infty$ ; allora il teorema varrebbe lo stesso. Basta ragionare con la definizione  $\varepsilon$ - $N$  al posto di  $\varepsilon$ - $\delta$ .

**OSS 2.3.** (Il teorema vale anche per il caso  $\frac{\infty}{\infty}$ ) Questo teorema vale anche se si verificano entrambi i limiti:

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = +\infty = \lim_{x \rightarrow b^-} g(x)$$

**OSS 2.4.** (Il teorema vale anche per  $L = +\infty$ ) Questo teorema vale anche se il limite  $L$  vale  $+\infty$ .

### 3. Utilità pratica

#### Proposizione 3.1. (utilità pratica del teorema di De l'Hôpital)

Se in un limite ho un *caso indeterminato* del tipo

$$\frac{0}{0} \text{ oppure } \frac{\infty}{\infty}$$

e se ho

$$g'(x) \neq 0$$

Allora posso calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

il quale risultato sarà lo stesso del limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

A parole, se ho un *caso indeterminato* e ho la funzione sul denominatore che non si annulla mai, allora posso derivare entrambe le frazioni per avere un limite *"equivalente"*.

**ATTENZIONE!** Questo non è un teorema del tipo *"se e solo se"*; l'implicazione qui è univoca, pertanto non deve *necessariamente* valere il viceversa.

## B. DALLA TEORIA ALLA PRASSI

### B1. Esempi di derivate, funzioni derivabili/non

---

#### Esempi di derivate

*Esempi di funzioni derivabili e il calcolo delle loro derivate: tutte (più o meno) le funzioni elementari. Esempi di funzioni non derivabili.*

---

### B2. Figli di Cauchy e Lagrange

---

#### Conseguenze del teorema di Cauchy e di Lagrange

*Conseguenze che discendono dai teoremi di Cauchy e Lagrange: conseguenze pratiche e conseguenze di natura "matematica".*

---

## 1. Considerazioni Pratiche e Quotidiane

### Lagrange e il sistema "Tutor"

**OSS 1.1.** (*Il sistema Tutor*) Dal 2004 è stato introdotto il cosiddetto sistema *"Tutor"* sulle autostrade italiane, al fine di determinare se stiamo rispettando le

limitazioni di velocità o meno.

Il sistema *Tutor* consiste nel seguente: lungo l'autostrada si fissano piazzano due telecamere, tra le quali c'è una distanza  $s$ . Allora queste fotocamere fotografano le nostre automobili e registrano i seguenti dati: la targa del veicolo e l'istante del tempo in cui siamo stati ripresi. L'idea di questo sistema viene raffigurato nella *figura 1.1*.

Quindi una volta passate entrambe le telecamere, le autorità hanno dei dati per determinare una misura importante: la nostra *velocità media* ([Introduzione al Calcolo Differenziale > ^190e60](#)).

Infatti loro hanno

$$v_m = \frac{s}{t_2 - t_1} = R_{t_2}^x(t_1)$$

Ipotizziamo di aver infranto la legge e di aver superato ad un certo punto la velocità massima 130 km/h, ricevendo così una multa. Tuttavia, notiamo qualcosa: una parte del testo afferma che secondo il *codice della strada* (CdS) la *velocità istantanea* non può essere superata di 130 km/h: quindi c'è un errore! Loro hanno semplicemente misurato la nostra *velocità media*, non quella *istantanea*!


Allora presentiamo un ricorso al giudice per farci annullare la multa; inaspettatamente il giudice si rivela di essere un esperto di matematica e richiama il *teorema di Lagrange* ([Teorema di Lagrange > ^ef03c2](#)), affermando che se la nostra velocità media  $v_m$  ha ad un certo punto superato il limite, allora c'è almeno un istante di tempo  $t_\xi$  tale che la velocità istantanea misurata è maggiore del limite previsto.

Ovvero

$$v_m = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} > 130 \implies \exists t_\xi \in ]t_2, t_1[: x'(t_\xi) = v(t_\xi) > 130$$

Quindi, alla fine niente ricorso per noi.

**FIGURA 1.1.** (*Idea grafica del sistema Tutor*)



## Cauchy nel nostro spazio tridimensionale

### OSS 1.2. (Interpretazione geometrica di Cauchy in $\mathbb{R}^3$ )

Dall'interpretazione geometrica di Cauchy in  $\mathbb{R}^2$  (Teorema di Cauchy > ^30644e) vediamo due *punti* nello spazio, la retta secante di questi due punti e per *Cauchy* vediamo che almeno c'è almeno un punto per cui il suo "*vettore velocità*" è parallela a questa retta secante.

Ora ci chiediamo il seguente: "*come funzionerebbe in  $\mathbb{R}^3$ ?*"

Allora in questo caso immaginiamo una situazione simile, solo che ci immaginiamo una mosca che gironzola da un punto iniziale  $a$  fino ad un punto finale  $b$ , e la retta secante tra  $a$  e  $b$  sarebbe la "*pendenza*". La situazione verrà raffigurata nella *FIGURA 1.2.*


Varrebbe comunque il *teorema di Cauchy* qua? La risposta è *no*.

Infatti se ragioniamo sulle *strade*, vediamo che spesso le strade di montagne tendono ad avere molte curve e tornanti; queste servono infatti a "*diminuire*" la pendenza dal punto di partenza fino alla montagna! Infatti, se *Cauchy* valesse anche qui, saremmo tutti costretti ad un certo punto di salire il passo con la stessa "*pendenza*" della "*retta*" che collegherebbe il punto di partenza fino alla destinazione.


Un caso più eclatante è quello delle *scale a chiocciola*; infatti queste rendono possibile per noi di salire verticalmente da un punto all'altro senza dover affrontare pendenze incamminabili.

I gradini di queste scale servono ad "*appiattare*" la pendenza; l'idea di questo concetto viene raffigurato in *figura 1.3.*

**FIGURA 1.2.** (*Idea della situazione*)



**FIGURA 1.3.** (*Scale a chiocciola*)





## 2. Considerazioni "Astratte"

### Derivate nulle e funzioni costanti

#Teorema

**Teorema 2.1. (derivata nulla è sempre una costante)**

Suppongo  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  *derivabile* in  $I$  ([Derivata e derivabilità > ^478a87](#)).  
Supponendo che  $\forall x \in I, f'(x) = 0$  allora si ha che  $f(x) = c \in \mathbb{R}$ .

$$f'(x) = 0 \implies f(x) = c \in \mathbb{R}$$

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del *teorema 2.1.* ([^19eb72](#))

Dimostriamo questo teorema con *Lagrange* ([Teorema di Lagrange > ^ef03c2](#)) e usando il ragionamento *per assurdo*.

Partiamo supponendo  $f'(x) = 0$ .

Ora supponiamo, per assurdo, che  $f$  sia una funzione *non costante*; ovvero ci sono due punti  $x_1, x_2 \in I$  tali che le loro immagini sono diverse.

$$\exists x_1, x_2 \in I : f(x_1) \neq f(x_2)$$

Ora posso applicare il *teorema di Lagrange* sull'intervallo  $[x_1, x_2]$ ; questo è ammissibile in quanto abbiamo  $f$  *derivabile* su  $I$ , pertanto  $f$  è anche *continua* su  $I$  ([Proprietà delle derivate > ^dac6dc](#)). Inoltre  $[x_1, x_2] \subseteq I$ .

Allora per il *teorema di Lagrange*,

$$\exists \xi \in ]x_1, x_2[ : f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Tuttavia notiamo che il numeratore non può essere mai 0 in quanto per ipotesi  $f(x_1), f(x_2)$  sono diverse e analogamente neanche il denominatore può essere mai 0.

Allora si avrebbe  $f'(\xi) \neq 0$ ; però questo è impossibile in quanto questo contraddirebbe con la tesi  $f'(\xi) = 0$ .

**OSS 2.1.** (*Intervallo come condizione*) Notiamo che per essere vero questo teorema,  $I$  deve essere definita su un *intervallo*, perché senno avrei dei "*buchi*" su cui la funzione può compiere dei "*salti*".

### Crescenza e derivate

#Teorema

**Teorema 2.2. (la derivata positiva significa funzione crescente)**

Sia  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  *derivabile*.

Allora  $f$  è *crescente* su  $I$  se e solo se la sua derivata è positiva;

$$f \text{ crescente su } I \iff \forall x \in I, f'(x) \geq 0$$

#Dimostrazione

**DIMOSTRAZIONE** del *teorema 2.2.* (^45aa1e)

" $\implies$ ": Supponiamo  $f$  *crescente* su  $I$ . Allora fissando  $x_0 \in I$ , posso considerare il *rapporto incrementale*  $R_{x_0}^f(x)$ ;

$$R_{x_0}^f(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Però visto che  $f$  crescente sappiamo che se  $x > x_0$ , allora  $f(x) \geq f(x_0)$ ; invece se  $x < x_0$  allora  $f(x) \leq f(x_0)$ . Pertanto in entrambi i casi abbiamo la divisione di due *segni concordi*, quindi il rapporto incrementale sarà sempre positivo per  $x \neq x_0$ .

Quindi  $R_{x_0}^f(x) \geq 0$ .

Prendendo il limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R_{x_0}^f(x)$$

possiamo usare la *permanenza del segno* (*Teoremi sui Limiti di Funzione* > ^06a2e3) "*alla rovescia*" per dire che anche il *limite* del rapporto incrementale, che non è altro che la *derivata*  $f'(x_0)$ , è sempre *positiva*.

Pertanto abbiamo verificato che

$$f \text{ crescente} \implies R_{x_0}^f(x) \geq 0 \implies f'(x) \geq 0$$

" $\impliedby$ ": Sia la derivata  $f'(x)$  *sempre* positiva, per  $\forall x \in I$ .

Allora per assurdo suppongo che  $f$  *non* sia crescente: ovvero abbiamo una situazione in cui almeno due punti non sono "*più alti dell'altro*".

$$\exists x_1, x_2 \in I : x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$$

Allora posso applicare il *teorema di Lagrange* (*Teorema di Lagrange* > ^ef03c2) sull'intervallo  $[x_1, x_2]$  per trovare l'assurdo come prava: infatti

$$\exists \xi \in ]x_1, x_2[ : \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$$

e per ipotesi questa frazione è *negativa*, in quanto abbiamo la moltiplicazione

di due segni *discordi*. Però questo è assurdo in quanto all'inizio abbiamo supposto  $f'(x)$  sempre positiva.

## B3. Esempi di problemi sulle derivate

### Modelli di problemi su derivate

*Esempi di problemi sulle derivate: trovare la retta tangente di un punto nella funzione, dimostrazione dell'ortogonalità della retta tangente di un cerchio e raggio del cerchio.*

#### 1. Problema delle tangenti di un punto

#### 2. Ortogonalità della retta tangente di un cerchio e raggio del cerchio

#### 3. Problemi di massimo e/o minimo

##### Modello 3.1. (problema di massimo e/o minimo)

Suppongo di avere  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , che sia *continua* (Definizione di continuità > ^ddf65d), che sia derivabile (*almeno*) su  $]a, b[$ .

1.  $f$  ha minimo e/o assoluto? Sì, per il *teorema di Weierstraß* (Teoremi sulle funzioni continue > ^918fc1)
2. Dove si trovano questi punti di massimo e/o minimo assoluto? Usiamo il *teorema di Fermat* (Teorema di Fermat > ^8ab68b) per costruire l'*insieme dei punti stazionari* unito agli "*estremi*"  $P$  dove

$$P = \{x \in ]a, b[ \mid f'(x) = 0\} \cup \{a, b\}$$

3. Come faccio ad individuare gli effettivi  $\max$ ,  $\min$  di  $f$ ? Basta prendere  $\max(f(P))$  e  $\min(f(P))$ .

## B4. Tabella delle derivate

# Tabella delle derivate

Tabella delle derivate.

## 1. Tabella delle derivate delle funzioni elementari

Vedere [Esempi di derivate](#) per eventuali "dimostrazioni" di alcune derivate.

$f$	$f'$
$c \in \mathbb{R}$	0
$\text{id}_x$	1
$x^n, n \in \mathbb{N}$	$nx^{n-1}$
$e^x$	$e^x$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$