

ЛАМІКОН



СПРИЯЄ ЗНИЩЕННЮ
ГРИБКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
ШКІРИ!^{1,2,3,6}



ЛАМІКОН®. Склад: тербінафін гідрохлорид. Форма випуску: крем 1% по 15 г у тубах № 1, спрей нащіркний 1% по 25 г у флаконі № 1, гель 1% по 15 г, 30 г в тубах № 1. Код АТС: D01A E15. **Показання:** грибкові інфекції шкіри, спричинені такими дерматофітами, як *Trichophyton*, *Microsporum canis* і *Epidemophyton floccosum*, наприклад, дерматофітії стоп; пахова дерматофітія; дерматофітія тулуба; кандидоз шкіри, спричинений грибками роду *Candida*, зазвичай *Candida albicans*; різноварійний лишай, спричинений *Pityrosporum orbiculare*. **Протипоказання:** підвищена чутливість до тербінафіну або до будь-якого з компонентів препарату. **Побічні ефекти:** місцеві прояви, такі як свербіж, лущення або печиння шкіри, біль та подразнення у місці нанесення, порушення пігментації, еритема, утворення кірки та інші можуть спостерігатись у місці нанесення очей. У рідкісних випадках прихована грибкова інфекція може загостритись. **Умови зберігання:** зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C. Заморожування препарату не допускається. Зберігати у недоступному для дітей місці. Р.П. № UA/2714/02/01 від 30.03.2015 № 182; № UA/2714/03/01 від 20.03.15 № 164; № UA/2714/04/01 від 11.05.2018 № 907.

ЛАМІКОН®. Дюча речовина: terbinafine. Форма випуску: таблетки 250 mg №14. **Показання:** Грибкові інфекції шкіри і нігтів, спричинені *Trichophyton* (наприклад, *T. rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. violaceum*), *Microsporum* і *Epidemophyton floccosum*. Стригучий лишай (трихофітія гладкої шкіри, трихофітія промежини і дерматофітія стоп), коли локалізація ураження, вираженість або поширеність інфекції зумовлюють доцільність пероральної терапії. Оніхомікоз. **Протипоказання:** Гіперчутливість до тербінафіну або до будь-яких допоміжних речовин препарату. Побічні реакції: Ламікон® добре переносяться. **Побічні дії** зазвичай слабко і помірно виражені і мають скромну характер. З боку системи крові та лімфатичної системи: нейтропенія, агранулоцитоз, тромбопітіопенія, анемія, панцитопенія. З боку імунної системи: анафлактоїдні реакції (у тому числі набряк Квінке), шкірний та системний червоний вовчак, анафлактичні реакції, реакції, подібні до симптомів сироваткової хвороби, алєргічні реакції, включаючи анафлаксію. З боку метаболізму та харчування: зниження апетиту. З боку психіки: тривожність та депресивні симптоми, вторинні до розладів смаку. З боку нервової системи: головний біль, порушення відчуття смаку, у тому числі втрати смаку, що зазвичай відновлюється через кілька тижнів після припинення прийому препарату; повідомлялося про тривале порушення смаку, що іноді призводить до зниження споживання їжі та значної втрати маси тіла; запамороччення, парестезія, гіпестезія, аномсія, включаючи постійну аномсію, гіпосмію. Р.П. МОЗ України, №UA/2714/01/01 № 1006 від 25.12.2014.

1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Ламікон крем. 2. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Ламікон дермгель. 3. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Ламікон спрей. 4. Л.А. Болотна, К.С.Шмелкова «Оптимізація місцевої терапії при дерматофітіях»//Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2011. – №3. – С.87 – 92. 5. M.F. de Chauvin «Дослідження з вивчення деконтамінації устіл, колонізованих *Trichophyton rubrum*: ефект 1% порошку – спрею тербінафіну і 1% розчину – спрею Тербінафіну»//Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2012. – №1. – С.111–116. Р.П. 6. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Ламікон таблетки. 7. Shi TW1, Zhang JA «Combination treatment of oral terbinafine with topical terbinafine and 10% urea ointment in hyperkeratotic type tinea pedis». Mycoses. 2014 Sep;57(9):560–4.

Реклама лікарських засобів. Інформаційний матеріал для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. За повною інформацією про препарат можна ознайомитись в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Переваги ЛАМІКОН^{1-3,7}

ЛАМІКОН ДЕРМГЕЛЬ | Спирт етиловий 96 %

- ✓ Охолоджуючий ефект²⁻⁴
- ✓ Протисвербіжна дія²⁻⁴

ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ^{2,4}

- ✓ Печіння шкіри
- ✓ Виражений свербіж



ТРИВАЛІСТЬ ТА ЧАСТОТА ЛІКУВАННЯ²

Діагноз	Кількість застосувань	Курс лікування
Дерматофітія стоп	1 раз на добу	1 тиждень
Трихофітії гладенької шкіри	1 раз на добу	1 тиждень
Різnobарвний лишай	1 раз на добу	1 тиждень



НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

Широкий спектрпротигрибкової дії

ЛАМІКОН КРЕМ | Містить осмотично активну емульсійну основу і натрію гідроксид

- ✓ М'яка кератолітична дія^{1,4}
- ✓ Пом'якшуоча дія^{1,4}
- ✓ Помірно поглинає ексудат^{1,4}

ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ^{1,4}

- | | |
|-----------|-------------|
| ✓ Сухість | ✓ Ерозії |
| ✓ Тріщини | ✓ Мацерація |



ТРИВАЛІСТЬ ТА ЧАСТОТА ЛІКУВАННЯ¹

Діагноз	Кількість застосувань	Курс лікування
Дерматофітія стоп	2 рази на добу	2 тижні
Дерматофітія тулуби та пахова дерматофітія	1 раз на добу	1 тиждень
Різnobарвний лишай	1–2 рази на добу	2 тижні
Кандидоз шкіри	1–2 рази на добу	1 тиждень

Виробник: АТ «Фармак», 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.
тел.: +38 (044) 239-19-40 | факс: +38 (044) 485-26-86
e-mail: info@farmak.ua | веб-сайт: www.farmak.ua

Тривала протигрибкова дія

ЛАМІКОН СПРЕЙ | Бензойна кислота і осмотичні компоненти (пропіленгліколь)

- ✓ Швидкість та простота в нанесенні^{3,5}
- ✓ Підсушуюча дія^{3,5}

ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ^{3,4,5}

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ✓ Мокнуття, везикуляція | ✓ Нанесення в тяжкодоступні місця (особливо у повних людей) |
| ✓ Обробка великих поверхонь шкіри | |



Швидкий початок дії

Протизапальна та антибактеріальна активність

Ламикон таблетки | 250 мг №14

- ✓ Зручний режим дозування⁶
- ✓ Тривала протигрибкова дія (36 год).^{6,7}
- ✓ Висока концентрація в тканинах^{6,7}

ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ^{3,4,5}

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ✓ Велика поверхня шкіри ⁶ | ✓ Для прискорення одужання в комбінації з місцевою терапією ^{6,7} |
| ✓ Важкодоступні місця ^{6,7} | |



ТРИВАЛІСТЬ ТА ЧАСТОТА ЛІКУВАННЯ³

Діагноз	Кількість застосувань	Курс лікування
Дерматофітія стоп (міжпальцева, підошовна/ногти «мокасин»)	1 раз на добу	2–6 тижнів
Трихофітії гладенької шкіри	1 раз на добу	4 тижні
Трихофітія промежини	1 раз на добу	від 2 до 4 тижнів
Шкірний кандидоз	1 раз на добу	від 2 до 4 тижнів
Трихофіті волосистої частини голови	1 раз на добу	4 тижні
Оніхіоміоз, спричинений дерматофітами	1 раз на добу	6–12 тижнів

