

Studium - Analysis

V: 1.0

Inhalt

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Elementare Grundlagen | 2 |
| 1.1 | Mengen | 2 |
| 1.1.1 | Menge der natürlichen Zahlen | 2 |
| 1.1.2 | Menge der rationalen Zahlen | 2 |
| 1.1.3 | Keine Rationale Zahlen | 2 |
| 1.2 | Ungleichungen, Beträge, Intervalle | 3 |
| 1.2.1 | Allgemein | 3 |
| 1.2.2 | Intervalle | 3 |
| 1.2.3 | Betrag | 3 |
| 1.2.4 | Binomische Formeln | 3 |
| 1.2.5 | Potenzen, Logarithmen, Wurzeln | 4 |
| 1.3 | Logarithmus | 4 |
| 1.4 | Quadratische Gleichungen | 4 |
| 2 | Folgen und Reihen | 4 |
| 2.1 | Definition | 5 |
| 2.1.1 | Arithmetische Folgen | 5 |
| 2.1.2 | Geometrische Folgen | 5 |
| 3 | Glossar | 5 |

1 Elementare Grundlagen

1.1 Mengen

1.1.1 Menge der natürlichen Zahlen

$$\mathbb{N} = \{ 1, 2, 3, 4, \dots \}$$

Eigenschaften

1. Jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ hat genau einen Nachfolger, nämlich $n + 1$
2. Jede von 1 verschiedene natürliche Zahl n hat genau einen Vorgänger $n - 1$. Die Zahl 1 hat keinen Vorgänger.

Rechenoperationen

- $n_1 + n_2 \in \mathbb{N}$
- $n_1 \cdot n_2 \in \mathbb{N}$

1.1.2 Menge der rationalen Zahlen

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ mit } b \neq 0 \right\}$$

$\mid \rightarrow$ mit der Eigenschaft

Rechenoperationen

- +
- -
- ·
- /

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} \Leftrightarrow a_1 \cdot b_2 = a_2 \cdot b_1$$

$$\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} \Leftrightarrow \frac{a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1}{b_1 \cdot b_2}$$

$$\frac{a_1}{b_1} \cdot \frac{a_2}{b_2} \Leftrightarrow \frac{a_1 \cdot a_2}{b_1 \cdot b_2}$$

Rationale Zahlen lassen sich als periodische Dezimalzahlen darstellen:

$$\frac{6}{11} = 0.45454545 = 0.\overline{45}$$

1.1.3 Keine Rationale Zahlen

- $\sqrt{2} = 1.41421$
- $\pi = 3.141592$

\Rightarrow Menge der reellen Zahlen \mathbb{R}

Rechenoperationen

- +

- -
- ·
- /

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

→ Alle \mathbb{N} sind in \mathbb{Z} enthalten, ...

1.2 Ungleichungen, Beträge, Intervalle

1.2.1 Allgemein

:

- $a < b$, falls a links von b liegt
- $a = b$, falls beide Zahlen zusammenfallen
- $a > b$, falls a rechts von b liegt

$a < b, /a, b > 0$:

- $a < b \Rightarrow a + c < b + c$ für alle $c \in \mathbb{R}$
- $a \cdot b < b \cdot c$ für $c > 0$
- $a \cdot b > b \cdot c$ für $c < 0$

$$a > 0, b > 0 \Rightarrow a \cdot b > 0$$

$$a < 0, b < 0 \Rightarrow a \cdot b > 0 \text{ (minus mal minus = plus)}$$

1.2.2 Intervalle

$[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$ abgeschlossenes Intervall

$(a, b) =]a, b[= \{x \mid a < x < b\}$ offenes Intervall

$]a, b[= \{x \mid a < x \leq b\}$ halb offenes Intervall

1.2.3 Betrag

Der Betrag $|a|$ einer Zahl a ist der Abstand dieser Zahl vom Nullpunkt auf der Zahlengerade:

$$|a| = a \text{ oder } -a$$

- falls $a \geq 0$
- falls $a < 0$

$$\text{Beispiel: } |-5| = -(-5) = 5$$

1.2.4 Binomische Formeln

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$

1.2.5 Potenzen, Logarithmen, Wurzeln

$$a + a + a + \dots + a = n \cdot a$$

$$a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a = a^n \mid a: \text{Basis}, n: \text{Exponent}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n = \frac{1}{a^{-n}}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$a^n \cdot a^n = (a \cdot b)^n$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

$$\text{Beispiel: } \frac{1}{8^{\frac{2}{3}}} = 8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{64} = 4$$

1.3 Logarithmus

$$\log_2 8 = \frac{\log 8}{\log 2} = \frac{\ln 8}{\ln 2} = 3$$

Rechenregeln für Logarithmus

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$$

$$\log a^n = n \cdot \log a$$

$$\log \sqrt[n]{a} = \log a^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \log a$$

1.4 Quadratische Gleichungen

Mitternachtsformel

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

PQ Formel

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

2 Folgen und Reihen

$$1, 2, 3, 4, 5$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$$

$$2, 4, 8, 16, 32, 64$$

2.1 Definition

Eine Funktion, die jeder natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$ eine reelle Zahl zuordnet, heißt: Zahlenfolge und wird mit $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ oder $\{a_n\}$ mit $n \in \mathbb{N}$ bezeichnet. Die a_n heißen glieder der Folge; a_1 heißt Anfangsglied.

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots \mid a_n = n$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots \mid a_n = \frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots \mid a_n = \frac{n}{n+1}$$

$$2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots \mid a_n = 2^n$$

2.1.1 Arithmetische Folgen

Eine Folge $\{a_n\}$, bei der für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$a_{n+1} - a_n = d = \text{const.}, \text{ heißt arithmetische Folge. } d \text{ steht für die differenz.}$$

Beispiel

$$5, 8, 11, 14, 17 \mid d = 3$$

$$11, 6, 1, -4, -9 \mid d = -5$$

Wegen der konstanten Differenz d zweier Folgenglieder ist eine arithmetische Folge eindeutig durch das Anfangsglied a_1 und die konstante differenz d bestimmt.

$$a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$$

$$a_1; a_1 + d; a_1 + 2d; \dots; a_1 + (n-1)d$$

$$\text{Allgemeines Folgenglied einer arithmetischen Folge } a_n = a_1 + (n-1)d$$

2.1.2 Geometrische Folgen

Eine Folge $\{a_n\}$, bei für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q = \text{const.} \text{ heißt geometrische Folge. } q \text{ steht für den Quotient.}$$

Beispiel

$$2, 4, 8, 16, 32, \dots \mid q = 2$$

$$\frac{4}{3}, \frac{4}{9}, \frac{4}{27}, \frac{4}{81}, \dots \mid q = \frac{1}{3}$$

Wegen des konstanten Quotienten q ist eine geometrische Folge eindeutig durch a_1 und q bestimmt.

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n$$

$$a_1, a_1 \cdot q, a_1 \cdot q^2, a_1 \cdot q^3, \dots, a_1 \cdot q^n$$

3 Glossar

- Explizite / Rekursive Definition