

Studium - Analysis

V: 1.0

Inhalt

1 Elementare Grundlagen	2
1.1 Mengen	2
1.1.1 Menge der natürlichen Zahlen	2
1.1.2 Menge der rationalen Zahlen	2
1.1.3 Keine Rationale Zahlen	2
1.2 Ungleichungen, Beträge, Intervalle	3
1.2.1 Allgemein	3
1.2.2 Intervalle	3
1.2.3 Betrag	3
1.2.4 Binomische Formeln	3
1.2.5 Potenzen, Logarithmen, Wurzeln	4
1.3 Logarithmus	4
1.4 Quadratische Gleichungen	4
2 Folgen und Reihen	4
2.1 Definition	5
3 Glossar	5

1 Elementare Grundlagen

1.1 Mengen

1.1.1 Menge der natürlichen Zahlen

$$\mathbb{N} = \{ 1, 2, 3, 4, \dots \}$$

Eigenschaften

1. Jede natürliche Zahl $\epsilon \mathbb{N}$ hat genau einen Nachfolger, nämlich $n + 1$
2. Jede von 1 verschiedene natürliche Zahl n hat genau einen Vorgänger $n - 1$. Die Zahl 1 hat keinen Vorgänger.

Rechenoperationen

- $n_1 + n_2 \in \mathbb{N}$
- $n_1 \cdot n_2 \in \mathbb{N}$

1.1.2 Menge der rationalen Zahlen

$$\mathbb{Q} = \{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ mit } b \neq 0 \}$$

| → mit der Eigenschaft

Rechenoperationen

- +
- -
- ·
- /

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} \Leftrightarrow a_1 \cdot b_2 = a_2 \cdot b_1$$

$$\frac{a_1}{b_2} + \frac{a_2}{b_2} \Leftrightarrow \frac{a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1}{b_1 \cdot b_2}$$

$$\frac{a_1}{b_1} \cdot \frac{a_2}{b_2} \Leftrightarrow \frac{a_1 \cdot a_2}{b_1 \cdot b_2}$$

Rationale Zahlen lassen sich als periodische Dezimalzahlen darstellen:

$$\frac{6}{11} = 0.45454545 = 0.\overline{45}$$

1.1.3 Keine Rationale Zahlen

- $\sqrt{2} = 1.141421$
- $\pi = 3.141592$

⇒ Menge der reellen Zahlen \mathbb{R}

Rechenoperationen

- +

- -
- ·
- /

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

→ Alle \mathbb{N} sind in \mathbb{Z} enthalten, ...

1.2 Ungleichungen, Beträge, Intervalle

1.2.1 Allgemein

:

- $a < b$, falls a links von b liegt
- $a = b$, falls beide Zahlen zusammenfallen
- $a > b$, falls a rechts von b liegt

$a < b, /a, b > 0$:

- $a < b \Rightarrow a + c < b + c$ für alle $c \in \mathbb{R}$
- $a \cdot b < b \cdot c$ für $c > 0$
- $a \cdot b > b \cdot c$ für $c < 0$

$a > 0, b > 0 \Rightarrow a \cdot b > 0$

$a < 0, b < 0 \Rightarrow a \cdot b > 0$ (minus mal minus = plus)

1.2.2 Intervalle

$[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$ abgeschlossenes Intervall

$(a, b) =]a, b[= \{x \mid a < x < b\}$ offenes Intervall

$]a, b[= \{x \mid a < x \leq b\}$ halb offenes Intervall

1.2.3 Betrag

Der Betrag $|a|$ einer Zahl a ist der Abstand dieser Zahl vom Nullpunkt auf der Zahlengerade:

$|a| = a$ oder $-a$

- falls $a \geq 0$
- falls $a < 0$

Beispiel: $|-5| = -(-5) = 5$

1.2.4 Binomische Formeln

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$

1.2.5 Potenzen, Logarithmen, Wurzeln

$$a + a + a + \dots + a = n \cdot a$$

$a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a = a^n$ | a : Basis, n : Exponent

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n = \frac{1}{a^{-n}}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$${}^n\sqrt{a} = a^{\frac{2}{3}}$$

$$\text{Beispiel: } \frac{1}{8^{\frac{-2}{3}}} = 8^{\frac{2}{3}} = {}^3\sqrt{64} = 4$$

1.3 Logarithmus

$$\log_2 8 = \frac{\log 8}{\log 2} = \frac{\ln 8}{\ln 2} = 3$$

Rechenregeln für Logarithmus

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$$

$$\log a^n = n \cdot \log a$$

$$\log^n \sqrt{a} = \log a^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \log a$$

1.4 Quadratische Gleichungen

Mitternachtsformel

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

PQ Formel

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

2 Folgen und Reihen

1, 2, 3, 4, 5

1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$

$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{6}$

2, 4, 8, 16, 32, 64

2.1 Definition

Eine Funktion, die jeder natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$ eine reelle Zahl zuordnet, heißt: Zahlenfolge und wird mit $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ oder $\{a_n\}$ mit $n \in \mathbb{N}$ bezeichnet. Die a_n heißenglieder der Folge; a_1 heißt Anfangsglied.

3 Glossar

- Explizite / Rekursive Definition