

# Studium - Analysis

V: 1.0

## Inhalt

<b>1</b>	<b>Elementare Grundlagen</b>	<b>2</b>
1.1	Mengen . . . . .	2
1.1.1	Menge der natürlichen Zahlen . . . . .	2
1.1.2	Menge der rationalen Zahlen . . . . .	2
1.1.3	Keine Rationale Zahlen . . . . .	2
1.2	Ungleichungen, Beträge, Intervalle . . . . .	3
1.2.1	Allgemein . . . . .	3
1.2.2	Intervalle . . . . .	3
1.2.3	Betrag . . . . .	3
1.2.4	Binomische Formeln . . . . .	3
1.2.5	Potenzen, Logarithmen, Wurzeln . . . . .	4
1.3	Logarithmus . . . . .	4
1.4	Quadratische Gleichungen . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Folgen und Reihen</b>	<b>4</b>
2.1	Folgen - Definition . . . . .	5
2.1.1	Arithmetische Folgen . . . . .	5
2.1.2	Geometrische Folgen . . . . .	5
2.2	Reihen - Definition . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Glossar</b>	<b>6</b>

# 1 Elementare Grundlagen

## 1.1 Mengen

### 1.1.1 Menge der natürlichen Zahlen

$$\mathbb{N} = \{ 1, 2, 3, 4, \dots \}$$

#### Eigenschaften

1. Jede natürliche Zahl  $n \in \mathbb{N}$  hat genau einen Nachfolger, nämlich  $n + 1$
2. Jede von 1 verschiedene natürliche Zahl  $n$  hat genau einen Vorgänger  $n - 1$ . Die Zahl 1 hat keinen Vorgänger.

#### Rechenoperationen

- $n_1 + n_2 \in \mathbb{N}$
- $n_1 \cdot n_2 \in \mathbb{N}$

### 1.1.2 Menge der rationalen Zahlen

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ mit } b \neq 0 \right\}$$

$| \rightarrow$  mit der Eigenschaft

#### Rechenoperationen

- +
- -
- ·
- /

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} \Leftrightarrow a_1 \cdot b_2 = a_2 \cdot b_1$$

$$\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} \Leftrightarrow \frac{a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1}{b_1 \cdot b_2}$$

$$\frac{a_1}{b_1} \cdot \frac{a_2}{b_2} \Leftrightarrow \frac{a_1 \cdot a_2}{b_1 \cdot b_2}$$

Rationale Zahlen lassen sich als periodische Dezimalzahlen darstellen:

$$\frac{6}{11} = 0.45454545 = 0.\overline{45}$$

### 1.1.3 Keine Rationale Zahlen

- $\sqrt{2} = 1.41421$
- $\pi = 3.141592$

$\Rightarrow$  Menge der reellen Zahlen  $\mathbb{R}$

#### Rechenoperationen

- +

- -
- ·
- /

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

→ Alle  $\mathbb{N}$  sind in  $\mathbb{Z}$  enthalten, ...

## 1.2 Ungleichungen, Beträge, Intervalle

### 1.2.1 Allgemein

:

- $a < b$ , falls  $a$  links von  $b$  liegt
- $a = b$ , falls beide Zahlen zusammenfallen
- $a > b$ , falls  $a$  rechts von  $b$  liegt

$a < b, /a, b > 0$ :

- $a < b \Rightarrow a + c < b + c$  für alle  $c \in \mathbb{R}$
- $a \cdot b < b \cdot c$  für  $c > 0$
- $a \cdot b > b \cdot c$  für  $c < 0$

$$a > 0, b > 0 \Rightarrow a \cdot b > 0$$

$$a < 0, b < 0 \Rightarrow a \cdot b > 0 \text{ (minus mal minus = plus)}$$

### 1.2.2 Intervalle

$[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$  abgeschlossenes Intervall

$(a, b) = ]a, b[ = \{x \mid a < x < b\}$  offenes Intervall

$]a, b[ = \{x \mid a < x \leq b\}$  halb offenes Intervall

### 1.2.3 Betrag

Der Betrag  $|a|$  einer Zahl  $a$  ist der Abstand dieser Zahl vom Nullpunkt auf der Zahlengerade:

$$|a| = a \text{ oder } -a$$

- falls  $a \geq 0$
- falls  $a < 0$

$$\text{Beispiel: } |-5| = -(-5) = 5$$

### 1.2.4 Binomische Formeln

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$

### 1.2.5 Potenzen, Logarithmen, Wurzeln

$$a + a + a + \dots + a = n \cdot a$$

$$a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a = a^n \mid a: \text{Basis}, n: \text{Exponent}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n = \frac{1}{a^{-n}}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$a^n \cdot a^n = (a \cdot b)^n$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

$$\text{Beispiel: } \frac{1}{8^{\frac{2}{3}}} = 8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{64} = 4$$

### 1.3 Logarithmus

$$\log_2 8 = \frac{\log 8}{\log 2} = \frac{\ln 8}{\ln 2} = 3$$

#### Rechenregeln für Logarithmus

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$$

$$\log a^n = n \cdot \log a$$

$$\log \sqrt[n]{a} = \log a^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \log a$$

### 1.4 Quadratische Gleichungen

#### Mitternachtsformel

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

#### PQ Formel

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

## 2 Folgen und Reihen

$$1, 2, 3, 4, 5$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$$

$$2, 4, 8, 16, 32, 64$$

## 2.1 Folgen - Definition

Eine Funktion, die jeder natürlichen Zahl  $n \in \mathbb{N}$  eine reelle Zahl zuordnet, heißt: Zahlenfolge und wird mit  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$  oder  $\{a_n\}$  mit  $n \in \mathbb{N}$  bezeichnet. Die  $a_n$  heißen Glieder der Folge;  $a_1$  heißt Anfangsglied.

$1, 2, 3, 4, 5, \dots \mid a_n = n \mid$  arithmetisch

$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots \mid a_n = \frac{1}{n} \mid$  nicht arithm., nicht geom.

$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots \mid a_n = \frac{n}{n+1} \mid$  nicht arithm. nicht geom.

$2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots \mid a_n = 2^n \mid$  geometrische Folge

### 2.1.1 Arithmetische Folgen

Eine Folge  $\{a_n\}$ , bei der für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt:

$a_{n+1} - a_n = d = \text{const.}$ , heißt **arithmetische Folge**.  $d$  steht für die Differenz.

**Beispiel**

$5, 8, 11, 14, 17 \mid d = 3$

$11, 6, 1, -4, -9 \mid d = -5$

Wegen der konstanten Differenz  $d$  zweier Folgenglieder ist eine arithmetische Folge eindeutig durch das Anfangsglied  $a_1$  und die konstante Differenz  $d$  bestimmt.

$a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$

$a_1; a_1 + d; a_1 + 2d; \dots; a_1 + (n-1)d$

**Allgemeines Folgenglied einer arithmetischen Folge**  $a_n = a_1 + (n-1)d$

### 2.1.2 Geometrische Folgen

Eine Folge  $\{a_n\}$ , bei der für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt:

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q = \text{const.}$  heißt **geometrische Folge**.  $q$  steht für den Quotient.

**Beispiel**

$2, 4, 8, 16, 32, \dots \mid q = 2$

$\frac{4}{3}, \frac{4}{9}, \frac{4}{27}, \frac{4}{81}, \dots \mid q = \frac{1}{3}$

Wegen des konstanten Quotienten  $q$  ist eine geometrische Folge eindeutig durch  $a_1$  und  $q$  bestimmt.

$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n$

$a_1, a_1 \cdot q, a_1 \cdot q^2, a_1 \cdot q^3, \dots, a_1 \cdot q^{n-1}$

**Allgemeines Folgenglied einer geometrischen Folge**  $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

## 2.2 Reihen - Definition

Gegeben sei eine Zahlenfolge  $a_1 + a_2 + a_3 + \dots$ : man bezeichnet die Addition der Folgenglieder als **unendliche Reihe** oder **Reihe**.

Die Summe  $S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$  heißt  $n$ -te Partialsumme oder  $n$ -te Teilsumme.

Eine arithmetische/geometrische Reihe ist eine Reihe, deren Glieder den Gesetzen einer arithmetischen/geometrischen Folge gehorchen.

Die  $n$ -te Partialsumme  $S_n$  einer arithmetischen Folge:

$$1. S_n = a_1 + a_1 + d + \dots + a_1 + (n-2)d + a_1 + (n-1)d$$

$$2. S_n = a_1 + (n-1)d + a_1 + (n-2)d + \dots + a_1 + d + a_1$$

$$1. + 2. \quad 2S_n = [2a_1 + (n-1)d] + [2a_1 + (n-1)d] + \dots + [2a_1 + (n-1)d] + [2a_1 + (n-1)d]$$

$\Rightarrow n$ -mal

$$2S_n = n \cdot (2a_1 + (n-1)d) \quad | : 2$$

**$n$ -te Partialsumme einer arithmetischen Reihe**  $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$

### 3 Glossar

- Explizite / Rekursive Definition