Crveni pauk

Pannonychus ulmi Koch

Dipl.inž. Mile Gluvačević

Crveni pauk

- Crveni pauk (voćna grinja) napada jabuku, šljivu, vinovu lozu, šumsko drveće...
- Najčešće se javlja tokom sušnih godina
- Napada bujne voćnjake (pređubrene azotom...)

Štete

- Smanjena asimilaciona površina lista
- Utiče na kvalitet i količinu prinosa
- Ometen razvoj rodnih pupoljaka

Simptomi

- Pauk siše sadržaj ćelija lista

- Napadnuti listovi dobijaju ‘’bronzanu’’ boju, gube sposobnost asimilacije i često prijevremeno otpadaju

Simptomi na listovima

Simptom na listu

STADIJ	IZGLED	VRIJEME	GDJE GLEDATI?
Zimska jaja	crvena, 0,12 – 0,15 mm.	Od mirovanja do kretanja vegetacije, Od sredine avgusta	Račvišta grana, Oko pupoljaka na grančicama
Odrasli	jarko crveni, 0,3-0,5 mm	Od kretanja do kraja vegetacije	Naličje lista
Ljetna jaja	svijetlo crvena, 0,15 mm	Od cvjetanja do kraja vegetacije	Naličje lista
Mlade larve i nimfe	u početku narandžaste pa crvene, 0,2-0,4 mm	Od kretanja do kraja vegetacije	Naličje lista

Zimska jaja

Zimska jaja

Zimska jaja



Zimska jaja

Ljetna jaja

Odrasli

Kolonija na listu

Razvoj

- **Prezimljavanje**
  - zimska jaja
  - oko pupoljaka, na račvištima grana (na kori u skupinama

- **Piljenje larvi – kraj marta, april**
  - obično par dana prije otvaranja pupoljaka
  - što je listanje kasnije – više umiru prve larve
  - piljenje larvi traje 20-30 dana
  - larve prelaze na naličje lista
  - razvoj larvi traje 7-10 dana

Razvoj

- **Pojava odraslih – april, maj, juni…**
  - 1-4 dana poslije pojave odraslih – polaganje ljetnjih jaja
  - ženka položi dnevno 1-5 jaja, ukupno u toku života 10-30 (70)
  - ima 7-8 generacija godišnje koje se često preklapaju

- **Zimska jaja – od sredine avgusta**
  - moraju biti izložena niskim temperaturama

Šta sve utiče na razvoj crvenog pauka

- Više temperature – pozitivno utiču
- Relativna vl. vazduha – optimum 60-75 %
- Prašina - povoljno utiče na razvoj
- Kiša – uglavnom ne smeta
- Vjetar – povoljno utiče na širenje (od1,5 m/s)
- Svjetlo – povoljno utiče zbog stvaranja viška asimilata u lišću
- Višak azota (N) - povoljno utiče zbog stvaranja viška asimilata u lišću
- Prirodni neprijatelji – odnos 1:10 – smanuju brojnost crvenog pauka

Zaštita

- U svako vrijeme na biljkama ima najviše jaja
  - zato je bitno ovicidno dejstvo sredstava
- Pred kraj razvoja embrion uspostavlja vezu sa spoljnom sredinom preko stigmi
- Zimsko tretiranje
- Tretiranje u toku vegetacije

Zaštita

- **Zimsko tretiranje**

  - uljana sredstava, uljani organofosfati – bijelo i crveno ulje, oleodiazinon

- **Tretiranje u toku vegetacije**

  - spiridiklofen - Envidor
  - fenazakvin – Demitan
  - fenpiroksimat – Ortus
  - heksitiazoks – Nissorun
  - klofentezin – Apollo
  - amitraz – Mitak
  - sumpor – djelotvoran na visokim temperaturama, ali treba paziti na fitotoksičnost