中醫脈象檢查報告


檢測日期: 2022/07/28 15:16:05


檢測編號: 許寶芸左 性別: 女


身高: 156.5 公分 體重: 65.5 公斤

生日: 1990/10/20 00:00:00 BMI: 26.7

檢查時年齡: 31歲 281天







脈波分析結果參數值:

峰數:	2 Peak
脈數:	81 次/分鐘
脈位:	Deep
沉取脈高(標準化):	844.1
中取脈高(標準化):	722.1
浮取脈高(標準化):	277.2
主峰角:	41.8 degree
第一波谷:	32.5 %
Mean Blood Pressure:	2027.0 drgree
Mean Blood Pressure (% Height):	37.1 %
Mean Blood Pressure (mmHg):	67.3 mmHg
上昇支斜率:	288.2 mmHg/sec
下降支斜率:	-77.9 mmHg/sec
血管緊張度:	74 (非弦脈)
不規則脈:	0

第一節: 胃神根

		脈 數:81	
胃	脾胃之氣	主峰角: 41.8 degree	
		第一波谷: 32.5 %	● 良好
	不浮不沉 徐而緩	沉取脈高(標準化) = 844.1	正常
	節律正常	中取脈高(標準化) = 722.1	低下
		浮取脈高(標準化) = 277.2	
		不規則脈: 0	
心主血脈 補 柔和有力 氣血充足	心主血脈	血管緊張度:74	
		主峰角: 41.8 degree	
		(D-C)/(B-A) = 0.012	良好
		dP/dt Max = 288.2	✓ 正常
	氣血充足	沉取脈高(標準化) = 844.1	□ 低下 │
		中取脈高(標準化) = 722.1	
		浮取脈高(標準化) = 277.2	
	腎為先天之本	脈 數:81	良好
 根	諸臟之根	沉取脈高(標準化) = 844.1	
	浮中沉取適位 寸關尺三部相應	中取脈高(標準化) = 722.1	正常
	尺脈沉取有力	浮取脈高(標準化) = 277.2	低下 低下

第二節:脈位、脈數、脈形、脈勢

脈位	 沉取脈高(標準化) = 844.1 測試壓 = 100 mmHg 中取脈高(標準化) = 722.1 測試壓 = 80 mmHg 浮取脈高(標準化) = 277.2 測試壓 = 60 mmHg 	✓ 沉取中取 浮取
脈數	心率:心跳數 = 81次/分鐘	心律:不規則心跳 = 0次/5分鐘✓ 正常
脈形	大小 I 正常 I 大 I 小	平滑度
脈勢	上昇支斜率 = 288.2	下降支斜率 = -77.9 □ 正常 □ 速降 ✓ 緩降

第三節:平脈及28類病脈

文獻依據:(1)西晉王叔和【脈經】(2)明朝張景岳【景岳全書】(3)明朝李時珍【瀕湖脈學】

(4)清朝李世材【診家正眼】

脈象	特徵	主病	判別
平脈			
正常脈	三部有脈·不遲不數 不浮不沉·從容和緩 柔和有力	正常健康人之脈象	
浮脈類			
浮脈	輕取即得 重按稍減而不空	表證	
浮脈	輕取即得 中取及重取則無力	虚證	
洪脈	指下浮滿,如波濤洶湧 來盛去衰	血氣燔灼,邪盛證衰	
濡脈	浮細無力	諸虚・濕證・脾虚	
散脈	浮大無根・至數不齊	諸虚・濕證・虚脫	
芤脈	浮大中空・如按蔥管	失血・傷陰	
革脈	浮滿拍指,中空外堅 如按鼓皮	亡血・失精 流産・慢性出血	

脈象	特徵	主病	判別
沉脈類			
沉脈	 輕取不應・重按始得 	裏證・裏實	
沉脈	輕取不應,重按始得	裏證・裏虚	✓
伏脈	重手推筋按骨始得 ,或甚伏而不見	邪避・痛極・厥證	
牢脈	沉取實大堅牢弦長	陰寒內實,疝氣,癥瘕 ,高血壓,動脈硬化	
弱脈	沉細無力	氣血不足,濕證	
遲脈類			
遲脈	脈來遲緩	寒證	
緩脈	脈來去怠緩	濕證,脾胃虛弱	
澀脈	脈往來艱澀 如輕刀刮竹	傷精,血少, 氣滯血瘀,挾痰	
結脈	脈來緩有時而止 ,止無定數	陰盛氣結, 寒痰血瘀,陽虚	

脈象	特徵	主病	判別
數脈類			
數脈	一息脈來五至以上	熱證	
促脈	脈來數而時一止 , 止無定數	陽盛實熱・氣滯・血瘀・痰飲・宿食・風濕癰腫	
疾脈	脈來急疾, 一息七八至	陽極陰竭,元氣將脫	
動脈	脈形如豆・滑數有力	痛,驚	
虚脈類			
虚脈	三步脈舉之無力 ,按之空虛	虚證	
微脈	極細極無力, 按之明顯欲絕, 忽有忽無	陽衰少氣, 陰陽氣血諸虛	
細脈	脈細如線・按之明顯	氣血兩虚, 勞損,濕病	
代脈	脈來一止,止有定數 ,良久方來	臟氣衰微,風證 ,痛症,驚恐	
短脈	首尾俱短,不能滿布	氣虛	

脈象	特徵	主病	判別	
實脈類				
實脈	三步脈舉按均有力	實證		
滑脈	往來流利·如珠走盤 ·應指圓滑	痰飲,食滯, 實熱,妊娠		
緊脈	脈來繃急, 狀如牽繩轉索	實寒,激痛,宿食, 傷寒,高血壓,動脈硬化		
長脈	首尾端直・超過本位	健旺之徵,肝陽有餘 ,陽盛內熱		
弦脈	端直而長・如按琴弦	肝膽病,諸痛,痰飲, 瘧疾,高血壓,動脈硬化		
綜合判斷(複	綜合判斷(複合脈)			
沉脈				