

1 Определения

Определение 1.1. Кольцо – это тройка $(R, +, *)$, где R – непустое множество, $+, * : R^2 \mapsto R$, такая что $(R, +)$ – абелева группа, а также выполнена дистрибутивность умножения $*$ относительно сложения $+$ слева и справа. Нейтральный элемент относительно сложения обозначается 0

Кольцо с единицей – это кольцо, в котором относительно умножения есть нейтральный элемент, обозначаемый 1 : $1 * a = a * 1 = a$

Ассоциативное кольцо – это кольцо, в котором выполнена ассоциативность операции умножения: $a * (b * c) = (a * b) * c$

Коммутативное кольцо – это кольцо, в котором выполнена коммутативность операции умножения $a * b = b * a$, а также присутствует единица и выполнена ассоциативность.

Определение 1.2. Элемент $a \neq 0$ ассоциативного кольца с единицей R называется обратимым, если $\exists a^{-1} \in R : a^{-1} * a = a * a^{-1} = 1$

Определение 1.3. Элемент $0 \neq a \in R$ называется делителем нуля, если $\exists 0 \neq b \in R : ab = 0$

Определение 1.4. Для кольца K множество его обратимых элементов обозначается K^*

Элементы a и b называются ассоциированными, если $\exists c \in K^* : a = cb$

Определение 1.5. Коммутативное кольцо без делителей нуля называется областью целостности.

Определение 1.6. Ненулевой необратимый элемент a области целостности называется неразложимым, если из того, что он представляется в виде $a = bc$, следует, что либо b либо c обратим.

Определение 1.7. Ненулевой необратимый элемент p называется простым, если из того, что $p|ab$ следует, что либо $p|a$ либо $p|b$

Определение 1.8. Евклидово кольцо – это область целостности K с определенной на ней функцией евклидовой нормы $N : K \setminus \{0\} \mapsto \mathbb{N}_0$:

$$1. \forall a, b \in K \setminus \{0\} : N(a) \leq N(ab)$$

$$2. \forall a, b \in K \setminus \{0\} : \exists q, r : a = qb + r, N(r) < N(b)$$

Определение 1.9. Пусть K – область целостности. Тогда элемент $z \in K$ называется наибольшим общим делителем элементов $a, b \in K$ (обозначается как (a, b)), если $z|a, z|b$ и $\forall z' : z'|a, z'|b$ выполнено, что $z'|z$

Определение 1.10. Пусть R_1 и R_2 – кольца. Отображение $\varphi : R_1 \mapsto R_2$ называется гомоморфизмом колец, если:

$$1. \varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$$

$$2. \varphi(a * b) = \varphi(a) * \varphi(b)$$

Определение 1.11. Подмножество $R \subset K$ называется подкольцом, если оно замкнуто относительно умножения и является подгруппой по сложению.

Определение 1.12. Подкольцо R коммутативного кольца K называется идеалом, если оно замкнуто относительно умножения на элемент из K , то есть $\forall r \in R, k \in K : rk \in R$

Определение 1.13. Тривиальным называют идеал, либо совпадающий со всем кольцом, либо состоящий из одного элемента (нейтрального элемента по сложению)

Определение 1.14. Идеал I коммутативного кольца K называется порожденным элементами x_1, \dots, x_n (обозначение $I = (x_1, \dots, x_n)$), если $I = \{a_1 * x_1 + a_2 * x_2 + \dots + a_n * x_n \mid \forall i : a_i \in K\}$

Определение 1.15. Идеал конечнопорожден, если он порожден конечным числом элементов.

Определение 1.16. Идеал называется главным, если он порожден одним элементом.

Определение 1.17. Кольцо называется кольцом главных идеалов (КГИ), если в нём все идеалы главные.

Определение 1.18. Область целостности называется факториальным кольцом, если в нём любой ненулевой элемент либо обратим, либо с точностью до перестановки и домножения на обратимые представляется в виде произведения неразложимых.

Определение 1.19. Идеал $I \neq K$ называется простым, если $ab \in I \Rightarrow a \in I \vee b \in I$

Определение 1.20. Идеал $I \neq K$ называется максимальным, если не существует другого нетривиального идеала, содержащего I

2 Вопросы сложности 2

Утверждение 2.1. В коммутативном кольце элемент не может иметь двух различных обратных

Доказательство. Пусть K — коммутативное кольцо, $a \in K$ — ненулевой элемент этого кольца, a_1, a_2 — два различных обратных элемента к нему. Тогда, с одной стороны $a_1 a a_2 = a_1 (a a_2) = a_1$, а с другой стороны $a_1 a a_2 = (a_1 a) a_2 = a_2$. Получили, что $a_1 = a_2$. Противоречие. \square

Утверждение 2.2. Пусть R — кольцо с единицей, причем $|R| > 1$. Тогда в этом кольце $1 \neq 0$

Доказательство. Пусть $a \in R$. Докажем, что $a \cdot 0 = 0$. Воспользуемся тем, что $0 = 0 + 0$ (это прямое следствие аксиом кольца), а также дистрибутивность:

$$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

Если добавить к обоим частям равенства обратный по сложению $-(a \cdot 0)$, то получим, что $a \cdot 0 = 0$.

Пусть теперь $1 = 0$. Поскольку $|R| > 1$, то можно найти такой $a \in R$, что $a \neq 0$. Тогда $a \cdot 1 = 0$ из выше доказанного. С другой стороны, поскольку 1 – нейтральный элемент по умножению, $a \cdot 1 = a$. Тогда $a = 0$. Но мы выбирали a так, что $a \neq 0$. Противоречие. \square

Утверждение 2.3. Пусть R – ассоциативное кольцо с единицей. a – обратимый элемент в R . Тогда a не может быть делителем нуля.

Доказательство. Пусть $\exists b \neq 0 : ab = 0$. Умножим последнее равенство на a^{-1} . Тогда $0 = a^{-1}ab = (a^{-1}a)b = b$. Получили, что $b = 0$. Противоречие. \square

Утверждение 2.4. Пусть K – область целостности, пусть $a, b, c \in K$, причем $c \neq 0$. Тогда $ac = bc \Rightarrow a = b$

Доказательство. $ac = bc \Leftrightarrow ac - bc = 0 \Leftrightarrow (a - b)c = 0$. Поскольку K – область целостности, то либо $c = 0$, либо $a - b = 0$. Но первое противоречит условию, поэтому верно второе, то есть $a = b$. \square

Утверждение 2.5. $S = \{\frac{p}{q} \in \mathbb{Q} : (p, 1) = 1, q|n\}$ не является подкольцом \mathbb{Q}

Доказательство. Пусть $n = 12$, $\frac{1}{4} \in S$, $\frac{1}{6} \in S$. Но их произведение $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{24} \notin S$. Получили, что S не замкнуто относительно умножения. \square

Утверждение 2.6. Пусть p – простое, $S = \{\frac{a}{b} \in \mathbb{Q} : (a, b) = 1, p \nmid b\}$. Тогда S – подкольцо в \mathbb{Q}

Доказательство. Проверяем замкнутость относительно операций. Пусть $\frac{a}{b} \in S$, $\frac{c}{d} \in S$, причем $p \nmid b, p \nmid d$. $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$, причем $p \nmid bd$. Действительно, пусть $p|bd$. Так как p простое, то либо $p|b$, либо $p|d$. А это не так. Поскольку $p \nmid bd$, то и после сокращения дроби $\frac{ad+bc}{bd}$ на некоторое число e , $p \nmid \frac{bd}{e}$. Действительно, воспользуемся ОТА: пусть $bd = p_1 p_2 \cdots p_k$, причем в этом разложении нет числа p . Но тогда после сокращения, в разложении числа bd могут лишь исчезнуть некоторые p_i , но не появится p .

Аналогично с произведением. Понятно также, что все обратные к $\frac{a}{b}$ в S лежат, ведь это просто $\frac{b}{a}$. \square

Утверждение 2.7. Пусть p – простое, $S = \{\frac{a}{b} \in \mathbb{Q} : (a, b) = 1, \exists n \in \mathbb{N}_0 : b = p^n\}$. Тогда S – подкольцо в \mathbb{Q}

Доказательство. Проверяем замкнутость операций, пусть $\frac{a}{p^n} \in S, \frac{b}{p^m} \in S$. Без ограничения общности, $m > n$.

Тогда $\frac{a}{p^n} + \frac{b}{p^m} = \frac{ap^{m-n}+b}{p^m}$. После сокращения последней дроби её знаменатель останется степенью p . Аналогично с произведением. Обратные ко всем элементам также лежат. \square

Утверждение 2.8. *Множество обратимых элементов ассоциативного кольца с единицей является группой по умножению и называется мультипликативной группой кольца*

Доказательство. Пусть K^* – это множество всех обратимых элементов ассоциативного кольца с единицей K . Понятно, что для этих элементов выполняется ассоциативность, ведь она наследуется из кольца K . Кроме того, $1 \in K^*$, ведь 1 – обратимый элемент. И последнее: если a – обратим, то a^{-1} тоже обратим. В итоге мы доказали, что K^* – группа. \square

Утверждение 2.9. $a \sim b \Leftrightarrow a|b \wedge b|a$

Доказательство. Пусть $a \sim b$. Тогда $\exists c \in K^* : a = bc$. Тогда $b|a$. Кроме того, $c^{-1}a = b$, то есть $a|b$.

Наоборот, пусть $a|b, b|a$. Понятно, что тогда $a \neq 0, b \neq 0$. Тогда $b = ca, a = db$. Тогда $b = cdb$. Сокращая на b получаем, что $cd = 1$, а это означает, что c и d – обратимые, то есть $a \sim b$ \square

Утверждение 2.10. *Если a – неразложим, $a \sim b$, то b – неразложим.*

Доказательство. Пусть b – разложимый элемент, то есть $\exists c, d \notin K^* : b = cd$. Но $a = eb$, причем $e \in K^*$. Тогда $a = ecd$. Но $ec \notin K^*$. Действительно, пусть $ec \in K^*$. $e^{-1} \in K^*$. Тогда $c \in K^*$, а это не так. Получили разложения для a на необратимые элементы. \square

Утверждение 2.11. *Пусть p – простой, $p \sim q$. Тогда q тоже простой.*

Доказательство. Пусть $q|ab, q = cp, c \in K^*$. Тогда $ab = dq = cdp$. Тогда $p|ab$. Тогда либо $p|a$, либо $p|b$. Пусть, без ограничения общности, $p|a$. Тогда $a = ep = ec^{-1}q$. Но тогда $q|a$. \square

Утверждение 2.12. *Пусть $d_1 = (a, b), d_2 = (a, b)$. Тогда $d_1 \sim d_2$*

Доказательство. Поскольку d_1 – наибольший общий делитель, а d_2 – общий делитель, то $d_2|d_1$. Аналогично, $d_1|d_2$. По критерию ассоциированности, $d_1 \sim d_2$ \square

Утверждение 2.13. $\mathbb{Z}[\omega]$ – евклидово кольцо с нормой $N(a + b\omega) = a^2 + b^2 - ab$

Доказательство. Заметим, что $|a + b\omega|^2 = (a + b\omega) \cdot (a + b\bar{\omega}) = a^2 + ab(\omega + \bar{\omega}) + b^2\omega\bar{\omega} = a^2 + b^2 - ab = N(a + b\omega) \geq 1$, при $(a, b) \neq 0$

Тогда для $z_1, z_2 \neq 0$: $N(z_1 z_2) = z_1 z_2 \bar{z}_1 \bar{z}_2 = N(z_1)N(z_2) \geq N(z_1)$ и первое свойство нормы выполнено.

Теперь нужно сказать пару слов, про то, как мы делим элементы в $\mathbb{Z}[\omega]$ (то есть как для любых двух $a, b \in \mathbb{Z}[\omega]$ выбрать $q, r \in \mathbb{Z}[\omega]$ так, что $a = bq + r$, причем $N(r) < N(b)$)

Положим $q = \left[\frac{a}{b}\right]$ – ближайшую к $\frac{a}{b}$ точку из $\mathbb{Z}[\omega]$, $r = b * (q - \frac{a}{b}) = b * (\left[\frac{a}{b}\right] - \frac{a}{b}) = bq - a$. Если мы докажем, что $|\left[\frac{a}{b}\right] - \frac{a}{b}| < 1$, это будет означать, что $N(r) < N(1)N(b) = N(b)$. Для этого докажем, что расстояние вообще от любой точки из \mathbb{C} до ближайшей точки $\mathbb{Z}[\omega]$ удовлетворяет требуемому неравенству. Рассмотрим $z \in \mathbb{C}$. Для неё в $\mathbb{Z}[\omega]$ есть три ближайшие точки z_1, z_2, z_3 , образующие треугольник вокруг z . Любой такой треугольник является равносторонним со стороной 1. Докажем, что $f(z) = \max_z \min\{|z_1 - z|, |z_2 - z|, |z_3 - z|\} < 1$. Но максимум достигается, когда все $|z_i - z|$ равны. Тогда точка z – центр описанной окружности вокруг треугольника, а $f(z)$ – то радиус описанной окружности, который находится по формуле $\frac{abc}{4S} = \frac{1}{\sqrt{3}} < 1$ \square

Утверждение 2.14. В области целостности $\mathbb{Z}[u]$ элемент $z = a + bu$ делится на $k \in \mathbb{Z}$ тогда и только тогда, когда a и b делятся на k .

Доказательство. Пусть $k|z$. Тогда $a + bu = z = k(x + yu) = kx + kyu$. Пусть $u = c + di$. Тогда $a + bc + bdi = kx + kyc + kydi$. Два комплексных числа равны, если равны их мнимые и действительные части, поэтому

$$\begin{cases} a + bc = kx + kyc, \\ bd = kyd \end{cases}$$

Считаем, что $d \neq 0$, в противном случае утверждение не верно (например, $2|1 + 3 = 4$, но неверно, что $2|1, 2|3$). Тогда $b = ky, a = kx$. Значит, a и b делятся на k .

Пусть наоборот, a и b делятся на k . Тогда $b = ky, a = kx$. $z = a + bu = k(x + yu)$. Тогда $k|z$. \square

Утверждение 2.15. В $\mathbb{Z}[\omega]$ если $z|x, |z| = |x|$, то $z \sim x$

Доказательство. $x = zu$, причем $|x| = |z||u|$, а значит, $|u| = 1$. Но в $\mathbb{Z}[\omega]$ все такие z , что $|z| = 1$ обратимы, следовательно, $z \sim x$ \square

Утверждение 2.16. В $\mathbb{Z}[i]$ если $z|x, |z| = |x|$, то $z \sim x$

Доказательство. $x = zu$, причем $|x| = |z||u|$, а значит, $|u| = 1$. Но в $\mathbb{Z}[i]$ все такие z , что $|z| = 1$ обратимы, следовательно, $z \sim x$ \square

Утверждение 2.17. Если z – неразложимый в $\mathbb{Z}[i]$, то $\exists p$ – простое, $N(z) = p \vee N(z) = p^2$

Доказательство. Будет пользоваться тем фактом, что $\mathbb{Z}[i]$ – факториальное кольцо. Тогда z – простой. $N(z) = z\bar{z}$, причем $N(z) \in \mathbb{Z}$. Разложим $N(z)$ на простые. $z\bar{z} = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_s^{k_s}$. То есть $z|p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}$. но z – простое, поэтому $\exists i : z|p_i$. То есть $zx = p_i$. Обозначим $p = p_i$, оно простое. $N(z)N(x) = p^2$. Есть 3 варианта:

1. $N(x) = 1$. Тогда $N(z) = p^2$
2. $N(x) = p$. Тогда $N(z) = p$.
3. $N(x) = p^2$. Тогда $N(z) = 1$, и z обратим, а значит, не является неразложимым. Противоречие.

□

Утверждение 2.18. Если z – неразложимый в $\mathbb{Z}[\omega]$, то $\exists p$ – простое, $N(z) = p \vee N(z) = p^2$

Доказательство. Доказательство повторяет предыдущее. Будет пользоваться тем фактом, что $\mathbb{Z}[\omega]$ – факториальное кольцо. Тогда z – простой. $N(z) = z\bar{z}$, причем $N(z) \in \mathbb{Z}$. Разложим $N(z)$ на простые. $z\bar{z} = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_s^{k_s}$. То есть $z | p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}$, но z – простое, поэтому $\exists i : z | p_i$. То есть $zx = p_i$. Обозначим $p = p_i$, оно простое. $N(z)N(x) = p^2$. Есть 3 варианта:

1. $N(x) = 1$. Тогда $N(z) = p^2$
2. $N(x) = p$. Тогда $N(z) = p$.
3. $N(x) = p^2$. Тогда $N(z) = 1$, и z обратим, а значит, не является неразложимым. Противоречие.

□

Утверждение 2.19. Если x – неразложимый элемент $\mathbb{Z}[i]$ и $N(z) = p^2$, то $z \sim p$

Доказательство. В рамках предыдущего доказательства мы показали, что $\exists x : zx = p$. Тогда $N(z)N(x) = p^2$, но также $N(z) = p^2$, а значит, $N(x) = 1$. Значит, x – обратим и $z \sim p$

□

Утверждение 2.20. Если x – неразложимый элемент $\mathbb{Z}[\omega]$ и $N(z) = p^2$, то $z \sim p$

Доказательство. Аналогично.

□

Утверждение 2.21. Если для $z \in \mathbb{Z}[i]$ выполнено, что $N(z) = p$, где p – простое, то z неразложим.

Доказательство. Пусть z разложим, тогда $z = z_1 z_2$, причем $z_1, z_2 \notin \mathbb{Z}[i]^*$. Тогда $p = N(z) = N(z_1)N(z_2)$. Так как p простое, то либо $N(z_1) = 1$, либо $N(z_2) = 1$. Но тогда либо z_1 , либо z_2 обратим. Противоречие.

□

Утверждение 2.22. Если для $z \in \mathbb{Z}[\omega]$ выполнено, что $N(z) = p$, где p – простое, то z неразложим.

Доказательство. Аналогично.

□

Утверждение 2.23. Множество делителей нуля кольца K вместе с нулём не всегда образуют идеал.

Доказательство. Рассмотрим $K = \mathbb{Z}_6$. Его множество делителей нуля (вместе с нулём) – это $\{0, 2, 3\}$. Это множество не образует даже подкольцо, так как $2 + 3 = 5 \notin \{0, 2, 3\}$ \square

Утверждение 2.24. 3 – разложимый элемент $\mathbb{Z}[\omega]$

Доказательство. $(1 - \omega)(1 - \omega^2) = 1 - \omega - \omega^2 + \omega^3 = 2 - \omega - \omega^2 = 2 - \omega - (-1 - \omega) = 3$ \square

Утверждение 2.25. Если идеал $I \subset K$ содержит обратимый элемент, то $I = K$

Доказательство. Пусть $a \in I$ – обратимый элемент. Тогда $\exists a^{-1} \in K : aa^{-1} = 1$. Из определения идеала $\forall x \in I : \forall y \in K : xy \in I$. Значит, $1 = aa^{-1} \in I$. Раз $1 \in I$, то и $\forall y \in K : 1 \cdot y \in I$. Значит, $K \subset I$. Но тогда $K = I$. \square

Утверждение 2.26. $I = (a_1, \dots, a_k) = \{x_1a_1 + \dots + x_ka_k : \forall i : x_i \in K\}$ – это минимальный по включению идеал, содержащий элементы a_1, \dots, a_k .

Доказательство. Во-первых, I – это идеал. Действительно, пусть $x \in I, y \in K$. Тогда $x = x_1a_1 + \dots + x_ka_k$. $yx = yx_1a_1 + \dots + yx_ka_k \in I$. Кроме того, это подгруппа по сложению.

Пусть J – другой идеал, содержащий a_1, \dots, a_k . Тогда $\forall i : \forall x \in K : xa_i \in J$. Тогда $\forall x_1, \dots, x_k : x_1a_1 + \dots + x_ka_k \in J$. Но тогда $I \subset J$. Но это и означает, что I – минимальный по включению идеал, содержащий элементы a_1, \dots, a_k . \square

Утверждение 2.27. Идеал $(x, x+1) \subset \mathbb{Z}[x]$ не является ни простым, ни максимальным.

Доказательство. $x \in (x, x+1), x+1 \in (x, x+1) \Rightarrow x+1-x = 1 \in (x, x+1)$. Но тогда $I = \mathbb{Z}[x]$. То есть этот идеал тривиальный. Значит, он не максимальный и не простой. \square

3 Вопросы сложности 3

Утверждение 3.1. Множество $S = \{x + \sqrt{2}y : x, y \in \mathbb{Q}\}$ является кольцом.

Доказательство. Так как $S \subset \mathbb{R}$, а \mathbb{R} – кольцо, то достаточно проверить замкнутость S . Пусть $x + \sqrt{2}y \in S, a + \sqrt{2}b \in S$. Тогда $-(x + \sqrt{2}y) = -x + \sqrt{2}(-y) \in S$. $(x + \sqrt{2}y) + (a + \sqrt{2}b) = (x + a) + \sqrt{2}(y + b) \in S$. $(x + \sqrt{2}y)(a + \sqrt{2}b) = (xa + 2yb) + \sqrt{2}(ya + xb) \in S$. Получаем, что S замкнуто относительно операции. Значит S – подкольцо, значит S – кольцо. \square

Утверждение 3.2. *Простой элемент области целостности является неразложимым.*

Доказательство. Пусть p – простой элемент области целостности K . Пусть p – разложим, то есть $\exists a \notin K^*, b \notin K^* : p = ab$. Тогда $p|ab$. Значит, либо $p|a$, либо $p|b$. Пусть без ограничения общности $p|a$. Тогда $a = px$. Тогда $p = pxb$. Значит, $p(1 - xb) = 0$. Так как $p \neq 0$, то $1 - xb = 0$. Значит, $xb = 1$, и следовательно, $b \in K^*$. Противоречие. \square

Утверждение 3.3. *При каких $u \in \mathbb{C}$ множество $\mathbb{Z}[u] = \{a + bu : a, b \in \mathbb{Z}\}$ является областью целостности.*

Доказательство. Заметим, что $\mathbb{Z}[u] \subset \mathbb{C}$. Но в \mathbb{C} делителей нуля нет, так как это поле (ну или так: пусть a – делитель нуля в \mathbb{C} , тогда $0 = |ab| = |a||b|$. Но тогда либо $|a| = 0$, либо $|b| = 0$).

Осталось проверить, при каких u $\mathbb{Z}[u]$ замкнуто. Понятно, что $(a + bu) + (c + du) = (a + c) + (d + b)u$, то есть относительно сложения это множество всегда замкнуто. Посмотрим, что происходит при умножении: $(a + bu)(c + du) = ac + (bc + ad)u + bdu^2$. Значит, это множество замкнуто тогда и только тогда, когда $u^2 \in \mathbb{Z}[u]$. То есть $\exists r, s : u^2 = r + su$. Заметим, что если u – корень $u^2 = r + su$, то и \bar{u} это тоже корень $u^2 = r + su$. Тогда по теореме Виета это означает, что $u + \bar{u} = 2\Re u \in \mathbb{Z}$, $u \cdot \bar{u} = |u|^2 \in \mathbb{Z}$. \square

Утверждение 3.4.

$$\mathbb{Z}[ni]^* = \begin{cases} \{1, -1, i, -i\}, n = 1, \\ \{1, -1\}, n > 1. \end{cases}$$

Доказательство. Заметим, что если z – обратимый, то $|z|^2 |z^{-1}|^2 = |zz^{-1}|^2 = |1|^2 = 1$. Если $z, z^{-1} \in \mathbb{Z}[ni]$, то $|z|^2, |z^{-1}|^2 \in \mathbb{Z}$. Произведение двух положительных чисел из \mathbb{Z} дает единицу, если оба числа это единица. Значит, обратимыми могут быть только элементы с нормой 1. Просто переберём все элементы из $\mathbb{Z}[ni]$ с нормой 1 и посмотрим, какие из них обратимы. \square

Утверждение 3.5. $\mathbb{Z}[\omega]^* = \{1, -1, \omega, -\omega, \omega^2, -\omega^2\}$

Доказательство. Рисуем $\mathbb{Z}[\omega]$ на листочке и внимательно смотрим, используя соображения из предыдущего доказательства. \square

Утверждение 3.6. $\mathbb{Z}[3i]$ не факториально.

Доказательство. $3i \cdot (-3i) = 9 = 3 \cdot 3$. Докажем, что $3, 3i, -3i$ неразложимы. Пусть не так, и скажем, $3 = z_1 z_2$, причем ни z_1 , ни z_2 не обратимы, а следовательно $N(z_1) > 1, N(z_2) > 1$. Тогда $9 = N(z_1)N(z_2)$. Понятно, что тогда $N(z_1) = 3, N(z_2) = 3$. Но $N(z) = a^2 + 9b^2$. Легко показать, что $N(z) \neq 3$ при любых a, b . Ну или можно нарисовать $\mathbb{Z}[3i]$ и убедиться в этом при помощи геометрии. Оба варианта являются правильными. Аналогично делаем с $3i$ и $-3i$. \square

Утверждение 3.7. $\mathbb{Z}[\sqrt{3}i]$ не факториально.

Доказательство. $4 = 2 \cdot 2 = (1 - \sqrt{3}i)(1 + \sqrt{3}i)$. $N(2) = N(1 - \sqrt{3}i) = N(1 + \sqrt{3}i) = 4$. Покажем, что элемент с нормой 4 неразложим. $4 = N(z_1) \cdot N(z_2)$. Тогда $N(z_1) = N(z_2) = 2$. Но элементов с такой нормой в $\mathbb{Z}[\sqrt{3}i]$ нет. \square

Утверждение 3.8. Если $N(ab) = N(a)$, и $a, b \neq 0$, то b — обратим

Доказательство. Разделим a на ab с остатком. Тогда $\exists q, r : a = abq + r$. Пусть $r \neq 0$. Тогда $N(r) < N(ab) = N(a)$. Но $r = a - abq = a(1 - bq)$, следовательно $a|r$. Тогда $r = xa$. $N(r) = N(xa) \geq N(a)$. Но мы получили противоречие, ведь $N(a) \leq N(xa) = N(r) < N(ab) = N(a)$. Значит $r = 0$. Но тогда b — обратимый \square

Утверждение 3.9. Если b — обратим, то $N(ab) = N(a)$

Доказательство. Из свойства нормы: $N(ab) \geq N(a)$. Докажем, что $N(a) \geq N(ab)$. Так как b — обратимый, то $a = abb^{-1}$. Тогда Из свойства нормы $N(a) = N(abb^{-1}) \geq N(ab)$. Конец. \square

Утверждение 3.10. Если p — простое целое число, причем $p = 4k + 3$, то p — неразложимый элемент в $\mathbb{Z}[i]$

Доказательство. Пусть не так. Тогда $\exists z_1, z_2 \notin \mathbb{Z}[i]^* : p = z_1 z_2$. Посмотрим на норму p : $p^2 = N(z_1)N(z_2)$. Понятно, что без ограничения общности есть два варианта:

1. $N(z_1) = N(z_2) = p$. Но такого быть не может, т.к. $N(z_1) = a^2 + b^2 \not\equiv 3 \pmod{4}$
2. $N(z_1) = 1, N(z_2) = p^2$. Но тогда z_1 обратимый, и мы опять пришли к противоречию.

Значит, p неразложимый. \square