

1 STANDARDABWEICHUNG

rwb.

Name _____

Datum _____

Fünf Dosen wurden gewogen (in g):

497 · 499 · 500 · 501 · 503

a) $\bar{x} =$ g

b) Summe der $(x_i - \bar{x})^2$:

c) $\sigma^2 =$ g²

d) $\sigma =$ g

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

1 STANDARDABWEICHUNG

rwb.

Name _____

Datum _____

Fünf Dosen wurden gewogen (in g):

497 · 499 · 500 · 501 · 503

a) $\bar{x} =$ g

b) Summe der $(x_i - \bar{x})^2$:

c) $\sigma^2 =$ g²

d) $\sigma =$ g

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

1 STANDARDABWEICHUNG

rwb.

Name _____

Datum _____

Fünf Dosen wurden gewogen (in g):

497 · 499 · 500 · 501 · 503

a) $\bar{x} =$ g

b) Summe der $(x_i - \bar{x})^2$:

c) $\sigma^2 =$ g²

d) $\sigma =$ g

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

1 STANDARDABWEICHUNG

rwb.

Name _____

Datum _____

Fünf Dosen wurden gewogen (in g):

497 · 499 · 500 · 501 · 503

a) $\bar{x} =$ g

b) Summe der $(x_i - \bar{x})^2$:

c) $\sigma^2 =$ g²

d) $\sigma =$ g

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

1 STANDARDABWEICHUNG

rwb.

Name _____

Datum _____

Fünf Dosen wurden gewogen (in g):

497 · 499 · 500 · 501 · 503

a) $\bar{x} =$ g

b) Summe der $(x_i - \bar{x})^2$:

c) $\sigma^2 =$ g²

d) $\sigma =$ g

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

1 STANDARDABWEICHUNG

rwb.

Name _____

Datum _____

Fünf Dosen wurden gewogen (in g):

497 · 499 · 500 · 501 · 503

a) $\bar{x} =$ g

b) Summe der $(x_i - \bar{x})^2$:

c) $\sigma^2 =$ g²

d) $\sigma =$ g

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

2 VARIANZ UND SIGMA

rwb.

Name _____

Datum _____

Ergänzen Sie die fehlenden Werte.

σ^2	σ
16 g ²	
	5 g
0,25 g ²	
	10 g

Denken Sie an den Zusammenhang zwischen Quadrat und Wurzel.

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

2 VARIANZ UND SIGMA

rwb.

Name _____

Datum _____

Ergänzen Sie die fehlenden Werte.

σ^2	σ
16 g ²	
	5 g
0,25 g ²	
	10 g

Denken Sie an den Zusammenhang zwischen Quadrat und Wurzel.

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

2 VARIANZ UND SIGMA

rwb.

Name _____

Datum _____

Ergänzen Sie die fehlenden Werte.

σ^2	σ
16 g ²	
	5 g
0,25 g ²	
	10 g

Denken Sie an den Zusammenhang zwischen Quadrat und Wurzel.

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

2 VARIANZ UND SIGMA

rwb.

Name _____

Datum _____

Ergänzen Sie die fehlenden Werte.

σ^2	σ
16 g ²	
	5 g
0,25 g ²	
	10 g

Denken Sie an den Zusammenhang zwischen Quadrat und Wurzel.

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

2 VARIANZ UND SIGMA

rwb.

Name _____

Datum _____

Ergänzen Sie die fehlenden Werte.

σ^2	σ
16 g ²	
	5 g
0,25 g ²	
	10 g

Denken Sie an den Zusammenhang zwischen Quadrat und Wurzel.

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

2 VARIANZ UND SIGMA

rwb.

Name _____

Datum _____

Ergänzen Sie die fehlenden Werte.

σ^2	σ
16 g ²	
	5 g
0,25 g ²	
	10 g

Denken Sie an den Zusammenhang zwischen Quadrat und Wurzel.

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

Name _____ Datum _____

Zwei Maschinen füllen im Mittel **500 g** ab.

Maschine A: $\sigma = 2 \text{ g}$ · Maschine B: $\sigma = 6 \text{ g}$

a) In welchem Bereich liegen die meisten Dosen?

A: von bis g

B: von bis g

b) Welche Maschine ist zuverlässiger?

☐ A ☐ B

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

Name _____ Datum _____

Zwei Maschinen füllen im Mittel **500 g** ab.

Maschine A: $\sigma = 2 \text{ g}$ · Maschine B: $\sigma = 6 \text{ g}$

a) In welchem Bereich liegen die meisten Dosen?

A: von bis g

B: von bis g

b) Welche Maschine ist zuverlässiger?

☐ A ☐ B

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

Name _____ Datum _____

Zwei Maschinen füllen im Mittel **500 g** ab.

Maschine A: $\sigma = 2 \text{ g}$ · Maschine B: $\sigma = 6 \text{ g}$

a) In welchem Bereich liegen die meisten Dosen?

A: von bis g

B: von bis g

b) Welche Maschine ist zuverlässiger?

☐ A ☐ B

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

Name _____ Datum _____

Zwei Maschinen füllen im Mittel **500 g** ab.

Maschine A: $\sigma = 2 \text{ g}$ · Maschine B: $\sigma = 6 \text{ g}$

a) In welchem Bereich liegen die meisten Dosen?

A: von bis g

B: von bis g

b) Welche Maschine ist zuverlässiger?

☐ A ☐ B

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

Name _____ Datum _____

Zwei Maschinen füllen im Mittel **500 g** ab.

Maschine A: $\sigma = 2 \text{ g}$ · Maschine B: $\sigma = 6 \text{ g}$

a) In welchem Bereich liegen die meisten Dosen?

A: von bis g

B: von bis g

b) Welche Maschine ist zuverlässiger?

☐ A ☐ B

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben

Name _____ Datum _____

Zwei Maschinen füllen im Mittel **500 g** ab.

Maschine A: $\sigma = 2 \text{ g}$ · Maschine B: $\sigma = 6 \text{ g}$

a) In welchem Bereich liegen die meisten Dosen?

A: von bis g

B: von bis g

b) Welche Maschine ist zuverlässiger?

☐ A ☐ B

Bewertung ☐ sicher ☐ teilweise ☐ üben