CAS-Führerschein: Wertetabellen

Graphs · Wertetabelle mit ctrl T · Tabellenanfang und Tabellenschritt · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

⌂ on ▸ 1 ▸ 2: **Graphs** | **f1(x)=**Term | **ctrl T** = Tabelle | menu ▸ 2 ▸ 5: Anfang/Schritt

TI-Nspire CAS

Schritt für Schritt

1 Wertetabellen erstellen

✍ nach der Tour

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = 0{,}5x^3 - 2x^2 + 3$$

a) Erstellen Sie eine Wertetabelle mit Tabellenanfang −2 und Tabellenschritt 1. Übertragen Sie die Werte.

x	−2	−1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$								

b) Ändern Sie die Einstellungen: Tabellenanfang 1, Tabellenschritt 0,5. Runden Sie auf zwei Nachkommastellen.

x	1	1,5	2	2,5	3	3,5
$f(x)$						

2 Wertetabellen mit anderem Tabellenschritt

✍ nach der Tour

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = -0{,}2x^2 + 1{,}6x + 2$$

a) Erstellen Sie eine Wertetabelle mit Tabellenanfang −3 und Tabellenschritt 1.

x	−3	−2	−1	0	1	2	3	4
$g(x)$								

b) Ändern Sie die Einstellungen: Tabellenanfang 0, Tabellenschritt 2.

x	0	2	4	6	8	10
$g(x)$						

c) In Ihren Tabellen ist $g(x)$ am größten bei $x =$ _____. Der größte Wert ist $g(x) =$ _____.

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

Betrag von $f(-2)$	1. Nachkommastelle von $f(2{,}5)$	1. Nachkommastelle von $g(4)$	Vorkommastelle von $g(6)$

Lösung Übung