# Lage- und Streuungsmaße

Taschenrechner-Führerschein · Beschreibende Statistik · CASIO fx-991DE X

rwb. | fhr.

Name: Datum:

SO GEHT'S AM FX-991DE X

| | |
|---|---|
| START | MENU → **6** (Statistik) → **1** (1-Variable) |
| EINGABE | jeden Wert eintippen und mit = bestätigen |
| ERGEBNISSE | OPTN → **3** (1-Variab-Berech) – mit ▼ blättern, AC zurück |
| HÄUFIGKEIT | SHIFT + MENU (SETUP) → ▼ → **3** (Statistik) → **1** (Ein) |
| NEUE AUFGABE | OPTN → **2** (Editor) → **2** (Alles löschen) |



Schritt für Schritt

**Achtung:** **σx** (sprich „Sigma x“) ist die **Standardabweichung**. Den Wert **sx** zwei Zeilen darunter brauchen Sie nicht.

**a) Urliste** (12 Werte) → Spalte x

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 9 |

**b) Häufigkeitstabelle** → $x_i$ in Spalte x, $h_i$ in Freq

| $x_i$ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_i$ | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |

| Kennwert | Zeichen im Rechner | a) Urliste | b) Häufigkeitstabelle |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der Werte** | $n$ | | |
| **Arithmetisches Mittel** | $\bar{x}$ | | |
| **Minimum** | $\min(x)$ | | |
| **Unteres Quartil** | $Q_1$ | | |
| **Median** | Med | | |
| **Oberes Quartil** | $Q_3$ | | |
| **Maximum** | $\max(x)$ | | |
| **Spannweite** | $\max(x) - \min(x)$ | | |
| **Quartilsabstand** | $Q_3 - Q_1$ | | |
| **Standardabweichung** | $\sigma x$ | | |
| **Modalwert** | *selbst ablesen* | | |

Runden Sie alle Ergebnisse auf **2 Stellen nach dem Komma**.

*Spannweite und Quartilsabstand rechnen Sie selbst aus. Den Modalwert (häufigster Wert) zeigt der Rechner nicht an – lesen Sie ihn aus der Urliste bzw. der Tabelle ab.*

**Lösung überprüfen**

Ergebnisse auf eine **ganze Zahl** runden und eintragen – das ist der Code.

| $\bar{x}$ Urliste | $\sigma x$ Urliste | $\bar{x}$ Häufigkeitstabelle | $\sigma x$ Häufigkeits-tabelle |
|---|---|---|---|
| | | | |

Lösung Übung