

## Devoir 4 MTH 6415

Olivier Sirois 1626107, Corey Ducharme

2018-01-01

## 4.19 (3.19 ed. 4)

a)

Comme montrer dans l'énoncé de b). Une décision optimale est prise si on trouve un stationnement lorsqu'il nous reste seulement  $k^*$  essais restants. Sachant cela, on peut traduire cette information sous forme:

$$\min E\{J_k(x_k)\} = \begin{cases} p * k + (1 - p) * E\{J_{k-1}(x_{k-1})\}, & \text{si } E > k^* \\ E\{J_{k-1}(x_{k-1})\}, & \text{si } E < k^* \end{cases}$$

qui peut être représenté comme étant:

$$\min E\{J_k(x_k)\} = \begin{cases} p * k + (1 - p) * E\{J_{k-1}(x_{k-1})\}, & \text{si } E > k^* \\ p * E\{J_{k-1}(x_{k-1})\} + (1 - p)E\{J_{k-1}(x_{k-1})\}, & \text{si } E < k^* \end{cases}$$

Étant donnée que  $p + (1 - p) = 1$ . En agrégeant ces deux cas, il est correct de dire:

$$\min E\{J_k(x_k)\} = p * \min(k, E\{J_{k-1}(x_{k-1})\}) + (1 - p) * E\{J_{k-1}(x_{k-1})\}$$

en définissant  $\min E\{J_k(x_k)\} = F_k$ , comme mentionné dans l'énoncé, on revient à l'équation originale, soit:

$$F_k = p * \min(k, F_{k-1}) + (1 - p) * F_{k-1}, q = (1 - p).$$

b)

Pour cette question, on nous demande de confirmer l'optimalité de la politique expliqué dans l'énoncé. Comme nous l'avons vu dans la question a), la fonction  $J$  utilise le minimum entre  $k$  et  $F_k$ . Si on réussit à prouver qu'il y a seulement un point d'intersection entre  $k$  et  $F_k$ , on est capable d'en déduire que la politique aura la forme décrite dans l'énoncé.

en utilisant les définitions de la question précédent et en commençant avec  $F_0 = C$ , on peut dire:

$$\begin{aligned} F_1(1) &= p * \min(1, C) + q * C \\ F_2(2) &= p * \min(2, C) + q * F_1(1) = p * \min(2, C) + q * p * \min(1, C) + q^2 * C \\ F_3(3) &= p * \min(3, C) + q * F_2(2) = p * \min(3, C) + q * p * \min(2, C) + q^2 * p * \min(1, C) + q^3 * C \end{aligned}$$

de forme plus générale :

$$F_k(k) = \begin{cases} q^k C + \sum_{i=1}^k i q^{k-i} p, & \text{si } k < C \\ q^k C + \sum_{i=1}^C i q^{k-i} p + \sum_{i=C}^k C q^{k-i} p, & \text{si } k > C \end{cases}$$

on peut alors traduire cette forme en différence:

$$F_k - F_{k-1} = q^k C - q^{k-1} C + k p$$

alors:

$$\begin{aligned} F_0 &= C \\ F_1 &= F_0 + q^1 C - q^0 C + p \\ F_2 &= F_1 + q^2 C - q^1 C + 2p \dots \end{aligned}$$

Avec un peu de manipulation, on peut voir que pour tout  $i$  satisfaisant à l'équation de l'énoncé,  $F_i - F_{i-1} < 1$ . cela nous assure donc que nous aura seulement une intersection avec  $k$  qui correspondra au seuil de la politique. Parallèlement, la valeur d' $i$  ou l'équation dans l'énoncé ne tiendra plus ce qui vérifie l'énoncé.

#### 4.16 (3.16 de l'ed. 4)

Pour ce problème, on peut se fier à l'exemple 3.4.1 (ed. 4) du livre de Bertsekas pour commencer. Évidemment, il y a certaines différences. On peut commencer par définir l'état de notre problème:

$$x_{k+1} = \max(x_k, w_k)$$

Étant donné que nous conservons toutes les offres, On peut dire que l'état serait la meilleur offre que nous avons eu jusqu'à présent. ou  $x_k$  est l'offre et que  $w_k$  est la prochaine offre que nous recevront. Si l'offre reçu est meilleur, elle prendra la place de  $x_k$ , sinon  $x_k$  restera.

On peut caractérisé les équations de programmation dynamique comme étant:

$$V_N(x_N) = x_N$$

et:

$$V_k(x_k) = \max[x_k, E[V_{k+1}(\max(x_k, E[\omega_k]))] - c * (N - k)]$$

Étant donnée qu'on conserve toutes les offres déjà eu auparavant, on peut assumer que l'ensemble  $T$  est absorbant. l'offre effective ne peut pas diminuer, alors selon le 'one step lookahead stopping rule', il s'ensuit que la première offre qui est égale ou excède  $\bar{\alpha}$  est optimale. Il est ensuite logique d'assumer que:

$$\alpha_k = E\{\max(x_{k+1}, E[\omega_{k+1}])\} - c * (N - k)$$

ou la limite asymptotique de  $\alpha_k$  qui peut être défini comme étant:

$$\bar{\alpha} = P(\bar{\alpha})\bar{\alpha} + \int_{\bar{\alpha}}^{\infty} \omega dP(\omega)$$

## 1.14 (1.21 de l'ed. 4)

Pour ce numéro on nous demande de vérifier l'optimalité des politiques décrites en a), b) et c). Nous allons premièrement commencer par généraliser le critère de sélection de  $u$  pour chaque étape.

étant donné que pour la prise de décision nous avons pas encore l'information pour chacune des valeurs  $w$  étant donné sa stochasticité, nous allons généraliser  $w_k = \bar{w}, \forall k$

$$\begin{aligned} J_N(x_N) &= x_N \rightarrow \text{aucune décision} \\ J_{N-1}(x_{N-1}) &= (1 - u_{N-1}) * x_{N-1} + J_N(x_{N-1} + x_{N-1} * \bar{w} * u_{N-1}) = \\ &J_{N-1}(x_{N-1}) = x_{N-1}(2 + u_{N-1}(\bar{w} - 1)) \\ J_{N-2}(x_{N-2}) &= (1 - u_{N-2}) * x_{N-2} + (x_{N-2} + x_{N-2} * u_{N-2} * \bar{w})(2 + u_{N-1}(\bar{w} - 1))... \end{aligned}$$

Comme vous pouvez le voir, la fonction  $J$  commence déjà à être très grande. Par contre, nous pouvons analyser la prise de chaque décision à partir de  $J_N$ . Évidemment, aucune décision ne peut être prise à  $J_N$  étant donné que c'est l'état final. Par contre, lorsqu'on remonte à  $J_{N-1}$ , on peut voir que sa dérivé donne tout simplement  $(\bar{w} - 1)$ .

**a)**

Sachant que  $\bar{w} > 1$ , nous savons que la première décision est  $u_{N-1} = 1$  vu que  $(\bar{w} - 1)$  est strictement positif. Pour maximiser le terme nous allons donc utiliser  $u_{N-1}$  jusqu'à sa limite positive qui est de 1.

Évidemment, on ne peut pas confirmer que toutes les étapes vont se comporter de cette manière. Cependant, nous pouvons fixer la valeur de  $u_{N-1}$  à 1 et le transmettre ensuite dans le terme  $J_{N-2}$ . Cela nous donnera donc:

$$\begin{aligned} J_{N-1} &= x_{N-1}(2 + (1) * (\bar{w} - 1)) = x_{N-1}(1 + \bar{w}) \\ J_{N-2} &= (1 - u_{N-2}) * x_{N-2} + (x_{N-2} + x_{N-2} * u_{N-2} * \bar{w})(1 + \bar{w}) = \dots \\ J_{N-2} &= x_{N-2}(2 + \bar{w} + u_{N-2}(\bar{w} + \bar{w}^2 - 1)) \end{aligned}$$

Encore une fois, le terme  $(\bar{w} + \bar{w}^2 - 1)$  est strictement positif étant donné que  $\bar{w} > 1$ . En continuant jusqu'à  $k$ , on peut ainsi voir que le terme à l'intérieur du  $u$  donne:

$$J_{N-k} = x_{N-k}(\dots + \underline{u_{N-k}(\bar{w} * (\bar{w} + 1)^{k-1} - 1)})$$

qui est strictement croissant dans le cas de  $\bar{w} > 1$ , ce qui confirme donc que la décision sera  $u_k = 1, \forall k$

**b)**

Dans le cas de  $0 < \bar{w} < \frac{1}{N}$ , on peut voir dès le départ que la décision pour  $J_{N-1}$  sera 0. De là, nous pouvons repartir de là pour trouver  $J_{N-2}$ . Donc:

$$\begin{aligned} J_{N-1} &= x_N(2) \\ J_{N-2} &= x_{N-2}(3 + u_{N-2}(2\bar{w} - 1)) \\ J_{N-3} &= x_{N-3}(4 + u_{N-3}(3\bar{w} - 1)) \dots \\ J_{N-k} &= x_{N-k}(k + 1 + u_{N-k}(k\bar{w} - 1)) \\ &\quad \& \\ J_{N-N} &= J_0 = x_0(N + 1 + u_0(N\bar{w} - 1)) \end{aligned}$$

On peut voir que tant que  $(k\bar{w} - 1) < 0$ , nous allons prendre comme décision  $u_k = 0$  étant donné que le maximum de  $J$  se trouve au point où  $u$  est minimale, soit 0 (sa limite inférieure). Évidemment, on peut voir aussi qu'avec  $\bar{w} = \frac{1}{N}$ , nous avons au point  $J_0$ :  $(\frac{N}{N} - 1) = 0$ , ce qui démontre qu'à la limite supérieure de notre plage pour  $\bar{w}$  nous avons une décision indécise, tandis qu'avec n'importe quel valeur de  $\bar{w} < \frac{1}{N}$ , nous aurons  $(k\bar{w} - 1) < 0, \forall k$ .

c)

Évidemment, pour cette question nous commençons avec une valeur de  $\bar{w} \leq 1$ , nous pouvons déjà voir que la valeur de  $(\bar{w} - 1)$  sera inférieur ou égale à 0, ce qui implique que notre première décision sera presque assurément  $u_{N-1} = 0$ . Évidemment, on peut réutiliser notre formule développer en b) pour trouver la valeur de  $k'$  qui rendra  $(k'\bar{w} - 1) \geq 0 \rightarrow \bar{w} \geq \frac{1}{k'}$ .

Par contre, le système est discret. Alors nous ne pouvons pas simplement utiliser cette formule directement. Par contre, en discrétisant la formule, nous allons nécessairement avoir une valeur  $\bar{k}$  dans lequel notre seuil se trouvera entre  $\bar{k}$  et  $\bar{k} + 1$ , ce qui nous ramène donc à la forme :

$$\frac{1}{\bar{k}+1} < \bar{w} \leq \frac{1}{\bar{k}}$$

alors, pour les valeurs ou  $0 \leq k \leq \bar{k}$ , nous aurons  $u_{N-k} = 0$ , et pour les valeurs ou  $N \geq k \geq \bar{k} + 1$ , nous aurons  $u_{N-k} = 1$ , ce qui correspond à l'énoncé.