
(a) Convergence of discrete minimax to continuous $n_{cx}c$ profiles
Pass/stopband ripple $\max|K - \mathbf{1}_{r\le 1}|$
Discrete disc radius R_{px} [pixels] ($W = 2\lceil 1.2R_{px}\rceil + 1$)
1c
2c
4c
6c
Shell-iso. $R = 2$ (1c)
Shell-iso. $R = 4$ (2c)
Unconstr. $R = 4$ (anisotropic)
Direct ℓ_2 SVD $R = 4$ (r.-cos)
Shell-iso. $R = 8$ (4c)
Shell-iso. $R = 12$ (6c)
Exact 0 ($L+1 \le R$)
(b) Warm start (sampled continuous) vs. cold starts
Shell-isotropic error $\max(\text{rip}, \|K - \mathcal{P}_{\text{iso}}K\|_\infty)$
Cumulative SVD rank-R projections k
$R_{px} = 6, R = 4$: Warm (cont.)
$R_{px} = 6, R = 4$: Cold (SVD r.-cos)
$R_{px} = 25, R = 4$: Warm (cont.)
$R_{px} = 25, R = 4$: Cold (SVD r.-cos)
$R_{px} = 25, R = 8$: Warm (cont.)
$R_{px} = 25, R = 8$: Cold (SVD r.-cos)
$R_{px} = 25, R = 12$: Warm (cont.)
$R_{px} = 25, R = 12$: Cold (SVD r.-cos)
$R_{px} = 25, R = 12$: Cold (SVD hard disc)
Small $R_{px} = 6$: cold SVD starts 3.5 × lower
Large $R_{px} = 25, R = 12$: warm 6c starts 2.2 × lower at $k = 0$