



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS EN REVERSA: FUERZA AXIOMÁTICA
Y FUNDAMENTOS LÓGICOS DE LOS SUBSISTEMAS
 RCA_0 , WKL_0 Y ACA_0

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

LICENCIADO EN MATEMÁTICA ALGORÍTMICA

PRESENTA:

OMAR PORFIRIO GARCÍA

DIRECTOR DE TESIS:

DAVID JOSÉ FERNÁNDEZ BRETÓN

Ciudad de México, 2026



Instituto Politécnico Nacional

Índice general

1. Teoría de la computabilidad	5
1.1. Computabilidad: Enfoque inductivo	5
1.1.1. Funciones primitivo-recursive	5
1.1.2. Funciones parcial-recursive	19
1.2. Computabilidad: Enfoque mecánico	25
1.2.1. Codificación de listas	33
1.2.2. Codificación de máquinas URM	36
2. Aritmética de segundo orden	41
2.1. Sintaxis	41
2.2. Semántica	45
2.3. Resultados y definiciones esenciales	48
3. El subsistema RCA_0	57
3.1. Teoría de números elemental	58
3.2. Sistemas numéricos	62
3.2.1. Los números enteros	62
3.2.2. Los números racionales	73
3.2.3. Los números reales	80
Referencias	85

Capítulo 1

Teoría de la computabilidad

1.1. Computabilidad: Enfoque inductivo

En esta sección abordaremos el enfoque inductivo de la computabilidad. Este se caracteriza por la construcción de lo computable por medio de ciertas funciones básicas y operaciones que permiten combinarlas. Frente al enfoque mecánico, el cual concibe un algoritmo como una secuencia de pasos ejecutados en el tiempo, este enfoque nos describe lo computable de una manera estructural: un algoritmo deja de ser una lista finita de instrucciones y, en cambio, se vuelve una combinación de otros algoritmos más simples. Este enfoque tiene como ventaja el poder justificar la computabilidad de una función por medio de la verificación de propiedades de cerradura; en lugar de exhibir una lista de pasos explícitos para cada función, solamente es necesario verificar que la función puede derivarse de otras que ya conozcamos como computables y que se obtengan mediante operaciones admisibles.

1.1.1. Funciones primitivo-recursive

El primer tipo de funciones que abordaremos son las *funciones primitivo-recursive*. El interés sobre este tipo de funciones es, por una parte, debido a que abarcan la mayoría de los objetos computables que podemos encontrarnos en la práctica; y por otra, a que son la mayoría de objetos que construiremos para estudiar la computabilidad.

La característica principal de las funciones primitivo-recursive es que se obtienen de funciones básicas mediante composición y recursión primitiva. La composición corresponde a la idea de poder utilizar diferentes algoritmos como subrutinas auxiliares que permitan ejecutar un algoritmo más complejo. La recursión, por su parte, puede interpretarse como un ciclo *for*: el número de iteraciones queda determinado de antemano por los

argumentos de la función, de modo que no solo tenemos la certeza de que el proceso ejecutará un número finito de pasos, sino de cuántos de ellos exactamente. Estos conceptos se definen formalmente de la siguiente manera.

Definición 1.1 (Funciones primitivo-recursivas). Sea $n \in \omega^+$. Una función $f : \omega^n \rightarrow \omega$ se denomina *primitivo-recursiva* si satisface alguna de las siguientes condiciones:

1. (Funciones básicas) La función f es una de las siguientes funciones:
 - La función *cero*: $Z : \omega^n \rightarrow \omega$ tal que para cada $x \in \omega^n$, $Z(x) = 0$.
 - Si $n = 1$, la función *sucesor*: $S : \omega \rightarrow \omega$ tal que para cada $x \in \omega$, $S(x) = x + 1$.
 - Para algún $k \in \omega^+$ con $k \leq n$, la función *proyección*: $\pi_k^n : \omega^n \rightarrow \omega$ tal que para cada $x_1, \dots, x_n \in \omega$, $\pi_k^n(x_1, \dots, x_n) = x_k$.
2. (Composición) Para algún $m \in \omega^+$ existen funciones primitivo-recursivas $g_1, \dots, g_m : \omega^n \rightarrow \omega$ y $h : \omega^m \rightarrow \omega$ tales que para cada $x \in \omega^n$, $f(x) = h(g_1(x), \dots, g_m(x))$.
3. (Recursión) Si $n > 1$ y existen funciones primitivo-recursivas $g : \omega^{n-1} \rightarrow \omega$ y $h : \omega^{n+1} \rightarrow \omega$ tales que para cada $x \in \omega^{n-1}$ y cada $y \in \omega$ se satisface que:

$$\begin{aligned} f(x, 0) &= g(x) \\ f(x, y + 1) &= h(x, y, f(x, y)) \end{aligned}$$

Para cada $n \in \omega^+$, denotamos por Prim_n al conjunto de todas las funciones primitivo-recursivas de aridad n . Definimos al conjunto de funciones primitivo-recursivas como $\text{Prim} := \bigcup_{n \in \omega^+} \text{Prim}_n$.

Ejemplo de cómo es que estas funciones modelan una parte de la computabilidad es el siguiente teorema.

Teorema 1.1. La suma, producto, exponenciación y las funciones constantes son funciones primitivo-recursivas.

Antes de ir a la demostración formal, veamos cómo es que podemos reescribir a estas funciones. Para el caso de la suma, notemos que si $\text{Suma}(x, y) = x + y$, entonces:

$$\text{Suma}(x, y + 1) = x + (y + 1) = (x + y) + 1 = \text{Suma}(x, y) + 1$$

por lo que la suma puede escribirse de manera recursiva sobre el segundo argumento. Notemos que para que la recursión esté bien definida necesitamos tener un caso base. En este caso tendríamos que $\text{Suma}(x, 0) = x + 0 = x$.

Similarmente para el caso del producto, si $\text{Prod}(x, y) = xy$, entonces:

$$\text{Prod}(x, y + 1) = x(y + 1) = xy + x = \text{Prod}(x, y) + x$$

con el caso base $\text{Prod}(x, 0) = x \cdot 0 = 0$.

Ahora para la exponenciación, si $\text{Exp}(x, y) = x^y$, entonces:

$$\text{Exp}(x, y + 1) = x^{y+1} = x^y x = \text{Exp}(x, y)x$$

con el caso base $\text{Exp}(x, 0) = x^0 = 1$.

Con esto vemos que estas operaciones pueden calcularse de manera recursiva, lo cual nos es de ayuda para poder utilizar recursión primitiva y así ver que estas funciones son primitivo-recursive.

Demostración. Para el caso de la suma definamos la función $f : \omega^2 \rightarrow \omega$ como:

$$\begin{aligned} f(x, 0) &= \pi_1^1(x) \\ f(x, y + 1) &= S(\pi_3^3(x, y, f(x, y))) \end{aligned}$$

Puesto que π_1^1 , S y π_3^3 son funciones primitivo-recursive, se tiene que f es primitivo-recursive. Mostremos entonces que para cada $x, y \in \omega$ se satisface que $f(x, y) = x + y$. Mostremos por inducción sobre y .

- (Base) Se tiene que para $y = 0$ se sigue que $f(x, 0) = \pi_1^1(x) = x = x + y$.
- (Paso inductivo) Sea $y \in \omega$ tal que $f(x, y) = x + y$. Entonces mostremos que $f(x, y + 1) = x + (y + 1)$. Por la definición de f se tiene lo siguiente:

$$f(x, y + 1) = S(\pi_3^3(x, y, f(x, y))) = S(f(x, y)) = f(x, y) + 1 = (x + y) + 1 = x + (y + 1)$$

Probando así la proposición.

Ahora, para el caso del producto definamos la función auxiliar $g : \omega^3 \rightarrow \omega$ para cada $x, y, z \in \omega$ como:

$$g(x, y, z) = \pi_3^3(x, y, z) + \pi_1^1(x, y, z)$$

la cual es primitivo-recursive debido a que π_1^1 , π_3^3 y la suma lo son. Ahora, el producto puede describirse como la función $f : \omega^2 \rightarrow \omega$ tal que:

$$\begin{aligned} f(x, 0) &= Z(x) \\ f(x, y + 1) &= g(x, y, f(x, y)) \end{aligned}$$

Puesto que Z y g son funciones primitivo-recursive, se tiene que f es primitivo-recursive. Mostremos entonces que para cada $x, y \in \omega$ se satisface que $f(x, y) = xy$. Mostremos por inducción sobre y .

- (Base) Se tiene que para $y = 0$ se sigue que $f(x, 0) = Z(x) = 0 = xy$.
- (Paso inductivo) Sea $y \in \omega$ tal que $f(x, y) = xy$. Entonces mostremos que $f(x, y + 1) = x(y + 1)$. Por la definición de f se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 f(x, y + 1) &= g(x, y, f(x, y)) \\
 &= \pi_3^3(x, y, f(x, y)) + \pi_1^3(x, y) \\
 &= f(x, y) + \pi_1^2(x, y) \\
 &= f(x, y) + x \\
 &= xy + x \\
 &= x(y + 1)
 \end{aligned}$$

Probando así la proposición.

Para el caso de la exponenciación definamos a la función auxiliar $h : \omega^3 \rightarrow \omega$ tal que:

$$h(x, y, z) = \pi_3^3(x, y, z)\pi_1^3(x, y, z)$$

la cual podemos asegurar que es primitivo-recursive ya que π_1^3 , π_3^3 y el producto lo son. Por lo tanto, la exponenciación puede describirse mediante la función $f : \omega^2 \rightarrow \omega$ tal que:

$$\begin{aligned}
 f(x, 0) &= S(Z(x)) \\
 f(x, y + 1) &= h(x, y, f(x, y))
 \end{aligned}$$

Puesto que S , Z y h son funciones primitivo-recursive, se tiene que f es primitivo-recursive. Mostremos entonces que para cada $x, y \in \omega^+$ se satisface que $f(x, y) = x^y$. Prosigamos por inducción sobre y .

- (Base) Para $y = 0$ se sigue que $f(x, 0) = S(Z(x)) = 1 = x^y$.
- (Paso inductivo) Sea $y \in \omega$ tal que $f(x, y) = x^y$. Entonces mostremos que $f(x, y + 1) = x^{y+1}$. Por la definición de f se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 f(x, y + 1) &= h(x, y, f(x, y)) \\
 &= \pi_3^3(x, y, f(x, y))\pi_1^3(x, y, f(x, y)) \\
 &= f(x, y)x \\
 &= x^y x \\
 &= x^{y+1}
 \end{aligned}$$

Probando así la proposición.

Para cada $m \in \omega$ y cada $n \in \omega^+$ denotemos por $f_m^n : \omega^n \rightarrow \omega$ a la función constante m , es decir, tal que para cada $x \in \omega^n$ se satisface que $f_m^n(x) = m$. Mostremos por inducción sobre la constante m que f_m^n es primitivo-recursiva.

- (Base) Sea $n \in \omega^+$. Para la función f_0^n claramente que tiene que $f_0^n = Z \circ \pi_1^n$. Puesto que f_0^n es composición de funciones básicas, entonces es primitivo-recursiva.
- (Paso inductivo) Sean $n \in \omega^+$ y $m \in \omega$ tales que f_m^n es primitivo-recursiva. Notemos que $f_{m+1}^n = S \circ f_m^n$. Puesto que S es una función básica y f_m^n es primitivo-recursiva, entonces f_{m+1}^n es primitivo-recursiva.

Por lo tanto, para cada $n \in \omega^+$ y cada $m \in \omega$ se tiene que f_m^n es primitivo-recursiva. $\square$

De la demostración anterior puede apreciarse que usar recursión es equivalente al uso de un *for* algorítmicamente hablando. Para el caso de la suma se tendría que $x + y$ comprendería ejecutar un algoritmo que devuelve el valor x si $y = 0$ y, en caso contrario, suma uno al valor x un número y de veces.

Algoritmo 1 Suma

Entrada: x, y

Salida: $x + y$

para $n = 0, \dots, y - 1$ **hacer**
 $x \leftarrow x + 1$
fin para
regresar x

En cuanto al producto xy se trataría de un algoritmo el cual utiliza un ciclo *for* que va sumando repetidamente el valor x un número y de veces. De manera similar para el caso de la exponenciación, el cual utilizaría un ciclo **for** para ir multiplicando el valor x un número y de veces.

Algoritmo 2 Producto

Entrada: x, y

Salida: xy

$z \leftarrow 0$
para $n = 0, \dots, y - 1$ **hacer**
 $z \leftarrow \text{Suma}(z, x)$
fin para
regresar z

Algoritmo 3 Exponenciación

Entrada: x, y **Salida:** x^y $z \leftarrow 1$ **para** $n = 0, \dots, y - 1$ **hacer** $z \leftarrow \text{Producto}(z, x)$ **fin para****regresar** z

Para poder demostrar que otras funciones comunes (y particularmente las unarias) son funciones primitivo-recursivas debemos demostrar que es posible debilitar la recursión primitiva. Observemos que en la definición 1.1 se nos permite utilizar recursión primitiva únicamente cuando la función a calcular tiene al menos dos argumentos. Sin embargo, existen funciones que pueden calcularse recursivamente mediante un solo argumento (como el factorial). Por lo tanto, es necesario demostrar que utilizar este tipo de recursión más débil también genera funciones primitivo-recursivas.

Teorema 1.2 (Recursión simple). Sean $a \in \omega$ y $g : \omega^2 \rightarrow \omega$ primitivo-recursiva. Entonces la función $f : \omega \rightarrow \omega$ definida como sigue, para cada $x \in \omega$, es primitivo-recursiva:

$$\begin{aligned} f(0) &= a \\ f(x+1) &= g(x, f(x)) \end{aligned}$$

Demostración. Consideremos primero a las funciones auxiliares $h_0 : \omega^3 \rightarrow \omega$ tal que $h_0 = g(\pi_2^3, \pi_3^3)$ y $h : \omega^2 \rightarrow \omega$ definida como sigue para cada $x, y \in \omega$:

$$\begin{aligned} h(x, 0) &= f_a^1(x) \\ h(x, y+1) &= h_0(x, y, h(x, y)) \end{aligned}$$

Notemos que las funciones h_0 y h son primitivo-recursivas puesto que g y las funciones proyección son primitivo-recursivas. Afirmamos que h es una extensión de f donde su primer argumento no afecta a la recursión, de modo que $f = h(Z, \pi_1^1)$. Mostremos tal afirmación por inducción:

- (Base) Se tiene que $h(Z(0), \pi_1^1(0)) = h(0, 0) = f_a^1(0) = a = f(0)$.
- (Paso inductivo) Sea $x \in \omega$ tal que $f(x) = h(Z(x), \pi_1^1(x)) = h(0, x)$, entonces se

tiene que:

$$\begin{aligned}
 h(Z(x+1), \pi_1^1(x+1)) &= h(0, x+1) \\
 &= h_0(0, x, h(0, x)) = g(\pi_2^3(0, x, h(0, x)), \pi_3^3(0, x, h(0, x))) \\
 &= g(x, h(0, x)) \\
 &= g(x, f(x)) \\
 &= f(x+1)
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se cumple que $f = h(Z, \pi_1^1)$, la cual es primitivo-recursive ya que h es primitivo-recursive. $\square$

Con este teorema podemos entonces demostrar que las funciones factorial, predecesor y resta son primitivo-recursive.

Teorema 1.3. Las siguientes funciones son primitivo-recursive.

1. El factorial, es decir, la función $f : \omega \rightarrow \omega$ tal que para cada $x \in \omega$:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot x, & x > 0 \end{cases}$$

2. La función predecesor, es decir, la función $f : \omega \rightarrow \omega$ tal que para cada $x \in \omega$:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ x - 1, & x > 0 \end{cases}$$

3. La función resta en ω , es decir, la función $f : \omega^2 \rightarrow \omega$ tal que para cada $x, y \in \omega$:

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & x \leq y \\ x - y, & x > y \end{cases}$$

Demostración. Para el factorial notemos que tal función se puede definir de la siguiente manera recursiva:

$$\begin{aligned}
 f(0) &= 1 \\
 f(x+1) &= (x+1) \cdot f(x)
 \end{aligned}$$

la cual es primitivo-recursive por los teoremas anteriores.

En el caso de la función predecesor, se puede definir recursivamente como sigue:

$$\begin{aligned}
 f(0) &= 0 \\
 f(x+1) &= \pi_1^2(x, f(x))
 \end{aligned}$$

la cual es primitivo-recursiva por los teoremas anteriores igualmente. Denotemos a la función predecesor como $\text{Pred}(x)$.

Para el caso de la resta, esta se puede definir recursivamente como sigue:

$$\begin{aligned} f(x, 0) &= \pi_1^1(x) \\ f(x, y + 1) &= \text{Pred}(\pi_3^3(x, y, f(x, y))) \end{aligned}$$

Mostremos en este caso que realmente se trata de la resta restringida a ω por inducción sobre el segundo argumento. Para ello, dividamos en dos casos: cuando $y \leq x$ y cuando $y > x$.

Supongamos que $y \leq x \in \omega$ y mostremos por inducción sobre y que $f(x, y) = x - y$.

- (Base) Directamente se tiene que $f(x, 0) = \pi_1^1(x) = x = x - 0 = x - y$.
- (Paso inductivo) Sea $y < x$ para el cual $f(x, y) = x - y$ y mostremos que $f(x, y + 1) = x - (y + 1)$.

$$\begin{aligned} f(x, y + 1) &= \text{Pred}(\pi_3^3(x, y, f(x, y))) \\ &= \text{Pred}(f(x, y)) \\ &= f(x, y) - 1 \\ &= (x - y) - 1 \\ &= x - (y + 1) \end{aligned}$$

Notemos que en este caso, como $y < x$, entonces $f(x, y) = x - y > 0$, por lo que en efecto $\text{Pred}(f(x, y)) = f(x, y) - 1$.

Ahora, para el caso cuando $y > x$, notemos que existe $z \in \omega$ para el cual $y = x + 1 + z$. Por lo tanto, mostremos por inducción sobre z que $f(x, y) = 0$.

- (Base) Notemos directamente que $f(x, x + 1) = \text{Pred}(f(x, x)) = \text{Pred}(0) = 0$.
- (Paso inductivo) Sea $z \in \omega$ para el cual se satisface que $f(x, x + 1 + z) = 0$, entonces mostremos que $f(x, x + 1 + (z + 1)) = 0$.

$$\begin{aligned} f(x, x + 1 + (z + 1)) &= f(x, (x + 1 + z) + 1) \\ &= \text{Pred}(f(x, x + 1 + z)) \\ &= \text{Pred}(0) = 0 \end{aligned}$$

Por lo que, en efecto, se concluye que f es la función resta restringida a ω . □

Podemos extender la definición de primitivo-recursión a subconjuntos y relaciones de números naturales. Esta extensión es fundamental puesto que saber si podemos computar un conjunto es lo que nos permite determinar qué problemas pueden o no ser resueltos por medio de algoritmos. Un conjunto se dice *primitivo-recursivo* si podemos determinar si un elemento pertenece a él por medio de una función primitivo-recursiva; lo cual se traduce en que su función característica es primitivo-recursiva. Más aún, esto se puede extender a propiedades. Una propiedad se denomina primitivo-recursiva si podemos *decidir* si un elemento la satisface o no mediante una función primitivo-recursiva. Notemos que cualquier propiedad sobre los naturales puede ser traducida al conjunto que define, y si este conjunto es primitivo-recursivo, entonces se tiene que siempre podemos determinar si cualquier elemento la satisface.

Definición 1.2 (Conjuntos primitivos recursivos). Sea $A \subseteq \omega^n$ para algún $n \in \omega^+$. El conjunto A se dice ser *primitivo-recursivo* si su función característica $\chi_A : \omega^n \rightarrow \omega^+$ es primitivo-recursiva.

Ejemplos de conjuntos que son primitivos recursivos están descritos en el siguiente teorema.

Teorema 1.4. Los conjuntos $>, <, = \subseteq \omega^2$, $\{0\}$ y ω^+ son primitivos recursivos.

Demostración. Notemos que $\chi_{\{0\}}(x) = 1 - x$ para cada $x \in \omega$, puesto que cuando $x = 0$, se tiene que $1 - x = 1$; y cuando $x > 0$, entonces $1 - x = 0$ por definición de resta restringida. Puesto que la resta es primitivo-recursiva, se sigue que $\chi_{\{0\}}$ es primitivo-recursiva.

Puesto que $\chi_{\omega^+}(x) = 1 - \chi_{\{0\}}(x)$ para cada $x \in \omega$ y $\chi_{\{0\}}$ es primitivo-recursiva, se sigue que χ_{ω^+} es primitivo-recursiva.

Finalmente, puesto que $\chi_{<}(x, y) = \chi_{\omega^+}(y - x)$, $\chi_{>}(x, y) = \chi_{\omega^+}(x - y)$ y $\chi_{=}(x, y) = \chi_{\{0\}}(\chi_{<}(x, y) + \chi_{>}(x, y))$ para cada $x, y \in \omega$, se concluye que $\chi_{<}$, $\chi_{>}$ y $\chi_{=}$ son primitivo-recursivas. $\square$

Teorema 1.5. Sean $n \in \omega^+$ y $A, B \subseteq \omega^n$. Si A y B son primitivo-recursivos, entonces $\omega^n \setminus A$, $A \cup B$ y $A \cap B$ son primitivo-recursivos.

Demostración. Se tiene que $\chi_{\omega^n \setminus A} = 1 - \chi_A$, $\chi_{A \cap B} = \chi_A \chi_B$ y $\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A \cap B}$, y puesto que A y B son primitivo-recursivos, se sigue que $\omega^n \setminus A$, $A \cup B$ y $A \cap B$ son primitivo-recursivos. $\square$

Corolario 1.6. Sean $n \in \omega^+$ y φ, ψ fórmulas con n variables libres. Si φ y ψ definen conjuntos primitivos recursivos, entonces $\neg\varphi$, $\varphi \wedge \psi$ y $\varphi \vee \psi$ definen conjuntos primitivos

recursivos en ω^n .

Lo siguiente es demostrar que la clase de funciones primitivo-recursivas es cerrada bajo ciertas operaciones, lo que será de mucha utilidad a lo largo del capítulo.

Teorema 1.7. Sean $n \in \omega^+$, y $f : \omega^{n+1} \rightarrow \omega$ y $g : \omega^n \rightarrow \omega$ funciones primitivo-recursivas. Entonces:

1. la función $h : \omega^n \rightarrow \omega$ dada por $h(x) = \sum_{z < g(x)} f(x, z)$ para cada $x \in \omega^n$ es primitivo-recursiva.
2. la función $h : \omega^n \rightarrow \omega$ dada por $h(x) = \prod_{z < g(x)} f(x, z)$ para cada $x \in \omega^n$ es primitivo-recursiva.

Demostración. Mostremos únicamente para el primer punto puesto que el segundo es análogo. Definamos entonces la función $p : \omega^{n+1} \rightarrow \omega$ tal que para cada $x \in \omega^n$:

$$\begin{aligned} p(x, 0) &= 0 \\ p(x, y+1) &= p(x, y) + f(x, y) \end{aligned}$$

Mostremos que $p(x, y) = \sum_{z < y} f(x, z)$ para cada $x \in \omega^n$ y $y \in \omega^+$ por inducción sobre y .

- (Base) Se tiene que si $y = 0$, entonces:

$$p(x, 0) = 0 = \sum_{z < 0} f(x, z) = \sum_{z < y} f(x, z)$$

- (Paso inductivo) Sea $y > 0$ tal que $p(x, y) = \sum_{z < y} f(x, z)$, entonces mostremos que se cumple para $y+1$.

$$p(x, y+1) = p(x, y) + f(x, y) = \sum_{z < y} f(x, z) + f(x, y) = \sum_{z < y+1} f(x, z)$$

Probando así lo que se requería. Puesto que f es primitivo-recursiva, se sigue que p es primitivo-recursiva. De lo anterior se sigue entonces que $h(x) = p(x, g(x))$, y luego h es primitivo-recursiva ya que p y g lo son.

□

Notación 1.1. Sean $t \in \omega$, $n \in \omega^+$ y $R \subseteq \omega^{n+1}$, entonces para cada $x \in \omega^n$ denotamos por:

- $(\exists m < t)R(x, m)$ a la expresión $\exists m((m < t) \wedge ((x, m) \in R))$.
- $(\forall m < t)R(x)$ a la expresión $\forall m((m < t) \rightarrow ((x, m) \in R))$.

- $(\exists m \leq t)R(x)$ a la expresión $\exists m((m \leq t) \wedge ((x, m) \in R))$.
- $(\forall m \leq t)R(x)$ a la expresión $\forall m((m \leq t) \rightarrow ((x, m) \in R))$.

Corolario 1.8. Sean $n \in \omega^+$, $R \subseteq \omega^{n+1}$ primitivo-recursive y $f : \omega^n \rightarrow \omega$ primitivo-recursive, entonces:

- el conjunto $\{x \in \omega^n : (\exists z < f(x))R(x, z)\}$ es primitivo-recursive.
- el conjunto $\{x \in \omega^n : (\forall z < f(x))R(x, z)\}$ es primitivo-recursive.

Antes de demostrar este corolario es importante mencionar que este tipo de expresiones son fundamentales dentro de la Teoría de la Computabilidad, y particularmente cuando desarrollemos la teoría de la Aritmética de Segundo Orden. A estas expresiones las denominamos "búsquedas". Por ejemplo, para verificar que la expresión $(\exists z < f(x))R(x, z)$ es verdadera, se puede ir comprobando con todos los valores $z = 0, 1, \dots, f(x) - 1$ si se satisface $(x, z) \in R$, uno por uno, buscando cuál de esos valores satisface tal pertenencia; y la expresión sería falsa si nunca encontramos tal valor. Para el caso de $(\forall z < f(x))R(x, z)$, podemos en cambio verificar si la expresión es falsa buscando entre todos los valores $z = 0, 1, \dots, f(x) - 1$ si $(x, z) \notin R$; y si nunca encontramos tal contraejemplo, entonces la expresión original es verdadera.

Es importante notar que los procedimientos descritos siempre terminan, pues existe un número finito de candidatos (los valores entre 0 y $f(x)$) que podemos verificar. No importa si en la práctica tarda demasiado verificar todos y cada uno de ellos, teóricamente siempre podemos decidir si las expresiones son verdaderas o falsas.

Ahora, para demostrar que estos conjuntos son primitivo-recursive la idea es justamente saber cuándo las fórmulas son verdaderas. Para el caso de $(\exists z < f(x))R(x, z)$, como mencionamos anteriormente, podemos verificar si alguno de los valores $\chi_R(x, 0), \chi_R(x, 1), \dots, \chi_R(x, f(x) - 1)$ es igual a uno; si al menos un término es igual a uno, entonces la fórmula se satisface. La forma de condensar esto en una única expresión es sumar todos los valores, pues la suma será mayor que cero si al menos un valor satisface la fórmula, y será cero si ninguno la satisface, de modo que podemos devolver uno si la suma es mayor que cero y devolvemos cero en caso contrario.

De manera similar, para la expresión $(\forall z < f(x))R(x, z)$ debemos verificar que todos los valores $\chi_R(x, 0), \chi_R(x, 1), \dots, \chi_R(x, f(x) - 1)$ son uno para que la fórmula se satisfaga. Eso podemos lograrlo multiplicando todos los valores; si todos son uno, el producto será uno (indicando que la fórmula se satisface), y si al menos uno es cero, entonces el producto será cero (indicando que la fórmula es falsa).

Demostración. Denotemos a los conjuntos como $S = \{x \in \omega^n : (\exists z < f(x))R(x, z)\}$ y $T = \{x \in \omega^n : (\forall z < f(x))R(x, z)\}$, entonces se tiene que:

$$\chi_S(x) = \chi_{\omega^+} \left(\sum_{z < f(x)} \chi_R(x, z) \right)$$

$$\chi_T(x) = \prod_{z < f(x)} \chi_R(x, z)$$

Puesto que f y R son primitivos recursivos, se sigue que S y T son primitivos recursivos. $\square$

Cuando hablamos de computación, una herramienta fundamental en la práctica es el control de flujo *if-then-else*. Varias veces necesitamos que un programa computacional sea capaz de distinguir entre diferentes escenarios y realizar entonces acciones específicas para cada uno. Resulta relevante que esta estructura pueda ser modelada dentro de esta teoría. Notemos que una expresión *if-then-else* tiene la siguiente forma:

Algoritmo 4 *if-then-else*

```

si  $R_1(x)$  entonces
    regresar  $g_1(x)$ 
si no si  $R_2(x)$  entonces
    regresar  $g_2(x)$ 
     $\vdots$ 
si no si  $R_m(x)$  entonces
    regresar  $g_m(x)$ 
si no
    regresar  $g_{m+1}(x)$ 
fin si

```

Donde las expresiones $R_1, \dots, R_m$ son las condiciones (disjuntas) que nos permiten discernir entre los diferentes escenarios y las cuales se evalúan para determinar si alguna se satisface para entonces ejecutar el código descrito por g_k para algún $k \leq m + 1$. Como hemos descrito anteriormente, una condición o propiedad se corresponde con el conjunto que define; por lo que las condiciones pueden verse como relaciones primitivo-recursivas disjuntas. Para el caso de los códigos de cada rama, estos pueden ser representados como funciones primitivo-recursivas (nuestra forma de modelar un algoritmo hasta ahora). Por lo tanto, una expresión *if-then-else* puede modelarse dentro de este marco como una función primitivo-recursiva definida a trozos.

Teorema 1.9. Sean $n, m \in \omega^+$, funciones primitivo-recursivas $g_1, \dots, g_m, g_{m+1} : \omega^n \rightarrow \omega$ y relaciones primitivo-recursivas $R_1, \dots, R_m \subseteq \omega^n$ disjuntas a pares, entonces la función $f : \omega^n \rightarrow \omega$ tal que para cada $x \in \omega^n$:

$$f(x) = \begin{cases} g_1(x), & R_1(x) \\ \vdots & \\ g_m(x), & R_m(x) \\ g_{m+1}(x), & \text{en otro caso} \end{cases}$$

es primitivo-recursiva.

Demostración. Se sigue que:

$$f = \sum_{k=1}^m g_k \chi_{R_k} + g_{m+1} \chi_{\omega^n \setminus \bigcup_{k=1}^m R_k}$$

Por lo tanto, f es primitivo-recursiva. □

Ya sabemos que la búsqueda existencial acotada es primitivo-recursiva, pero en ciertas ocasiones no solamente necesitamos saber si tal existencia es afirmativa, sino obtener un valor específico que sea un testigo debido a que necesitamos operar con él. Por ejemplo, no solamente necesitamos saber si existen los números primos, sino obtener explícitamente un primo particular. Puesto que trabajamos dentro del marco de los números naturales, la forma más natural de elegir un testigo es tomar el mínimo de ellos. Esa es la razón por la que debemos verificar que computacionalmente podemos encontrar el mínimo elemento que pertenece a una relación.

Consideremos una relación $R(x, y)$ y $p \in \omega$. Para poder demostrar que encontrar el mínimo valor $z < p$ tal que $R(x, z)$ puede ser modelado por una función primitivo-recursiva primero debemos justificar que es posible verificar primitivo-recursivamente que un elemento es mínimo o no de una relación. Para ello construimos una relación $S(x, z)$ la cual nos describa el hecho de que $z = \min\{y : y < p \wedge R(x, y)\}$. Dado que trabajamos con existencia acotada y podemos verificar si un elemento es mínimo, el procedimiento consiste en determinar para cada valor $z < p$ si lo es o no. Ya que ser mínimo es una propiedad de unicidad, si existe, se asegura que hay un único z para el cual $\chi_S(x, z) = 1$ y para cualquier valor $y \neq z$ se tiene $\chi_S(x, y) = 0$. Por lo tanto, se puede aislar a z realizando la suma $\sum_{y < p} y \cdot \chi_S(x, y)$.

Teorema 1.10 (Minimización acotada). Sean $n \in \omega^+$, $R \subseteq \omega^{n+1}$ una relación primitivo-recursiva y $g : \omega^n \rightarrow \omega$ primitivo-recursiva. Entonces la función $f : \omega^n \rightarrow \omega$ tal que para cada $x \in \omega^n$:

$$f(x) = \begin{cases} \min\{y \in \omega : y < g(x) \wedge (x, y) \in R\}, & (\exists z < g(x))R(x, z) \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

es primitivo-recursiva.

Demostración. Consideremos a la relación:

$$S = \{(x, z) \in \omega^{n+1} : (x, z) \in R \wedge (\forall y < z)((x, y) \notin R)\}$$

Esta relación es primitivo-recursiva puesto que:

$$\chi_S(x, z) = \chi_R(x, z) \left(\prod_{y < g(x)} \chi_{\omega^n \setminus R}(y, x) \right)$$

Afirmamos que $(x, z) \in S$ si y solo si $z = \min\{y \in \omega : (x, y) \in R\}$. Consideremos que $(x, z) \in S$ pero $z \neq \min\{y \in \omega : (x, y) \in R\}$, por lo que existe $w < z$ tal que $(x, w) \in R$. Obtenemos entonces que w es un testigo de la fórmula $(\exists y < z)R(x, y)$, la cual es la negación de $(\forall y < z)((x, y) \notin R)$. Se sigue por la definición de la relación S que $(x, z) \notin S$; lo cual es una contradicción. Ahora, supongamos que $z = \min\{y \in \omega : (x, y) \in R\}$, entonces por definición de mínimo se satisface que $(x, z) \in R$ y para cada $y \leq z$ se satisface que $(x, y) \in R$ implica $y = z$. Luego, para cada $y < z$ se sigue que $(x, y) \notin R$ por contrarrecíproca, es decir, $(x, z) \in S$. Por lo tanto, la función f puede expresarse de la siguiente forma:

$$f(x) = \sum_{z < g(x)} z \chi_S(x, z)$$

Por lo tanto, f es primitivo-recursiva. □

Notación 1.2. A la función definida por el teorema anterior dados $n \in \omega^+$, $R \subseteq \omega^{n+1}$ una relación primitivo-recursiva y $g : \omega^n \rightarrow \omega$ primitivo-recursiva se le denota por $f(x) = (\mu z < g(x))R(x, z)$ para cada $x \in \omega^n$ y se lee como “el mínimo $z < g(x)$ tal que $(x, z) \in R$ ”.

Estas propiedades de las funciones primitivo-recursivas nos permiten mostrar que el conjunto de números primos es primitivo-recursivo, así como también la función que regresa el $(n+1)$ -ésimo primo. Esto es importante pues nos permitirá demostrar la enumeración de los algoritmos más adelante.

Teorema 1.11. La relación “divide a”, el conjunto de números primos y la función que devuelve el $(n + 1)$ -ésimo número primo para cada $n \in \omega$ son primitivo-recursivas.

Demostración. La relación “divide a” puede verse como la relación:

$$S = \{(x, y) \in \omega^2 : (\exists k \leq y)(y = kx)\}$$

Puesto que usamos búsqueda acotada y la igualdad es primitivo-recursiva, se tiene que S es primitivo-recursivo.

Ahora, sea $P \subseteq \omega$ el conjunto de los números primos. Notemos que:

$$P = \{x \in \omega : x > 1 \wedge \neg(\exists k < x)(k > 1 \wedge S(k, x))\}$$

Puesto que el “mayor que” y S son primitivo-recursivos, se sigue que P es primitivo-recursivo.

Finalmente, sea $f : \omega \rightarrow \omega$ tal que $f(n)$ es el $(n + 1)$ -ésimo primo para cada $n \in \omega$. Por la prueba de Euclides de la infinitud de los números primos sabemos que $f(n + 1) \leq f(n)! + 1$, por lo que f está dada como sigue:

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 \\ f(n + 1) &= (\mu p < f(n)! + 2)(p > f(n) \wedge p \in P) \end{aligned}$$

Puesto que el factorial y P son primitivo-recursivos, se tiene que f es primitivo-recursiva. $\square$

1.1.2. Funciones parcial-recursivas

Una extensión de las funciones primitivo-recursivas son las funciones parcial-recursivas. Esta clase de funciones es más general, puesto que resuelven un problema el cual las funciones primitivo-recursivas no: realizar iteraciones indefinidamente. Notemos que las funciones primitivo-recursivas se caracterizan por utilizar ciclos *for*, formalizados por el uso de la recursión primitiva. Aunque estas son suficientes para modelar la mayoría de funciones en la práctica, tienen un problema y es que el número de iteraciones que realizan está determinado por un límite específico. Notemos en todos los resultados anteriores que las sumas y productos, así como la minimización, tienen cotas específicas para poder ser calculadas. Esto nos restringe para poder calcular otro tipo de funciones más complejas por medio de algoritmos.

Un ejemplo simple es el algoritmo de bisección (o en general casi cualquier algoritmo de búsqueda de raíces). Aunque podemos realizar el método un número determinado de veces, esto no nos asegura que el resultado sea una aproximación satisfactoria al valor

real de la raíz de la función. En cambio, lo que se realiza habitualmente es ejecutar el método un número indefinido de veces hasta alcanzar una precisión deseada. El número de iteraciones es indefinido puesto que la naturaleza de la función y los límites del intervalo que estemos utilizando para encontrar la raíz no permiten definir en general el número de iteraciones necesarias para que el algoritmo acabe, o siquiera determinar si el algoritmo realmente acabará; pues existe el caso donde no exista raíz y el método se ejecute sin fin.

Entonces, aunque tener la opción de ejecutar ciclos un número indefinido de veces puede llevarnos a tener algoritmos que se ejecuten sin fin, nos da la flexibilidad de poder computar un mayor número de funciones que las primitivo-recursivas no pueden.

En la práctica lo que permite realizar iteraciones indefinidas son los ciclos *while*, pues estos ejecutan instrucciones hasta que cierta condición deje de satisfacerse. Si tal condición siempre se satisface, entonces el algoritmo se ejecutará para siempre. Formalmente lo que nos permitirá capturar la idea de un ciclo *while* es la minimización. Como vimos anteriormente, ya tenemos una forma de encontrar el mínimo elemento que satisface cierta condición, pero restringida a que tal valor mínimo sea menor a cierta cota dada. Si ahora debilitamos la condición eliminando la cota, tenemos la flexibilidad que requeríamos, pues en este caso ya no es sabido en qué momento se encontrará el elemento mínimo; o si siquiera lo encontraremos.

Las funciones que permiten este tipo de comportamiento se denominan *funciones parcial-recursivas*. Su nombre se debe a que pueden existir entradas de la función que nunca devuelvan un valor concreto debido a que el algoritmo se ejecuta por siempre. Si una función de esta clase siempre devuelve un resultado para cualquier entrada, entonces se denomina *total-recursiva*.

- Definición 1.3** (Funciones parciales). 1. Sea $\uparrow$ un conjunto tal que $\uparrow \notin \omega$. Definimos entonces al conjunto $\omega^\uparrow := \omega \cup \{\uparrow\}$.
2. Una *función parcial* es una función $f : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ para algún $n \in \omega$.
3. Sean $n \in \omega$, $f : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ parcial y $x \in \omega^n$. Si $f(x) = \uparrow$, entonces lo denotaremos por $f(x) \uparrow$; y si existe $y \in \omega$ tal que $f(x) = y$, entonces lo denotaremos por $f(x) \downarrow$.
4. Sean $n \in \omega$ y $f : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ parcial, entonces se define el *dominio* de f como el conjunto $\text{dom}(f) := \{x \in \omega^n : f(x) \downarrow\}$.
5. Sean $n \in \omega$ y $f : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ parcial, entonces f se denomina *total* si $\text{dom}(f) = \omega^n$.

Definición 1.4 (Funciones parcial-recursivas). Sea $n \in \omega^+$. Una función parcial $f : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ se denomina *parcial-recursiva* si satisface alguna de las siguientes condiciones:

1. (Funciones básicas) La función f es una de las siguientes funciones:

- La función *cero*: $Z : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ tal que para cada $x \in \omega^n$, $Z(x) = 0$.
- Si $n = 1$, la función *sucesor*: $S : \omega \rightarrow \omega^\uparrow$ tal que para cada $x \in \omega$, $S(x) = x+1$.
- Para algún $k \in \omega^+$ con $k \leq n$, la función *proyección*: $\pi_k^n : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ tal que para cada $x_1, \dots, x_n \in \omega$, $\pi_k^n(x_1, \dots, x_n) = x_k$.

2. (Composición) Para algún $m \in \omega^+$ existen funciones parcial-recursivas $g_1, \dots, g_m : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ y $h : \omega^m \rightarrow \omega^\uparrow$ tales que para cada $x \in \omega^n$:

$$f(x) = \begin{cases} h(g_1(x), \dots, g_m(x)), & g_1(x) \downarrow, \dots, g_m(x) \downarrow \\ \uparrow, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

3. (Recursión) Si $n > 1$ y existen funciones parcial-recursivas $g : \omega^{n-1} \rightarrow \omega^\uparrow$ y $h : \omega^{n+1} \rightarrow \omega^\uparrow$ tales que para cada $x \in \omega^{n-1}$ y cada $y \in \omega$ se satisface que:

$$\begin{aligned} f(x, 0) &= g(x) \\ f(x, y+1) &= \begin{cases} h(x, y, f(x, y)), & f(x, y) \downarrow \\ \uparrow, & f(x, y) \uparrow \end{cases} \end{aligned}$$

4. (Minimización) Existe una función parcial-recursiva $g : \omega^{n+1} \rightarrow \omega^\uparrow$ tal que:

$$f(x) = \begin{cases} \min\{y \in \omega : g(x, y) = 0 \wedge (\forall z < y)(g(x, z) \downarrow)\}, & \text{si existe} \\ \uparrow, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

A esta función se le denota por $\mu z(g(x, z) = 0)$ leída como “el mínimo z tal que $g(x, z) = 0$ ”.

Para cada $n \in \omega^+$, denotamos por Parcial_n al conjunto de todas las funciones parcial-recursivas de aridad n . Definimos al conjunto de funciones parcial-recursivas como $\text{Parcial} := \bigcup_{n \in \omega^+} \text{Parcial}_n$.

Una función se denomina *total-recursiva* si es parcial-recursiva y total.

Observemos que la minimización no acotada efectivamente puede verse como un ciclo *while*. Para poder encontrar el valor mínimo z que verifica $g(x, z) = 0$ podemos ir iterando sobre todos los valores desde $z = 0$ en adelante *mientras* no se satisfaga $g(x, z) = 0$. Si eventualmente un valor z sí satisface la igualdad, devolvemos tal valor; pero si ningún valor satisface la igualdad, entonces seguiremos buscando indefinidamente.

Algoritmo 5 *While*

```

 $z \leftarrow 0$ 
mientras  $g(x, z) \neq 0$  hacer
     $z \leftarrow z + 1$ 
fin mientras
regresar  $z$ 

```

Se tiene directamente lo siguiente.

Teorema 1.12. Toda función primitivo-recursive es total-recursive. Se tiene entonces que $\text{Prim} \subsetneq \text{Parcial}$.

El hecho de que existen funciones parcial-recursive que no son primitivo-recursive es un ejercicio muy sencillo de demostrar, puesto que la función constante $f(x, y) = 1$ es primitivo-recursive y luego $\mu z(f(x, z) = 0) \uparrow$ para cada $x \in \omega^+$. Aunque existen ejemplos de funciones parcial-recursive más interesantes, el punto central aquí es que el conjunto de funciones parcial-recursive es una extensión de las funciones primitivo-recursive justamente por la minimización no acotada.

Las demostraciones de la mayoría de los siguientes teoremas son análogas a las de sus contrapartes primitivo-recursive recurriendo a la definición 1.4.

Definición 1.5 (Conjuntos recursivos). Sean $n \in \omega^+$ y $A \subseteq \omega^n$, entonces A se denomina *recursivo* si χ_A es una función total-recursive.

Teorema 1.13. Se satisfacen cada una de las siguientes afirmaciones:

1. Sean $a \in \omega^\uparrow$ y $g : \omega^2 \rightarrow \omega^\uparrow$ parcial-recursive, entonces la función $f : \omega \rightarrow \omega^\uparrow$ definida como sigue para cada $x \in \omega$ es parcial-recursive:

$$\begin{aligned} f(0) &= a \\ f(x+1) &= g(x, f(x)) \end{aligned}$$

2. Sean $n \in \omega^+$ y $A, B \subseteq \omega^n$. Si A y B son recursivos, entonces $\omega^n \setminus A$, $A \cup B$ y $A \cap B$ son recursivos.
3. Sean $n \in \omega^+$ y φ, ψ fórmulas con n variables libres. Si φ y ψ definen conjuntos recursivos, entonces $\neg\varphi$, $\varphi \wedge \psi$ y $\varphi \vee \psi$ definen conjuntos recursivos en ω^n .

4. Sean $n \in \omega^+$, y $f : \omega^{n+1} \rightarrow \omega^\uparrow$ parcial-recursive y $g : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ total-recursive. Entonces:
- a) la función $h : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ dada por $h(x) = \sum_{z < g(x)} f(x, z)$ para cada $x \in \omega^n$ es parcial-recursive.
 - b) la función $h : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ dada por $h(x) = \prod_{z < g(x)} f(x, z)$ para cada $x \in \omega^n$ es parcial-recursive.
5. Sean $n \in \omega^+$, $R \subseteq \omega^{n+1}$ recursivo y $f : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ total-recursive, entonces:
- el conjunto $\{x \in \omega^n : (\exists m < f(x)) R(x, m)\}$ es recursivo.
 - el conjunto $\{x \in \omega^n : (\forall m < f(x)) R(x, m)\}$ es recursivo.
6. Sean $n, m \in \omega^+$, funciones parcial-recursive $g_1, \dots, g_m, g_{m+1} : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ y relaciones recursivas $R_1, \dots, R_m \subseteq \omega^n$ disjuntas a pares, entonces la función $f : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ tal que para cada $x \in \omega^n$:

$$f(x) = \begin{cases} g_1(x), & R_1(x) \\ \vdots & \\ g_m(x), & R_m(x) \\ g_{m+1}(x), & \text{en otro caso} \end{cases}$$

es parcial-recursive.

7. Sean $n \in \omega^+$, $R \subseteq \omega^{n+1}$ una relación recursiva y $g : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ total-recursive. Entonces la función $f : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ tal que para cada $x \in \omega^n$, $f(x) = (\mu z < g(x)) R(x, z)$ es parcial-recursive.
8. Sean $n \in \omega^+$ y $R \subseteq \omega^{n+1}$ una relación recursiva. Entonces la función $f : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ tal que para cada $x \in \omega^n$, $f(x) = \mu z R(x, z)$ es parcial-recursive.

Demostración. Los únicos dos puntos cuya demostración vale la pena detallar son (6) y (8).

Para el caso del punto (6), consideremos a $n, m \in \omega^+$, las funciones parcial-recursive $g_1, \dots, g_m, g_{m+1} : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ y las relaciones recursivas $R_1, \dots, R_m \subseteq \omega^n$ disjuntas a pares. Definamos $R_{m+1} = \omega^n \setminus \bigcup_{k=1}^m R_k$. Si definimos a f como:

$$f = \sum_{k=1}^{m+1} g_k \chi_{R_k}$$

entonces se tendría que si para algún $x \in \omega^n$ y algún $k \leq m + 1$ se satisface que $g_k(x) \uparrow$, entonces $f(x) \uparrow$ incluso cuando $\chi_{R_k}(x) = 0$. Para evitar ese comportamiento definamos para cada $k \leq m + 1$ la función auxiliar $h_k : \omega^{n+1} \rightarrow \omega^\uparrow$ como sigue para cada $x \in \omega^n$ y cada $y \in \omega$:

$$\begin{aligned} h_k(x, 0) &= 0 \\ h_k(x, y + 1) &= g_k(x) \end{aligned}$$

Notemos que $h_k(x, 0) = 0$ y $h_k(x, 1) = g_k(x)$. Definamos entonces para cada $k \leq m + 1$ las funciones $g'_k : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ para cada $x \in \omega^n$ como $g'_k(x) = h_k(x, \chi_{R_k}(x))$, la cual es parcial-recursiva. Notemos que estas funciones son tales que:

$$g'_k(x) = \begin{cases} g_k(x), & x \in R_k \\ 0, & x \notin R_k \end{cases}$$

De esta manera obtenemos que:

$$f = \sum_{k=1}^{m+1} g'_k$$

Ahora, para el punto (8), como R es recursiva, entonces $S := \omega^{n+1} \setminus R$ es recursiva, de lo cual se sigue que para cada $x \in \omega^n$:

$$f(x) = \mu z (\chi_S(x, z) = 0)$$

□

El punto (8) del teorema anterior es el que justifica nuestra interpretación de la minimización como el ciclo *while*. Dados x y la relación $R(x, z)$, si queremos encontrar el mínimo valor z para el cual $(x, z) \in R$, entonces iteramos desde $z = 0$ en adelante mientras no se satisfaga $(x, z) \in R$. En el primer momento que obtengamos un valor z que satisfaga $(x, z) \in R$, lo devolvemos, y entonces ese valor es el mínimo. Esto puede resumirse en el siguiente pseudocódigo:

Algoritmo 6 *While*

```

 $z \leftarrow 0$ 
mientras  $\neg R(x, z)$  hacer
     $z \leftarrow z + 1$ 
fin mientras
regresar  $z$ 

```

1.2. Computabilidad: Enfoque mecánico

El otro enfoque que tenemos de la computabilidad es uno con una visión más relacionada con la ejecución de una máquina. Este considera a los algoritmos como los objetos que normalmente utilizamos en la práctica: una lista de instrucciones finitas que ejecutamos para obtener un resultado. Aunque el enfoque inductivo nos facilita más operar los algoritmos para obtener otros, asegurando que mantenemos la cerradura, este enfoque es mejor para poder entender intuitivamente cómo funcionan procedimentalmente las funciones computables. Uno de los resultados más importantes será demostrar que el enfoque inductivo (con las funciones parcial-recursivas) y este nuevo son equivalentes mediante el teorema de la forma normal de Kleene.

Aunque el modelo más conocido para hablar de este enfoque son las máquinas de Turing, en este texto usaremos un modelo diferente, pero equivalente, el cual es el modelo de las *máquinas sin límite de registros* o *URM* (*Unlimited Register Machines*). Este modelo alternativo nos provee de una mayor ventaja conceptual y matemática, puesto que aquí los datos que entran y salen de la máquina son números naturales directamente, a diferencia de las máquinas de Turing que tratan con alfabetos para formar palabras (generalmente en binario) que después se interpretan como números naturales.

De manera simple podemos pensar en una URM como una lista de instrucciones que se ejecutan sobre una cinta compuesta de un número infinito de celdas, donde podemos escribir en cada una un número natural. A cada celda de la cinta se le denomina *registro*, y cada registro puede contener un único número natural. Por el momento denotaremos por R a la cinta, por R_n al n -ésimo registro de R y por $r_n \in \omega$ al contenido de R_n para cada $n \in \omega^+$. (Figura 1.1)




Figura 1.1: Cinta y registros

Ahora, las instrucciones que podemos utilizar se dividen en cuatro tipos:

1. Cero: Para cada $n \in \omega^+$ la instrucción $Z(n)$ indica que se anota 0 en el n -ésimo registro, es decir, en R_n se instancia $r_n \leftarrow 0$.
2. Sucesor: Para cada $n \in \omega^+$ la instrucción $S(n)$ indica que se le suma 1 al contenido del n -ésimo registro, es decir, en R_n se instancia $r_n \leftarrow r_n + 1$.

3. Transferir: Para cada $n, m \in \omega^+$ la instrucción $T(n, m)$ indica que se transfiere el contenido del n -ésimo registro al m -ésimo registro sin modificar el contenido del n -ésimo registro, es decir, en R_m se instancia $r_m \leftarrow r_n$.
4. Saltar: Para cada $n, m, k \in \omega^+$ la instrucción $J(n, m, k)$ indica que se compara el contenido de los registros n -ésimo y m -ésimo. Si sus contenidos son iguales, entonces se ejecuta la instrucción k ; y si no, entonces se sigue con la siguiente instrucción.

Una máquina URM es entonces una tupla de estas instrucciones, puesto que es importante conocer el orden en el cual se ejecutan las instrucciones.

Para entender mejor cómo se utilizan este tipo de máquinas, abordemos por ejemplo la ejecución de las instrucciones de la máquina $M = (J(2, 3, 5), S(1), S(3), J(1, 1, 1))$ tomando como punto de partida la cinta que inicialmente se instancia con $r_1 = 3$, $r_2 = 2$ y $r_n = 0$ para cada $n > 2$. (Figura 1.2)

3	2	0	0	0	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Figura 1.2: Cinta inicial para la máquina M

La ejecución de la máquina M se realiza yendo en secuencia por cada uno de los elementos de la tupla. Por lo tanto, se ejecuta primero la instrucción $J(2, 3, 5)$, la cual compara los contenidos de los registros R_2 y R_3 . Puesto que $r_2 = 2$ y $r_3 = 0$, entonces no se satisface que $r_2 = r_3$, por lo que se sigue con la siguiente instrucción. En esta iteración no se modificó ningún contenido de la cinta.

La siguiente instrucción en M es $S(1)$. Entonces se suma 1 al contenido en el primer registro, dando como resultado $r_1 = 3 + 1 = 4$. En este caso sí se modificó el contenido de la cinta, y el resultado se puede ver en la figura 1.3.

4	2	0	0	0	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Figura 1.3: Cinta después de ejecutar $S(1)$

Seguimos con la siguiente instrucción de la tupla que es $S(3)$, la cual indica que se debe sumar 1 al tercer registro, dando $r_3 = 0 + 1 = 1$, modificando la cinta como se ve en la figura 1.4.

La siguiente instrucción es $J(1, 1, 1)$ la cual pide comparar los contenidos del registro 1. Puesto que trivialmente $r_1 = r_1$, entonces debemos ejecutar después la instrucción 1,

4	2	1	0	0	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Figura 1.4: Cinta después de ejecutar $S(3)$

es decir, debemos volver al inicio de la tupla M y repetir el proceso de nuevo. En esta iteración no se modificó la cinta.

Ahora, al ejecutar $J(2, 3, 5)$ de nuevo se comparan los contenidos en los registros r_2 y r_3 . Puesto que $r_2 = 2 \neq 1 = r_3$, entonces proseguimos con la siguiente instrucción. En esta iteración no se modificó tampoco la cinta.

Continuando con la instrucción $S(1)$, se suma 1 al contenido en el primer registro, dando como resultado $r_1 = 4 + 1 = 5$, el cual se puede ver en la figura 1.5.

5	2	1	0	0	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Figura 1.5: Cinta después de ejecutar $S(1)$ por segunda vez

Seguimos con la siguiente instrucción $S(3)$ obteniendo como resultado $r_3 = 1 + 1 = 2$, modificando la cinta como se ve en la figura 1.6.


5	2	2	0	0	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Figura 1.6: Cinta después de ejecutar $S(3)$ por segunda vez

La siguiente instrucción es $J(1, 1, 1)$. Puesto que trivialmente $r_1 = r_1$, entonces se ejecuta la instrucción 1, volviendo al inicio de la tupla M . En esta iteración no se modificó la cinta. Cuando se ejecuta $J(2, 3, 5)$, de nuevo se comparan los contenidos en los registros r_2 y r_3 , y ya que $r_2 = 2 = r_3$, entonces la siguiente instrucción a ejecutar es la número 5.

Notemos que la tupla de instrucciones M solamente tiene 4 elementos, entonces no es posible realizar la instrucción 5 que se pidió en $J(2, 3, 5)$. Cuando esto pasa, se interpreta que el algoritmo ha terminado al no haber más instrucciones a ejecutar. Por lo tanto, la salida de este algoritmo es la cinta $r_1 = 5$, $r_2 = r_3 = 2$ y $r_n = 0$ para cada $n > 3$.

Por lo tanto, la ejecución completa de este algoritmo con la cinta de entrada $r_1 = 3$, $r_2 = 2$ y $r_n = 0$ para cada $n > 2$ es la que se muestra en la figura 1.7. En ella se puede ver cómo se van modificando los contenidos de los registros a medida que se ejecutan las instrucciones de la máquina M .

Figura 1.7: Ejecución completa de la máquina M

Este ejemplo nos permite entender cómo es la lógica de este tipo de objetos. Cada una de las cintas que se obtienen a lo largo de la ejecución del algoritmo puede verse como una sucesión de números naturales. Por ejemplo, la cinta de entrada del ejemplo se formaliza como la sucesión $(3, 2, 0, 0, 0, \dots)$. Luego, para cada iteración k del algoritmo se define la función $f_k : \omega \rightarrow \omega$ como la sucesión de números naturales que contienen los registros de la cinta en esa iteración, de modo que para cada $n \in \omega^+$, $f_k(n) = r_n$. De esta manera la ejecución del algoritmo dado por una máquina URM es una sucesión de funciones de números naturales $(f_k)_{k \in \omega}$ donde cada f_k es la representación de los números de los registros de la cinta en la k -ésima iteración. Por convención la cinta de entrada del algoritmo se corresponde con la 0-ésima iteración. Por lo tanto, como sucesiones, la ejecución de la máquina M puede verse de la siguiente manera:

$$\begin{array}{llllll}
f_0(1) = 3 & f_0(2) = 2 & f_0(3) = 0 & f_0(4) = 0 & \dots \\
f_1(1) = 3 & f_1(2) = 2 & f_1(3) = 0 & f_1(4) = 0 & \dots \\
f_2(1) = 4 & f_2(2) = 2 & f_2(3) = 0 & f_2(4) = 0 & \dots \\
f_3(1) = 4 & f_3(2) = 2 & f_3(3) = 1 & f_3(4) = 0 & \dots \\
f_4(1) = 4 & f_4(2) = 2 & f_4(3) = 1 & f_4(4) = 0 & \dots \\
f_5(1) = 4 & f_5(2) = 2 & f_5(3) = 1 & f_5(4) = 0 & \dots \\
f_6(1) = 5 & f_6(2) = 2 & f_6(3) = 1 & f_6(4) = 0 & \dots \\
f_7(1) = 5 & f_7(2) = 2 & f_7(3) = 2 & f_7(4) = 0 & \dots \\
f_8(1) = 5 & f_8(2) = 2 & f_8(3) = 2 & f_8(4) = 0 & \dots \\
f_9(1) = 5 & f_9(2) = 2 & f_9(3) = 2 & f_9(4) = 0 & \dots
\end{array}$$

Recordemos que el paso de un estado de la cinta a otro está completamente determinado por las instrucciones que tenga la máquina URM. Entonces, para poder manipular de manera adecuada tales instrucciones, y para poder describir de manera más explícita la sucesión de funciones $\{f_k\}_{k \in \omega}$, interpretamos a las instrucciones como tuplas de la siguiente forma:

$$Z(n) \rightarrow (0, n) \quad S(n) \rightarrow (1, n) \quad T(n, m) \rightarrow (2, n, m) \quad J(n, m, k) \rightarrow (3, n, m, k)$$

En este sentido se define al conjunto de *instrucciones* para las máquinas URM de la siguiente manera.

Definición 1.6 (Instrucciones). Se define al *conjunto de instrucciones* para las máquinas URM como el siguiente conjunto de tuplas:

$$\begin{aligned}
\text{Instr} := & \{(0, n) \in \omega^2 : n \in \omega^+\} \cup \{(1, n) \in \omega^2 : n \in \omega^+\} \\
& \cup \{(2, n, m) \in \omega^3 : n, m \in \omega^+\} \cup \{(3, n, m, k) \in \omega^4 : n, m, k \in \omega^+\}
\end{aligned}$$

Con ello se define ahora lo que es una máquina URM, entendida como una sucesión finita de instrucciones.

Definición 1.7 (Máquinas URM). Una *máquina URM* es una tupla no vacía $M \in \text{Instr}^{<\omega}$, es decir, es tal que existe $n \in \omega^+$ para el cual $M \in \text{Instr}^n$.

Recordando el ejemplo, al principio teníamos una cinta de entrada, la cual es una sucesión de elementos en ω , donde solo un número finito de ellos son diferentes de cero. Lo anterior es debido a que un algoritmo siempre se debe recibir como entrada un número finito de datos, lo cual podemos codificar como tal cinta con esos datos dispuestos a lo largo de ella. Entonces dar como entrada al algoritmo una tupla de datos $(x_1, \dots, x_k) \in \omega^k$ para algún $k \in \omega^+$ corresponde a definir la función $f_0 : \omega \rightarrow \omega$ tal que para cada $n \in \omega^+$:

$$f_0(n) := \begin{cases} x_n, & n \leq k \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Este concepto de datos de entrada es lo que justifica el hecho de que la cinta sea infinita, pues esa propiedad nos permite ingresar como entrada a un algoritmo un conjunto de datos arbitrariamente grande, e incluso poder usar los registros sobrantes como unidades de memoria que permitan almacenar datos auxiliares necesarios para computar lo que necesitamos.

Notemos que a lo largo de la descripción de la sucesión $\{f_k\}_{k \in \omega}$ no hemos descrito qué pasa con $f_k(0)$. La razón es porque se utiliza ese dato como auxiliar para poder determinar qué pasa entre cada iteración, almacenando el número de instrucción que se debe ejecutar de la máquina URM.

Con todo esto se define cómo es que se determina la sucesión de las cintas dadas por la ejecución de las instrucciones de la máquina URM.

Definición 1.8 (Ejecución de una máquina URM). Sean $M = (I_1, \dots, I_u)$ una máquina URM y $x = (x_1, \dots, x_n) \in \omega^n$ una tupla de entrada para algunos $n, u \in \omega^+$. Se define la *ejecución* de la máquina M con entrada x como la sucesión de funciones $\{f_k\}_{k \in \omega}$ definidas de la siguiente manera:

1. Para cada $m \in \omega$:

$$f_0(m) = \begin{cases} 1, & m = 0 \\ x_m, & 1 \leq m \leq n \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

2. Para cada $k \in \omega$, si $f_k(0) \leq u$ y además:

a) $I_{f_k(0)} = (0, i)$ para algún $i \in \omega^+$, se tiene entonces que para cada $m \in \omega$:

$$f_{k+1}(m) = \begin{cases} f_k(0) + 1, & m = 0 \\ 0, & m = i \\ f_k(m), & \text{en otro caso} \end{cases}$$

b) $I_{f_k(0)} = (1, i)$ para algún $i \in \omega^+$, se tiene entonces que para cada $m \in \omega$:

$$f_{k+1}(m) = \begin{cases} f_k(m) + 1, & m \in \{0, i\} \\ f_k(m), & \text{en otro caso} \end{cases}$$

c) $I_{f_k(0)} = (2, i, j)$ para algunos $i, j \in \omega^+$, se tiene entonces que para cada $m \in \omega$:

$$f_{k+1}(m) = \begin{cases} f_k(0) + 1, & m = 0 \\ f_k(i), & m = j \\ f_k(m), & \text{en otro caso} \end{cases}$$

d) $I_{f_k(0)} = (3, i, j, p)$ para algunos $i, j, p \in \omega^+$, se tiene entonces que para cada $m \in \omega$:

$$f_{k+1}(m) = \begin{cases} p, & m = 0 \text{ y } f_k(i) = f_k(j) \\ f_k(0) + 1, & m = 0 \text{ y } f_k(i) \neq f_k(j) \\ f_k(m), & \text{en otro caso} \end{cases}$$

3. Para cada $k > 0$, si $f_k(0) > u$, entonces $f_{k+1} = f_k$.

Decimos que la máquina M *termina su ejecución* dada la entrada x si existe $k \in \omega$ tal que $f_k(0) > u$.

Así formalmente hemos descrito el procedimiento que se había realizado en el ejemplo. Con esto dicho se define qué significa que una función sea *computable* desde este enfoque. De manera simple podemos definir el valor que produce una máquina URM, para cada entrada $x \in \omega^n$ con $n \in \omega^+$, como el contenido del primer registro si la ejecución acaba.

Por ejemplo, considerando el ejemplo que describimos anteriormente, las instrucciones generan un algoritmo tal que dada la entrada $(3, 2)$, al acabar su ejecución, devuelve el valor 5 en su primer registro. Resulta de hecho que la máquina que describimos, para cada par de entrada $(x, y) \in \omega^2$ el algoritmo termina y el valor del primer registro es su suma $x + y$. Por lo tanto, tal máquina es una implementación algorítmica de la función suma.

Sin embargo, dada la misma máquina $M = (J(2, 3, 5), S(1), S(3), J(1, 1, 1))$ podemos

darle de entrada ternas $(x, y, z) \in \omega^3$, generando como resultado una función $f : \omega^3 \rightarrow \omega^\uparrow$ con un comportamiento diferente al de la suma. Consideremos por ejemplo la entrada $(1, 1, 2)$, entonces se obtiene la siguiente ejecución:

$$\begin{array}{rcl}
 & & (1, 1, 2, 0, 0, \dots) \\
 J(2, 3, 5) & \rightarrow & (1, 1, 2, 0, 0, \dots) \\
 S(1) & \rightarrow & (2, 1, 2, 0, 0, \dots) \\
 S(3) & \rightarrow & (2, 1, 3, 0, 0, \dots) \\
 J(1, 1, 1) & \rightarrow & (2, 1, 3, 0, 0, \dots) \\
 J(2, 3, 5) & \rightarrow & (2, 1, 3, 0, 0, \dots) \\
 S(1) & \rightarrow & (3, 1, 3, 0, 0, \dots) \\
 S(3) & \rightarrow & (3, 1, 4, 0, 0, \dots) \\
 J(1, 1, 1) & \rightarrow & (3, 1, 4, 0, 0, \dots) \\
 J(2, 3, 5) & \rightarrow & (3, 1, 4, 0, 0, \dots) \\
 S(1) & \rightarrow & (4, 1, 4, 0, 0, \dots) \\
 & & \vdots
 \end{array}$$

Notemos que al seguir ejecutando las instrucciones el tercer registro siempre es mayor al valor del segundo registro, entonces la instrucción $J(2, 3, 5)$ nunca redirige a la instrucción 5; por lo que la ejecución nunca termina. En este caso se tiene que $f(1, 1, 2) \uparrow$. Se puede verificar también que si $(x, y, z) \in \omega^3$ es tal que $y \geq z$, entonces $f(x, y, z) = x + y - z$; y si $y < z$, entonces $f(x, y, z) \uparrow$.

Con esto podemos apreciar que la misma máquina URM puede darnos diferentes funciones únicamente variando el número de datos de entrada. Por lo tanto, la aridad de la función es esencial para determinar su comportamiento al ser computada mediante una máquina URM.

Definición 1.9 (Funciones URM-computables). Para cada máquina URM $M \in \text{Instr}^k$ para algún $k \in \omega^+$ y cada $n \in \omega^+$ se define la *función URM-computable* de M con aridad n como la función parcial $\varphi_M^{(n)} : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ tal que para cada $x \in \omega^n$ con ejecución $\{f_m^{(x)}\}_{m \in \omega} :$

$$\varphi_M^{(n)}(x) = \begin{cases} f_p^{(x)}(1), & \exists u \left(f_u^{(x)}(0) > k \right) \wedge \left(p = \min \left\{ u : f_u^{(x)}(0) > k \right\} \right) \\ \uparrow, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Una función parcial $f : \omega^n \rightarrow \omega^\uparrow$ para algún $n \in \omega^+$ se denomina *URM-computable* si existe una máquina URM M tal que $f = \varphi_M^{(n)}$.

Definimos al conjunto URMComp como el conjunto de las funciones parciales que son URM-computables.

Notación 1.3. Dada una máquina URM M , denotaremos por φ_M a la función URM-computable $\varphi_M^{(1)}$.

Como mencionamos antes, el objetivo de esta sección será demostrar que ambos enfoques de la computabilidad son equivalentes, o más formalmente, demostrar que se tiene la igualdad de conjuntos $\text{Parcial} = \text{URMComp}$. La contención más sencilla de demostrar es que toda función parcial-recursiva es URM-computable.

Teorema 1.14. Toda función parcial-recursiva es URM-computable.

Demostración. Probemos por inducción sobre el conjunto de funciones parcial-recursivas. Mostremos primero que las funciones básicas son URM-computables. Sean $n, k \in \omega^+$ con $k \leq n$ y definamos las máquinas $M_1 = ((0, 1))$, $M_2 = ((1, 1))$ y $M_3 = ((2, k, 1))$, entonces se sigue directamente que $Z = \varphi_{M_1}^{(n)}$, $S = \varphi_{M_2}$ y $\pi_k^n = \varphi_{M_3}^{(n)}$. $\square$

[1] Completar

Falta completar la demostración que las funciones parcial-recursivas son URM-computables.

1.2.1. Codificación de listas

Para poder demostrar que $\text{URMComp} \subseteq \text{Parcial}$ debemos ayudarnos de una herramienta esencial que es la *enumeración*, lo cual significa que a cada máquina podemos asignarle un único número natural para poder tratar como entradas de funciones parcial-recursivas a los algoritmos mismos. Para poder hacer eso debemos representar a su vez las tuplas de números naturales como números naturales por sí mismos. A esto se le denomina *codificación*. Aunque existen varias formas de poder codificar tuplas o listas de naturales, la forma más simple es por medio del teorema fundamental de la aritmética. La idea es poder hacer una inyección entre las listas y los naturales tratando a cada elemento de la lista como potencias de productos de primos. Por ejemplo, si tenemos la tupla $(1, 2, 3) \in \omega^{\uparrow 3}$, entonces podemos mapearlo al número $2^1 3^2 5^3$. Lo importante de esto es que el teorema fundamental de la aritmética nos asegura que tal producto de primos es único, por lo que podríamos recuperar la lista únicamente factorizando el número que lo representa y viendo sus potencias. Sin embargo, un problema de esta codificación algo burda es cuando tenemos listas con ceros, como por ejemplo las listas $(1, 2, 0, 0)$ y $(1, 2)$. Notemos en este caso que ambas listas serían mapeadas al número $2^1 3^2$ justamente porque existen ceros al final. Una forma para poder arreglar esto es sumar 1 a cada exponente en el mapeo. Por ejemplo, dadas las listas anteriores, podríamos mapear $(1, 2, 0, 0)$ a

$2^{1+1}3^{2+1}5^{0+1}7^{0+1}$ y mapear $(1, 2)$ a $2^{1+1}3^{2+1}$, donde aquí las listas ahora están mapeadas a diferentes números naturales. Esta forma de mapear listas ya asegura una inyección debido a que ya no tendríamos potencias nulas con listas con ceros como elementos.

Teorema 1.15. La función $f : \omega^{<\omega} \rightarrow \omega$ tal que para cada $n \in \omega$ y $x = (x_1, \dots, x_n) \in \omega^n$ y se define por:

$$f(x) = \prod_{k=1}^n p_k^{x_k+1}$$

donde p_k es el k -ésimo número primo es una inyección.

Demostración. Sean $x, y \in \omega^{<\omega}$ tales que $f(x) = f(y)$, entonces mostremos que $x = y$. Sean $n, m, x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m \in \omega$ tales que $x = (x_1, \dots, x_n)$ y $y = (y_1, \dots, y_m)$, entonces se tiene que:

$$f(x) = \prod_{k=1}^n p_k^{x_k+1} ; f(y) = \prod_{k=1}^m p_k^{y_k+1}$$

Ya que $f(x) = f(y)$, por el teorema fundamental de la aritmética sabemos que $n = m$ y para cada $k \leq n$ se tiene que $p_k^{x_k+1} = p_k^{y_k+1}$, de lo cual se sigue que $x_k = y_k$. Por lo tanto, $x = y$. $\square$

El objetivo ahora entonces es verificar que ciertas propiedades de esta codificación son primitivo-recursivas.

Definición 1.10 (Codificación de listas). Para cada $n \in \omega^+$ se define la función de codificación $f_n : \omega^n \rightarrow \omega$ tal que para cada $x = (x_1, \dots, x_n) \in \omega^n$:

$$f_n(x) = \prod_{k=1}^n p_k^{x_k+1}$$

Para cada $n \in \omega^+$ y cada $x = (x_1, \dots, x_n) \in \omega^n$ se denotará por $\langle x \rangle = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ a $f_n(x)$.

Teorema 1.16. Las funciones de codificación son primitivo-recursivas.

Demostración. Denotemos por $f : \omega \rightarrow \omega$ a la función que devuelve el $(n+1)$ -ésimo número primo, entonces se sigue para cada $n \in \omega^+$ que para cada $x \in \omega^n$:

$$\langle x \rangle = \prod_{k < n} (f(k+1))^{\pi_{k+1}^n(x)}$$

Ya que f , la función proyección, la potencia, suma y producto acotado son primitivo-recursivas, se sigue que las funciones codificación son primitivo-recursivas. $\square$

De esta forma podemos definir entonces al conjunto de *códigos* o *secuencias* de listas como el conjunto de números naturales que son código de una tupla. De manera auxiliar definiremos a 1 como la codificación de la lista vacía.

Definición 1.11 (Secuencias). Definimos al conjunto de *secuencias* o *códigos* como el siguiente subconjunto de ω :

$$\text{Seq} := \{1\} \cup \{\langle x \rangle \in \omega : x \in \omega^{<\omega}\}$$

Teorema 1.17. El conjunto de códigos Seq es primitivo-recursive.

Demostración. Denotemos por $P \subseteq \omega$ al conjunto de números primos y $D \subseteq \omega^2$ a la relación “divide a”. Notemos que la forma de caracterizar los códigos es que son productos de potencias de números primos consecutivos, lo cual puede verse como el conjunto de números n tales que si p es primo y divide a n , entonces todo primo menor a p también divide a n . Definamos entonces la fórmula:

$$\varphi(n) = (n > 0 \wedge (\forall p \leq n)((p \in P \wedge (p, x) \in D) \rightarrow (\forall q \leq p)(q \in P \rightarrow (q, x) \in D)))$$

Se tiene entonces que $\text{Seq} = \{n \in \omega : \varphi(n)\}$; para el caso de 1 se satisface también que $\varphi(1)$ por vacuidad ya que ningún primo es menor o igual que 1. Ya que P y D son primitivo-recursive, por los teoremas 1.6 y 1.8 sabemos entonces que Seq es primitivo-recursive. $\square$

Ahora definimos dos operaciones básicas para poder manipular las listas que usaremos demasiado.

Definición 1.12 (Máxima potencia, acceso y longitud). Definimos las siguientes funciones:

1. la función *máxima potencia* $\text{MaxP} : \omega^2 \rightarrow \omega$ definida como sigue para cada $x, y \in \omega$:

$$\text{MaxP}(x, y) = \begin{cases} \text{máx}\{n \in \omega : x^n \mid y\}, & x > 1, y > 0 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

2. para cada $k \in \omega^+$, la función *acceso* al $(k+1)$ -ésimo elemento $f_k : \omega \rightarrow \omega$ definida como sigue para cada $e \in \omega$:

$$f_k(e) = \begin{cases} x_k, & \exists n(\exists x_0, \dots, x_{n-1} \in \omega)(k < n \wedge e = \langle x_0, \dots, x_{n-1} \rangle) \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Denotaremos por $e[k]$ a $f_k(e)$.

3. la función *longitud* $\text{Len} : \omega \rightarrow \omega$ definida como sigue para cada $e \in \omega$:

$$\text{Len}(e) = \begin{cases} n, & \exists n \exists x \in \omega^n (e = \langle x \rangle) \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Teorema 1.18. Las funciones máxima potencia, acceso y longitud son primitivo-recursive.

Demostración. Para la función máxima potencia, si $D \subseteq \omega^2$ es la relación “divide a”, se tiene lo siguiente para cada par $x, y \in \omega$:

$$\text{MaxP}(x, y) = \chi_{>}(x, 1) \chi_{>}(y, 0) ((\mu n < y + 1)((x^n, y) \notin D) - 1)$$

donde la resta se entiende como la resta en ω . Ya que D es primitivo-recursive, se sigue que MaxP es primitivo-recursive.

Ahora, sea $k \in \omega$, entonces para la función de acceso al $(k + 1)$ -ésimo elemento, si denotamos por $f : \omega \rightarrow \omega$ a la función que devuelve el $(n + 1)$ -ésimo número primo, se tiene lo siguiente para cada $e \in \omega$:

$$e[k] = \chi_{\text{Seq}}(e) (\text{MaxP}(f(k), e) - 1)$$

Finalmente, para la función longitud se tiene para cada $e \in \omega$ que:

$$\text{Len}(e) = \chi_{\text{Seq}}(e) (\mu n < e + 1)((f(n), e) \notin D)$$

□

1.2.2. Codificación de máquinas URM

Con todo esto desarrollado ahora podemos codificar a números naturales las máquinas URM. Recordemos que definimos a las máquinas URM como una secuencia de instrucciones, y cada una de estas instrucciones es a su vez representada como una tupla. Con todo esto, a cada máquina URM podemos directamente traducirla como la codificación de tales listas. Por ejemplo, si tomamos la máquina URM que calculaba la suma tendríamos la secuencia de tuplas:

$$M = ((1, 1), (1, 3), (3, 2, 3, 5), (3, 1, 1, 1))$$

La primer tupla $(1, 1)$ se codificaría como $\langle 1, 1 \rangle = 2^{1+1}3^{1+1} = 2^23^2 = 36$ por ejemplo. Las demás tuplas se codificarían de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}(1, 1) &\rightarrow \langle 1, 1 \rangle = 2^23^2 \\(1, 3) &\rightarrow \langle 1, 3 \rangle = 2^23^4 \\(3, 2, 3, 5) &\rightarrow \langle 3, 2, 3, 5 \rangle = 2^43^35^47^5 \\(3, 1, 1, 1) &\rightarrow \langle 3, 1, 1, 1 \rangle = 2^43^25^27^2\end{aligned}$$

Entonces podríamos codificar a M de manera similar de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}e &= \langle \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2, 3, 5 \rangle, \langle 3, 1, 1, 1 \rangle \rangle \\&= 2^{\langle 1, 1 \rangle + 1}3^{\langle 1, 3 \rangle + 1}5^{\langle 3, 2, 3, 5 \rangle + 1}7^{\langle 3, 1, 1, 1 \rangle + 1} \\&= 2^{2^23^2+1}3^{2^23^4+1}5^{2^43^35^47^5+1}7^{2^43^25^27^2+1}\end{aligned}$$

Aunque este número es gigantescamente grande y computacionalmente en la práctica sería muy difícil de calcular, teóricamente es posible, pero el punto principal aquí es que este número es único y con él podemos recuperar cuales son las instrucciones exactas de M usando todas las herramientas que hemos desarrollado. Por ejemplo, con esta máquina se tendría lo siguiente:

$$\begin{aligned}e[0] &= \langle 1, 1 \rangle \\e[1] &= \langle 1, 3 \rangle \\e[2] &= \langle 3, 2, 3, 5 \rangle \\e[3] &= \langle 3, 1, 1, 1 \rangle\end{aligned}$$

y de igual forma se tendría entonces:

$$\begin{aligned}e[0][0] &= 1 & e[1][0] &= 1 & e[2][0] &= 3 & e[3][0] &= 3 \\e[0][1] &= 1 & e[1][1] &= 3 & e[2][1] &= 2 & e[3][1] &= 1 \\&&&& e[2][2] &= 3 & e[3][2] &= 1 \\&&&& e[2][3] &= 5 & e[3][3] &= 1\end{aligned}$$

Luego pudimos recuperar cada instrucción por medio del acceso a la lista. Sin embargo, notemos que $e[0]$ corresponde a la *primera* instrucción de la máquina URM. Para no andar recorriendo los índices cada vez, la codificación de la máquina M iniciará en 0 solo para que los accesos a la lista y las instrucciones de M correspondan directamente. En el ejemplo que estábamos analizando se sigue que su código es el siguiente:

$$\langle 0, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2, 3, 5 \rangle, \langle 3, 1, 1, 1 \rangle \rangle$$

Se define entonces lo siguiente.

Definición 1.13 (Codificación de instrucciones y máquinas URM). Se definen los siguientes conjuntos de codificaciones de instrucciones y máquinas URM

$$\begin{aligned} \text{InstrCod} := & \{ \langle 0, n \rangle \in \omega : n \in \omega^+ \} \cup \{ \langle 1, n \rangle \in \omega : n \in \omega^+ \} \\ & \cup \{ \langle 2, n, m \rangle \in \omega : n, m \in \omega^+ \} \cup \{ \langle 3, n, m, k \rangle \in \omega : n, m, k \in \omega^+ \} \end{aligned}$$

$$\text{URMCod} := \{ \langle 0, x_1, \dots, x_n \rangle \in \omega : n \in \omega^+, x_1, \dots, x_n \in \text{InstrCod} \}$$

Teorema 1.19. Los conjuntos InstrCod y URMCod son primitivos recursivos.

Demostración. Para demostrar que InstrCod es primitivo-recursivo solo es necesario demostrar que cada uno de los conjuntos que lo componen son primitivos recursivos. Definamos los conjuntos $A_1 = \{ \langle 0, n \rangle \in \omega : n \in \omega^+ \}$, $A_2 = \{ \langle 1, n \rangle \in \omega : n \in \omega^+ \}$, $A_3 = \{ \langle 2, n, m \rangle \in \omega : n, m \in \omega^+ \}$ y $A_4 = \{ \langle 3, n, m, k \rangle \in \omega : n, m, k \in \omega^+ \}$. Notemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} e \in A_1 & \iff (e \in \text{Seq} \wedge \text{Len}(e) = 2 \wedge e[0] = 0) \\ e \in A_2 & \iff (e \in \text{Seq} \wedge \text{Len}(e) = 2 \wedge e[0] = 1) \\ e \in A_3 & \iff (e \in \text{Seq} \wedge \text{Len}(e) = 3 \wedge e[0] = 2) \\ e \in A_4 & \iff (e \in \text{Seq} \wedge \text{Len}(e) = 4 \wedge e[0] = 3) \end{aligned}$$

Ya que Seq, Len y la función de acceso son primitivo-recursivas, por el teorema 1.6 se sigue que A_1 , A_2 , A_3 y A_4 son primitivo-recursivas, y luego $\text{InstrCod} = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4$ es primitivo-recursiva.

Para URMCod, un elemento está en él si y solo si es un código y cada elemento de la lista es elemento de InstrCod. Ya que Len es primitivo-recursiva, se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} e \in \text{URMCod} & \iff (e \in \text{Seq} \wedge \text{Len}(e) > 1 \wedge e[0] = 0 \\ & \wedge \forall k ((k < \text{Len}(e) \wedge k > 0) \rightarrow e[k] \in \text{InstrCod})) \end{aligned}$$

Puesto que ya sabemos que InstrCod es primitivo-recursiva, entonces por los teoremas 1.6 y 1.8 se sigue que URMCod es primitivo-recursiva. $\square$

Lema 1.20. Para cada $e \in \text{Seq}$ y cada $k < \text{Len}(e)$, se satisface que $e[k] < e$.

Demostración. Se sabe que para cada número natural $n \in \omega$ se satisface que $n < 2^n$, entonces para cada $e \in \text{Seq}$ y cada $k < \text{Len}(e)$ se satisface lo siguiente:

$$e[k] < 2^{e[k]} \leq p_k^{e[k]+1} \leq e$$

$\square$

Teorema 1.21 (Máximo). Definimos a la función *máximo* $\text{Max} : \omega \rightarrow \omega$ de la siguiente manera:

$$\text{Max}(e) := \begin{cases} \text{máx}\{x_1, \dots, x_n\}, & e \in \text{Seq}, e = \langle x_1, \dots, x_n \rangle \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Entonces Max es primitivo-recursive.

Demostración. Definimos como ayuda al conjunto $M_e \subseteq \omega$ de elementos máximos de la lista codificada por el número $e \in \omega$ de la siguiente forma:

$$m \in M_e \iff (\exists n < \text{Len}(e))(e[n] = m \wedge (\forall k < \text{Len}(e))(e[k] \leq e[n]))$$

Esto en esencia nos dice que un elemento está en M_e si y solo si es elemento de la lista codificada por e y es el elemento más grande de la lista. Puesto que la lista codificada es finita, siempre tiene un único elemento máximo (considerando que no es vacía), es decir que M_e es un singulete, que debido a los teoremas 1.6 y 1.8, es primitivo-recursive. De esta manera podemos recuperar tal elemento iterando sobre todos los números menores o iguales a e , por el teorema 1.20, verificando cuál de ellos es el único elemento de M_e , pues con la definición de M_e siempre aseguramos que tal valor está en la lista.

$$\text{Max}(e) = \chi_{\text{Seq}}(e) \left(\sum_{k=0}^e k \chi_{M_e}(k) \right)$$

Puesto que Seq y M_e son primitivo-recursive, entonces Max es primitivo-recursive. $\square$

Esta función es necesaria para poder demostrar que las funciones siguientes son primitivo-recursive, pues nos serán de ayuda para poder codificar el proceso iterativo del algoritmo de una máquina URM.

Teorema 1.22. Las siguientes funciones son primitivo-recursive:

1. La función *número de instrucciones* $\text{NumInstr} : \omega \rightarrow \omega$ que devuelve el número de instrucciones de una máquina URM codificada.
2. La función *número máximo de registros* $\text{MaxReg} : \omega \rightarrow \omega$ que devuelve el registro más grande utilizado por la máquina URM.

Demostración. Para la función número de instrucciones tenemos lo siguiente:

$$\text{NumInstr}(e) = \chi_{\text{URMCod}}(e)(\text{Len}(e) - 1)$$

Para la función del máximo de registros podemos ir recorriendo todos los elementos de la lista, que son elementos de InstrCod , y dependiendo del tipo de instrucción obtener el

registro máximo entre el actual y los anteriores. Podemos codificarlo de manera recursiva definiendo primero la función $g : \omega^2 \rightarrow \omega$ como sigue para cada $x, e \in \omega$:

$$g(e, x) = \begin{cases} \text{Max}(\langle x, e[1] \rangle), & e[0] \leq 1 \\ \text{Max}(\langle x, e[1], e[2] \rangle), & e[0] > 1 \end{cases}$$

la cual es primitivo-recursiva. Por lo tanto, podemos definir la función $f : \omega^2 \rightarrow \omega$ como sigue de manera recursiva para cada $e, n \in \omega$:

$$\begin{aligned} f(e, 0) &= 0 \\ f(e, n+1) &= g(e[n+1], f(e, n)) \end{aligned}$$

la cual es primitivo-recursiva. Luego se tiene que la función número máximo de registros es primitivo-recursiva ya que satisface que para cada $e \in \omega$:

$$\text{MaxReg}(e) = \chi_{\text{URMCod}}(e)f(e, \text{Len}(e) - 1)$$

□

Capítulo 2

Aritmética de segundo orden

2.1. Sintaxis

El lenguaje de la aritmética de segundo orden será el marco donde podremos desarrollar toda la teoría de las Matemáticas en Reversa. Cuando hablamos de segundo orden, no nos referimos a lo que comúnmente se refiere a la cuantificación sobre funciones o relaciones (o al menos no directamente); sino más bien al hecho de que este lenguaje es un lenguaje de dos *tipos*. Con *tipos* (o *sorts* en inglés) nos referimos a que los elementos que podemos estudiar dentro del lenguaje son de dos clases de elementos diferentes: números y conjuntos. El tener dos clasificaciones diferentes de elementos nos permite hablar más fácil y elegantemente sobre los objetos que vamos a manipular.

Utilizar, por ejemplo, el lenguaje estándar de la Teoría de Números (L_1) no nos da suficiente riqueza o fuerza para poder hablar de manera directa sobre subconjuntos de números naturales, sino solamente de las propiedades de los números tal cual. Si en cambio utilizáramos el lenguaje de la Teoría de Conjuntos (ZF), este sería un sistema mucho más fuerte que generaría un problema, y es que no podríamos distinguir tan fácilmente cuándo hablamos de números y cuándo de conjuntos de números, pues en este lenguaje ambas serían indistinguibles hasta cierto punto.

Por esos motivos es que el lenguaje de la aritmética de segundo orden es la que mejor se ajusta a nuestros objetivos sobre hablar de manera independiente de números y conjuntos de números sin ser tan débil como el lenguaje de la Teoría de Números, ni tan fuerte como el de la Teoría de Conjuntos.

La característica principal de este lenguaje es el hecho que se trata de un lenguaje de *dos tipos*. Esto significa que hacemos una distinción explícita en el lenguaje de los dos tipos de elementos con los cuales trabajaremos: tipo número y tipo conjunto. Un elemento de tipo número es un elemento que se interpreta como un número natural, mientras que

un elemento de tipo conjunto es un elemento que se interpreta como un subconjunto de números naturales.

Es necesario recalcar que los elementos de tipo conjunto, al interpretarse, solamente pueden contener a elementos de tipo número. Esto es importante debido a que esta es una restricción que ya no nos permite expresar conjuntos que contienen a otros conjuntos. Formalmente no podríamos, por ejemplo, expresar lo que es un conjunto cociente de una clase de equivalencia sobre los números naturales, o el conjunto potencia de otro conjunto.

Definición 2.1 (Lenguaje de la aritmética de segundo orden). El lenguaje de la aritmética de segundo orden es el lenguaje de dos tipos $L_2 = (0, 1, +, \cdot, =, <, \in, V_N, V_C, \text{Log})$ donde:

1. los símbolos 0 y 1 son de constante (de tipo número).
2. los símbolos $+$ y $\cdot$ son de función binaria (de tipo número).
3. los símbolos $=$ y $<$ son de relación binaria (de tipo número).
4. el símbolo $\in$ es de relación binaria (relaciona tipo número con tipo conjunto).
5. los conjuntos V_N y V_C son infinitos, no vacíos y disjuntos denominados *conjuntos de variables de tipo número y de tipo conjunto* respectivamente.
6. el conjunto $\text{Log} = \{\neg, \wedge, \forall, \exists, \}, \{\}$ se denomina *conjunto de símbolos lógicos*.

Definimos al conjunto total de variables como $V := V_N \cup V_C$.

Notación 2.1. Denotaremos a las variables de tipo número (elementos de V_N) mediante letras minúsculas ($n, m, p, \dots$), y a las variables de tipo conjunto (elementos de V_C) mediante letras mayúsculas ($X, Y, Z, \dots$). En ambos casos, pueden utilizarse subíndices si es necesario (por ejemplo, n_1, n_2, X_1, X_2).

Dentro de este lenguaje es que podemos definir los *términos*, los cuales son palabras que se interpretarán como *elementos de los números naturales*, o simplemente *números*. La construcción de los términos se basa en el hecho de que podemos generar nuevos números utilizando como base los números que ya conocemos (0 y 1), además de variables de tipo número, con las cuales podremos expresar propiedades generales de los números más adelante.

Definición 2.2 (Términos). Se define el conjunto de *términos* de L_2 como el mínimo conjunto $\text{Term} \subseteq L_2^*$ que satisface los siguientes puntos:

1. Las palabras 0 y 1 pertenecen a Term.
2. $V_N \subseteq \text{Term}$
3. para cada t_1 y t_2 en Term, se satisface que las palabras $(t_1 + t_2)$ y $(t_1 \cdot t_2)$ pertenecen a Term.

Ejemplos de términos de L_2 son los siguientes:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & n & m_2 \\ (1 + 0) & (n \cdot m) & (1 \cdot (n_1 + m_2)) & ((1 + n) \cdot (0 \cdot m_1)) \end{array}$$

Las *fórmulas atómicas* son aquellas palabras las cuales hablan sobre las relaciones directas entre los términos. Estas son las que pueden expresar las propiedades más básicas sobre los elementos de los naturales, como lo es si dos términos o elementos son iguales o uno menor que otro; y debido a que podemos hablar de objetos de tipo conjunto, también sobre si un término pertenece o no a cierto subconjunto de los naturales.

Estas fórmulas son con las que podemos hablar, por ejemplo, de ecuaciones e inecuaciones.

Definición 2.3 (Fórmulas atómicas). Se define el conjunto de fórmulas atómicas de L_2 como el conjunto $\text{Atom} \subseteq L_2^*$ que satisface los siguientes puntos:

1. para cada t_1 y t_2 en Term se cumple que las palabras $(t_1 = t_2)$ y $(t_1 < t_2)$ pertenecen a Atom
2. para cada t en Term y cada X en V_C , la palabra $(t \in X)$ pertenece a Atom.

Ejemplos de fórmulas atómicas de L_2 son las siguientes:

$$\begin{array}{cccc} (1 = 0) & (n = 1) & (0 = m_1) & (n_1 = m_2) \\ (((n + 1) = (n + n))) & ((n \cdot m) + m < (n \cdot (n + 1))) & ((n + n) \in X) & (((n \cdot n) + 1) \in Y) \end{array}$$

Ahora, las *fórmulas* son las afirmaciones o proposiciones que nos permiten la mayor expresividad. Con estas ahora podemos hablar sobre las relaciones entre las fórmulas atómicas, e incluso con otras fórmulas más complejas. Lo importante sobre estas fórmulas es que además de tener conectores lógicos, también disponemos del uso de los cuantificadores. Con los cuantificadores ahora podemos hablar sobre propiedades generales de los números y subconjuntos de números naturales.

Definición 2.4 (Fórmulas). Se define el conjunto de fórmulas de L_2 como el mínimo conjunto $\text{Form} \subseteq L_2^*$ que satisface los siguientes puntos:

1. $\text{Atom} \subseteq \text{Form}$
2. para cada $\varphi \in \text{Form}$ se satisface que $\neg\varphi \in \text{Form}$.
3. para cada φ_1 y φ_2 en Form se satisface que la palabra $(\varphi_1 \wedge \varphi_2)$ pertenece a Form .
4. para cada $x \in V$ y cada $\varphi \in \text{Form}$ se satisface que las palabras $\forall x\varphi$ y $\exists x\varphi$ pertenecen a Form .

Notación 2.2. Para cada φ_1 y φ_2 en Form se realizan las siguientes abreviaciones:

1. se escribe $(\varphi_1 \vee \varphi_2)$ en lugar de $\neg(\neg\varphi_1 \wedge \neg\varphi_2)$.
2. se escribe $(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ en lugar de $(\neg\varphi_1 \vee \varphi_2)$.
3. se escribe $(\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2)$ en lugar de $((\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \wedge (\varphi_2 \rightarrow \varphi_1))$.

Ejemplos de fórmulas de L_2 son las siguientes:

$$\begin{aligned} & ((0 < 1) \wedge (1 = (0 + 1))) \quad \neg((n + 1) < 0) \\ & ((0 < n) \rightarrow \exists m((m + 1) = n)) \quad \forall X \exists n((n \cdot n) \in X) \end{aligned}$$

Definición 2.5 (Conjunto de variables). Sea $\varphi \in \text{Term} \cup \text{Form}$. Se define el *conjunto de variables* de φ de la siguiente forma inductiva:

1. Si $\varphi \in \{0, 1\}$, entonces $\text{Var}[\varphi] = \emptyset$.
2. Si $\varphi \in V_N$, entonces $\text{Var}[\varphi] = \{\varphi\}$.
3. Si φ está dada por $(t_1 \alpha t_2)$ con $\alpha \in \{+, \cdot, <, =\}$ y $t_1, t_2 \in \text{Term}$, entonces $\text{Var}[\varphi] = \text{Var}[t_1] \cup \text{Var}[t_2]$.
4. Si φ está dada por $(t \in X)$ con $X \in V_C$ y $t \in \text{Term}$, entonces $\text{Var}[\varphi] = \text{Var}[t] \cup \{X\}$.
5. Si φ está dada por $\neg\psi$ con $\psi \in \text{Form}$, entonces $\text{Var}[\varphi] = \text{Var}[\psi]$.
6. Si φ está dada por $(\psi_1 \wedge \psi_2)$ con $\psi_1, \psi_2 \in \text{Form}$, entonces $\text{Var}[\varphi] = \text{Var}[\psi_1] \cup \text{Var}[\psi_2]$.

7. Si φ está dada por $Qx\psi$ con $Q \in \{\exists, \forall\}$, $x \in V$ y $\psi \in \text{Form}$, entonces $\text{Var}[\varphi] = \text{Var}[\psi] \cup \{x\}$.

Definición 2.6 (Conjunto de variables libres). Sea $\varphi \in \text{Form}$. Se define el *conjunto de variables libres* de φ de la siguiente forma inductiva:

1. Si $\varphi \in \text{Atom}$, entonces $\text{Free}[\varphi] = \text{Var}[\varphi]$.
2. Si φ está dada por $\neg\psi$ con $\psi \in \text{Form}$, entonces $\text{Free}[\varphi] = \text{Free}[\psi]$.
3. Si φ está dada por $(\psi_1 \wedge \psi_2)$ con $\psi_1, \psi_2 \in \text{Form}$, entonces $\text{Free}[\varphi] = \text{Free}[\psi_1] \cup \text{Free}[\psi_2]$.
4. Si φ está dada por $Qx\psi$ con $Q \in \{\exists, \forall\}$, $x \in V$ y $\psi \in \text{Form}$, entonces $\text{Free}[\varphi] = \text{Free}[\psi] \setminus \{x\}$.

Definición 2.7 (Fórmulas cerradas). Se define el conjunto de *fórmulas cerradas* de L_2 como sigue:

$$\text{Sent} := \{\varphi \in \text{Form} : \text{Free}[\varphi] = \emptyset\}$$

2.2. Semántica

Definición 2.8 (Estructuras). Una *estructura* de L_2 , o L_2 -*estructura*, es una tupla $\mathcal{M} = (M_N, M_C, 0^\mathcal{M}, 1^\mathcal{M}, +^\mathcal{M}, \cdot^\mathcal{M}, =^\mathcal{M}, <^\mathcal{M}, \in^\mathcal{M})$ donde:

1. M_N y M_C son conjuntos no vacíos, denominados *conjuntos de tipo número* y de *tipo conjunto* respectivamente.
2. $0^\mathcal{M}, 1^\mathcal{M} \in M_N$
3. $+^\mathcal{M}, \cdot^\mathcal{M} : M_N^2 \rightarrow M_N$
4. $<^\mathcal{M}, =^\mathcal{M} \subseteq M_N^2$ donde $=^\mathcal{M}$ es la relación identidad.
5. $\in^\mathcal{M} \subseteq M_N \times M_C$

Notación 2.3. Para simplificar la notación, una L_2 -estructura se denota por una letra mayúscula en estilo caligráfico, su conjunto de tipo número se denota por esa letra en estilo plano con subíndice N , similarmente su conjunto de tipo conjunto se denota con subíndice C , y la misma letra sin subíndices es la unión de ambos.

Por ejemplo, si $\mathcal{A}$ es una L_2 -estructura, entonces A_N es su conjunto de tipo número, A_C es su conjunto de tipo conjunto y $A = A_N \cup A_C$.

Definición 2.9 (ω -estructura). Sea $\mathcal{M}$ una L_2 -estructura. $\mathcal{M}$ se denomina ω -estructura si $M_N = \omega$, $M_C \subseteq 2^\omega$, y $+^\mathcal{M}$, $\cdot^\mathcal{M}$ y $<^\mathcal{M}$ se interpretan de la forma estándar en ω , y $\in^\mathcal{M}$ se interpreta de la forma estándar de la teoría de conjuntos.

Identificaremos una ω -estructura por su conjunto de tipo conjunto, por lo que para cada $S \subseteq 2^\omega$, al decir que S es una ω -estructura nos referiremos en realidad a la única ω -estructura $\mathcal{M}$ tal que $M_C = S$.

2] Falta de contenido

Falta agregar conceptos de sintaxis y semántica, como valuaciones, interpretación, implicación lógica, equivalencia lógica y deducción lógica

Definición 2.10 (Valuación de variables). Sea $\mathcal{M}$ una L_2 -estructura. Una *valuación de variables* de L_2 es una función $s : V \rightarrow M$ tal que para cada $n \in V_N$ se tiene que $s[n] \in M_N$ y para cada $X \in V_C$ se tiene que $s[X] \in M_C$.

Definición 2.11 (Interpretación de términos). Sean $\mathcal{M}$ una L_2 -estructura y $s : V \rightarrow M$ una valuación de variables. La *interpretación* de Term en $\mathcal{M}$ dada s es la función $s^* : \text{Term} \rightarrow M$ definida como sigue:

1. Para cada $c \in \{0, 1\}$, $s^*[c] = c^\mathcal{M}$.
2. Para cada $n \in V_N$, $s^*[n] = s[n]$.
3. Para cada $t_1, t_2 \in \text{Term}$ se tiene que $s^*[(t_1 + t_2)] = +^\mathcal{M}(s^*[t_1], s^*[t_2])$ y $s^*[(t_1 \cdot t_2)] = \cdot^\mathcal{M}(s^*[t_1], s^*[t_2])$

Notación 2.4. Sean $A_1, \dots, A_n$ conjuntos no vacíos con $n \in \omega$ y $R \subseteq \prod_{k=1}^n A_k$ una relación. Para cada $(x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n A_k$, escribiremos $R(x_1, \dots, x_n)$ en lugar de $(x_1, \dots, x_n) \in R$.

Notación 2.5. Sean A, B conjuntos no vacíos, $f : A \rightarrow B$, $a \in A$ y $b \in B$. denotamos por $f[a \rightsquigarrow b]$ a la función $g : A \rightarrow B$ dada como sigue:

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq a \\ b, & x = a \end{cases}$$

Definición 2.12 (Interpretación de fórmulas). Sean $\mathcal{M}$ una L_2 -estructura y $s : V \rightarrow M$ una valuación de variables. Para cada $\varphi \in \text{Form}$, decimos que φ es *verdadera* en $\mathcal{M}$ (o que $\mathcal{M}$ *modela* a φ) con la valuación s , denotado por $(\mathcal{M}, s) \models \varphi$, si se satisface una de las siguientes condiciones:

1. Si φ está dada por $(t_1 R t_2)$ con $t_1, t_2 \in \text{Term}$ y $R \in \{<, =\}$, entonces $(\mathcal{M}, s) \models \varphi$ si y solo si $R^{\mathcal{M}}(s^*[t_1], s^*[t_2])$.
2. Si φ está dada por $(t \in X)$ con $t \in \text{Term}$ y $X \in V_C$, entonces $(\mathcal{M}, s) \models \varphi$ si y solo si $s^*[t] \in s[X]$.
3. Si φ está dada por $\neg\psi$ con $\psi \in \text{Form}$, entonces $(\mathcal{M}, s) \models \varphi$ si y solo si no es cierto que $(\mathcal{M}, s) \models \psi$.
4. Si φ está dada por $(\psi_1 \wedge \psi_2)$ con $\psi_1, \psi_2 \in \text{Form}$, entonces $(\mathcal{M}, s) \models \varphi$ si y solo si $(\mathcal{M}, s) \models \psi_1$ y $(\mathcal{M}, s) \models \psi_2$.
5. Si φ está dada por $\exists x\psi$ con $x \in V$ y $\psi \in \text{Form}$, entonces $(\mathcal{M}, s) \models \varphi$ si y solo si para algún elemento $a \in M$ ($a \in M_N$ si $x \in V_N$, y $a \in M_C$ si $x \in V_C$) se satisface que $(\mathcal{M}, s[x \rightsquigarrow a]) \models \psi$.
6. Si φ está dada por $\forall x\psi$ con $x \in V$ y $\psi \in \text{Form}$, entonces $(\mathcal{M}, s) \models \varphi$ si y solo si para cualquier elemento $a \in M_N$ si $x \in V_N$ y $a \in M_C$ si $x \in V_C$, se satisface que $(\mathcal{M}, s[x \rightsquigarrow a]) \models \psi$.

Notación 2.6. Sea $\varphi \in \text{Form}$.

1. Si $\mathcal{M}$ es una L_2 -estructura, se denotará $\mathcal{M} \models \varphi$ si $(\mathcal{M}, s) \models \varphi$ para cualquier valuación de variables s .
2. Se denotará $\models \varphi$ si $(\mathcal{M}, s) \models \varphi$ para cualquier L_2 -estructura $\mathcal{M}$ y cualquier valuación de variables s .

Definición 2.13 (Definibilidad). Sean $\mathcal{M}$ una L_2 -estructura, $X \in M_C$ y $x_1, \dots, x_m \in M$ para algún $m \in \omega$. X se dice *definible* en L_2 con parámetros $x_1, \dots, x_m$ si existe $\varphi(n, \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_m) \in \text{Form}$ con $n \in \text{Free}[\varphi]$ tal que para cada valuación de variables s :

$$X = \{k \in M_N : (\mathcal{M}, s_0[n \rightsquigarrow k]) \models \varphi(n, \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_m)\}$$

donde $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_m \in V$ y $s_0 : V \rightarrow M$ es tal que $s_0 = s[\bar{x}_1 \rightsquigarrow x_1, \dots, \bar{x}_m \rightsquigarrow x_m]$.

Definición 2.14 (Equivalencia lógica). Sean $\varphi, \psi \in \text{Form}$, entonces φ y ψ se denominan *lógicamente equivalentes* si $\models (\varphi \leftrightarrow \psi)$.

En tal caso se denota por $\varphi \equiv \psi$.

Definición 2.15 (Implicación semántica). Sean $\Gamma \subseteq \text{Form}$ y $\varphi \in \text{Form}$. Decimos que φ se *implica semánticamente* de Γ si para cada L_2 -estructura $\mathcal{M}$ y valuación de variables s tales que $(\mathcal{M}, s) \models \psi$ para cada $\psi \in \Gamma$ se sigue que $(\mathcal{M}, s) \models \varphi$.

En tal caso se denotará por $\Gamma \models \varphi$.

2.3. Resultados y definiciones esenciales

Definición 2.16 (Cuantificadores acotados). Una *fórmula acotadamente cuantificada* es toda aquella de la forma $\exists n((n < t) \wedge \varphi)$ o $\forall n((n < t) \rightarrow \varphi)$ donde $\varphi \in \text{Form}$, $n \in V_N$, $t \in \text{Term}$ y $n \notin \text{Var}[t]$.

Notación 2.7. Sean $\varphi \in \text{Form}$, $n \in V_N$ y $t \in \text{Term}$ tales que $n \notin \text{Var}[t]$. Entonces:

1. escribiremos $(\exists n < t) \varphi$ en lugar de $\exists n((n < t) \wedge \varphi)$.
2. escribiremos $(\forall n < t) \varphi$ en lugar de $\forall n((n < t) \rightarrow \varphi)$.

Definición 2.17 (Jerarquía aritmética). Se define al conjunto de fórmulas $\Delta_0^0 \subseteq \text{Form}$ como el mínimo conjunto que satisface lo siguiente:

1. $\text{Atom} \subseteq \Delta_0^0$
2. para cada $\varphi \in \Delta_0^0$ se satisface que $\neg\varphi \in \Delta_0^0$.
3. para cada $\varphi_1, \varphi_2 \in \Delta_0^0$ se satisface que $(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \in \Delta_0^0$.
4. para cada $\varphi \in \Delta_0^0$, $n \in V_N$ y $t \in \text{Term}$ tales que $n \notin \text{Var}[t]$ se satisface que $(\exists n < t) \varphi, (\forall n < t) \varphi \in \Delta_0^0$.

Para cada $k \in \omega^+$ se definen los siguientes conjuntos:

1. $\Sigma_1^0 \subseteq \text{Form}$ es el conjunto de todas las fórmulas $\varphi \in \text{Form}$ tales que $\varphi \equiv \exists n \psi$ para algunos $n \in V_N$ y $\psi \in \Delta_0^0$.

2. $\Pi_1^0 \subseteq \text{Form}$ es el conjunto de todas las fórmulas $\varphi \in \text{Form}$ tales que $\varphi \equiv \forall n \psi$ para algunos $n \in V_N$ y $\psi \in \Delta_0^0$.
3. $\Sigma_{k+1}^0 \subseteq \text{Form}$ es el conjunto de todas las fórmulas $\varphi \in \text{Form}$ tales que $\varphi \equiv \exists n \psi$ para algunos $n \in V_N$ y $\psi \in \Pi_k^0$.
4. $\Pi_{k+1}^0 \subseteq \text{Form}$ es el conjunto de todas las fórmulas $\varphi \in \text{Form}$ tales que $\varphi \equiv \forall n \psi$ para algunos $n \in V_N$ y $\psi \in \Sigma_k^0$.

Teorema 2.1. Se satisface que $\Delta_0^0 \subseteq \Sigma_1^0$ y $\Delta_0^0 \subseteq \Pi_1^0$.

Demostración. Consideremos una fórmula $\varphi \in \Delta_0^0$ y $n \in V_N$ con $n \notin \text{Var}[\varphi]$. Mostremos que $\varphi \in \Sigma_1^0$ y $\varphi \in \Pi_1^0$.

Consideremos a la fórmula ψ dada por $\exists n ((n = n) \wedge \varphi)$. Notemos que $((n = n) \wedge \varphi) \in \Delta_0^0$ ya que $(n = n) \in \text{Atom} \subseteq \Delta_0^0$ y, por hipótesis, $\varphi \in \Delta_0^0$.

Obtenemos lo siguiente:

$$\psi \equiv \exists n ((n = n) \wedge \varphi) \equiv \exists n (\top \wedge \varphi) \equiv \exists n \varphi \equiv \varphi$$

Por lo que $\varphi \equiv \psi$, y entonces $\varphi \in \Sigma_1^0$.

Ahora, para el caso de Π_1^0 , si θ está dada por $\forall n ((n = n) \rightarrow \varphi)$, similarmente se tiene que $((n = n) \rightarrow \varphi) \in \Delta_0^0$. Luego:

$$\theta \equiv \forall n ((n = n) \rightarrow \varphi) \equiv \forall n (\top \rightarrow \varphi) \equiv \forall n \varphi \equiv \varphi$$

Por lo que $\varphi \equiv \theta$, y en conclusión $\varphi \in \Pi_1^0$. □

Lema 2.2. Sean $S \subseteq 2^\omega$ una ω -estructura, $Y \in S$ y $X \in \omega^m$ para algún $m \in \omega$. Si X es definible por una fórmula Δ_0^0 con parámetro Y , entonces $X \leq_T Y$.

Demostración. Sea $\varphi(n_1, \dots, n_m) \in \Delta_0^0$ la fórmula con parámetro Y y $n_1, \dots, n_m \in V_N$ tal que $X = \{(n_1, \dots, n_m) : \varphi(n_1, \dots, n_m)\}$. Probemos por inducción sobre el conjunto Δ_0^0 .

- (Base) Si $\varphi \in \text{Atom}$, entonces tenemos dos casos:
 - Si φ está dada por $(t_1 = t_2)$ o $(t_1 < t_2)$ para algunos $t_1, t_2 \in \text{Term}$, ya que la suma, producto, la relación “menor que” y la relación identidad son computables en ω , se sigue que X es computable. Ya que $X \leq_T \emptyset$ y $\emptyset \leq_T Y$, entonces $X \leq_T Y$.

- Si φ está dada por $(t \in Y)$ para algún $t \in \text{Term}$, ya que la suma y producto son computables en ω , entonces se tiene claramente que $X \leq_T Y$.
- (Paso inductivo) Supongamos que $\psi(n_1, \dots, n_m), \theta(n_1, \dots, n_m) \in \Delta_0^0$ fórmulas con parámetro Y y $n_1, \dots, n_m \in V_N$ definen conjuntos $U, W \in 2^{\omega^m}$ respectivamente tales que $U, W \leq_T Y$. Entonces tenemos tres casos:

- Supongamos que φ está dada por $\neg\psi$. Ya que $U \leq_T Y$, entonces por propiedades de la computabilidad relativa, se tiene que $\omega^m \setminus U \leq_T Y$. Puesto que:

$$X = \{(n_1, \dots, n_m) : \varphi(n_1, \dots, n_m)\} = \{(n_1, \dots, n_m) : \neg\psi(n_1, \dots, n_m)\} = \omega^m \setminus U$$

se sigue que $X \leq_T Y$.

- Supongamos que φ está dada por $(\psi \wedge \theta)$. Ya que $U, W \leq_T Y$, entonces $U \cap W \leq_T Y$. Puesto que:

$$\begin{aligned} X &= \{(n_1, \dots, n_m) : \varphi(n_1, \dots, n_m)\} \\ &= \{(n_1, \dots, n_m) : (\psi(n_1, \dots, n_m) \wedge \theta(n_1, \dots, n_m))\} = U \cap W \end{aligned}$$

se sigue entonces que $X \leq_T Y$.

- Supongamos que φ está dada por $(\exists n < t) \psi$ o $(\forall n < t) \psi$ para algunos $n \in V_N$ y $t \in \text{Term}$ con $n \notin \text{Var}[t]$. Sabemos para cualquier caso que como la suma y producto son computables, las búsquedas acotadas también son computables en Y , por lo que $X \leq_T Y$.

Por lo tanto, podemos afirmar que $X \leq_T Y$. □

Teorema 2.3 (Post). Sean S una ω -estructura y $X, Y \in S$.

1. X es c.e. en Y si y solo si X es definible por una fórmula Σ_1^0 con parámetro Y .
2. X es co-c.e. en Y si y solo si X es definible por una fórmula Π_1^0 con parámetro Y .
3. X es computable en Y si y solo si X es definible por una fórmula Σ_1^0 y por una fórmula Π_1^0 , ambos con parámetro Y .

Demostración. 1. Demostremos la suficiencia. Sea $\varphi(n) \in \Sigma_1^0$ con parámetro Y tal que $X = \{n : \varphi(n)\}$, y mostremos que X es c.e. en Y .

Como $\varphi \in \Sigma_1^0$, existen $m \in V_N$ y $\psi(n, m) \in \Delta_0^0$ tales que $\varphi(n) \equiv \exists m \psi(n, m)$. Sea $Z = \{(n, m) : \psi(n, m)\}$. Como $\psi \in \Delta_0^0$, por el lema 2.2 se tiene que Z es Y -computable. Definamos entonces la función Y -computable $f(k) := \mu m Z(k, m)$, de

lo cual se tiene que para cada $k \in \omega$:

$$\begin{aligned} k \in X &\iff \varphi(k) \iff \exists m \psi(k, m) \iff \exists m Z(k, m) \\ &\iff \mu m Z(k, m) \downarrow \iff f(k) \downarrow \iff k \in \text{dom}(f) \end{aligned}$$

Por lo que X es el dominio de una función Y -computable, de lo cual se tiene que X es c.e. en Y .

Ahora, para la necesidad supongamos que X es c.e. en Y , entonces existe $e \in \omega$ tal que $X = W_e^Y$. Sabemos por otra parte que el T-predicado de Kleene está definido como una fórmula $T \in \Delta_0^0$ con parámetro Y de modo que para cada $k \in \omega$:

$$k \in X \iff k \in W_e^Y \iff \mu p T(e, k, Y, p) \downarrow \iff \exists p T(e, k, Y, p)$$

Luego, si φ está dada por $\exists p T(e, k, Y, p)$, se sigue que $\varphi \in \Sigma_1^0$ y define a X .

2. Para la suficiencia, sea X definible por una fórmula $\varphi \in \Pi_1^0$ con parámetro Y . Como $\varphi \in \Pi_1^0$, entonces existen $\psi \in \Delta_0^0$ con parámetro Y y $n \in V_N$ tales que $\varphi \equiv \forall n \psi$. Notemos que:

$$\omega \setminus X = \{n : \neg \varphi(n)\} = \{n : \neg \forall m \psi(n, m)\} = \{n : \exists m \neg \psi(n, m)\}$$

Puesto que $\psi \in \Delta_0^0$, entonces $\neg \psi \in \Delta_0^0$ y luego $\exists m \neg \psi \in \Sigma_1^0$. Por tanto $\omega \setminus X$ es definible por una fórmula Σ_1^0 con parámetro Y , lo cual implica que $\omega \setminus X$ es c.e. en Y debido al punto anterior. Ya que $\omega \setminus X$ es c.e. en Y , se concluye que X es co-c.e. en Y .

Ahora, supongamos que X es co-c.e. en Y para la necesidad. Como X es co-c.e. en Y , entonces $\omega \setminus X$ es c.e. en Y . Debido al punto anterior sabemos que existe una fórmula $\varphi \in \Sigma_1^0$ con parámetro Y que define a $\omega \setminus X$. Como $\varphi \in \Sigma_1^0$, entonces existen $\psi \in \Delta_0^0$ con parámetro Y y $m \in V_N$ tales que $\varphi \equiv \exists m \psi$. Se tiene entonces que:

$$X = \omega \setminus (\omega \setminus X) = \{n : \neg \varphi\} = \{n : \neg \exists m \psi\} = \{n : \forall m \neg \psi\}$$

Ya que $\psi \in \Delta_0^0$, entonces $\neg \psi \in \Delta_0^0$, de lo cual se tiene que $\forall m \neg \psi \in \Pi_1^0$. Por lo tanto, se obtiene que X es definible por una fórmula Π_1^0 con parámetro Y .

3. Sabemos que X es computable en Y si y solo si X es c.e. y co-c.e. en Y , de lo cual por los dos puntos anteriores, se cumple si y solo si X es definible por una fórmula Σ_1^0 y por una fórmula Π_1^0 .

□

Definición 2.18 (Jerarquía Δ). Para cada $k \in \omega^+$, se define el conjunto $\Delta_k^0 := \Sigma_k^0 \cap \Pi_k^0$.

Lema 2.4. Sean $S \subseteq 2^\omega$ una ω -estructura, $k, m \in \omega^+$, $Y_1, \dots, Y_k \in S$ y $X \in \omega^m$. Si X es definible por una fórmula Δ_0^0 con parámetros $Y_1, \dots, Y_k$, entonces $X \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$.

Demostración. Sea $\varphi(n_1, \dots, n_m) \in \Delta_0^0$ la fórmula con parámetros $Y_1, \dots, Y_m$ y $n_1, \dots, n_m \in V_N$ tal que $X = \{(n_1, \dots, n_m) : \varphi(n_1, \dots, n_m)\}$. Probemos por inducción sobre el conjunto Δ_0^0 .

- (Base) Si $\varphi \in \text{Atom}$, entonces tenemos dos casos:
 - Si φ está dada por $(t_1 = t_2)$ o $(t_1 < t_2)$ para algunos $t_1, t_2 \in \text{Term}$, ya que la suma, producto, la relación “menor que” y la relación identidad son computables en ω , se sigue que X es computable. Ya que $X \leq_T \emptyset$ y $\emptyset \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$, entonces $X \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$.
 - Si φ está dada por $(t \in Y_p)$ para algún $t \in \text{Term}$ y $p \in \{1, \dots, k\}$, ya que la suma y producto son computables en ω , entonces se tiene claramente que $X \leq_T Y_p$. Ahora, puesto que $Y_p \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$, entonces se sigue que $X \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$.
- (Paso inductivo) Supongamos que $\psi(n_1, \dots, n_m), \theta(n_1, \dots, n_m) \in \Delta_0^0$ fórmulas con parámetros $Y_1, \dots, Y_k$ y $n_1, \dots, n_m \in V_N$ definen conjuntos $U, W \subseteq \omega^k$ respectivamente tales que $U, W \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$. Entonces tenemos tres casos:
 - Supongamos que φ está dada por $\neg\psi$. Ya que $U \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$, entonces por propiedades de la computabilidad relativa, se tiene que $\omega \setminus U \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$. Puesto que:

$$X = \{(n_1, \dots, n_m) : \varphi(n_1, \dots, n_m)\} = \{(n_1, \dots, n_m) : \neg\psi(n_1, \dots, n_m)\} = \omega \setminus U$$
 se sigue que $X \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$.
 - Supongamos que φ está dada por $(\psi \wedge \theta)$. Ya que $U, W \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$, entonces $U \cap W \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$. Puesto que:

$$\begin{aligned} X &= \{(n_1, \dots, n_m) : \varphi(n_1, \dots, n_m)\} \\ &= \{(n_1, \dots, n_m) : (\psi(n_1, \dots, n_m) \wedge \theta(n_1, \dots, n_m))\} = U \cap W \end{aligned}$$
 se sigue entonces que $X \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$.
 - Supongamos que φ está dada por $(\exists n < t) \psi$ o $(\forall n < t) \psi$ para algunos $n \in V_N$ y $t \in \text{Term}$ con $n \notin \text{Var}[t]$. Sabemos para cualquier caso que como la suma y producto son computables, las búsquedas acotadas también son computables en $Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$, por lo que $X \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$.

Por lo tanto, podemos afirmar que $X \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$. $\square$

Teorema 2.5. Sean $S \in 2^\omega$ una ω -estructura, $k \in \omega^+$ y $Y_1, \dots, Y_k \in S$. Entonces toda fórmula Δ_0^0 con parámetro $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$ es equivalente a una fórmula igualmente Δ_0^0 con parámetros $Y_1, \dots, Y_n$.

Demostración. Probemos por inducción sobre el número de parámetros.

- (Base) Trivialmente se cumple para el caso $k = 1$.
- (Paso inductivo) Sea $m \in \omega^+$ tal que toda fórmula Δ_0^0 con parámetro $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_m$ es equivalente a una fórmula igualmente Δ_0^0 con parámetros $Y_1, \dots, Y_m$.

Sea $\varphi \in \Delta_0^0$ con parámetro $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_{m+1}$. Notemos que cada aparición de $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_{m+1}$ es de la forma $(t \in Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_{m+1})$ para algún $t \in \text{Term}$. Por la definición de la yunta se tiene que esta fórmula es equivalente a:

$$(\exists n < t + 1) (((n \in Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_m) \wedge (t = (n + n))) \vee ((n \in Y_{m+1}) \wedge (t = ((n + n) + 1))))$$

la cual es Δ_0^0 . Puesto que la fórmula $((n \in Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_m) \wedge (t = (n + n)))$ es Δ_0^0 , entonces por hipótesis existe una fórmula $\theta(Y_1, \dots, Y_m) \in \Delta_0^0$ equivalente. Se tiene entonces que:

$$(t \in Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_{m+1}) \equiv (\exists n < t + 1) (\theta(Y_1, \dots, Y_m) \vee ((n \in Y_{m+1}) \wedge (t = ((n + n) + 1))))$$

la cual sigue siendo Δ_0^0 . Por lo tanto, al reemplazar cada aparición de la subfórmula $(t \in Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_{m+1})$ por tal fórmula equivalente en φ , se obtiene que φ es equivalente a una fórmula Δ_0^0 con parámetros $Y_1, \dots, Y_{m+1}$. $\square$

Teorema 2.6 (Post generalizado). Sean S una ω -estructura, $k \in \omega^+$ y $X, Y_1, \dots, Y_k \in S$.

1. X es c.e. en $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$ si y solo si X es definible por una fórmula Σ_1^0 con parámetros $Y_1, \dots, Y_k$.
2. X es co-c.e. en $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$ si y solo si X es definible por una fórmula Π_1^0 con parámetros $Y_1, \dots, Y_k$.
3. X es computable en $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$ si y solo si X es definible por una fórmula Δ_1^0

con parámetros $Y_1, \dots, Y_k$.

Demostración. Es únicamente necesario probar el primer punto, pues las demostraciones de los dos restantes son análogas a las de sus correspondientes del teorema 2.3.

Para la necesidad, por el teorema de Post (2.3), se tiene que si X es c.e. en $Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$, entonces X es definible por una fórmula Σ_1^0 con parámetro $Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$, es decir, existen una fórmula $\varphi(Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k) \in \Delta_0^0$ y $n \in V_N$ tales que X es definida por $\exists n \varphi(Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k)$. Por el teorema 2.5 sabemos que existe $\theta(Y_1, \dots, Y_k) \in \Delta_0^0$ tal que $\varphi \equiv \theta$, y luego $\exists n \varphi \equiv \exists n \theta$. Por lo tanto, X es definible por una fórmula Σ_1^0 con parámetros $Y_1, \dots, Y_k$.

Ahora, para la suficiencia, sea X definible por una fórmula Σ_1^0 con parámetros $Y_1, \dots, Y_k$, es decir, existen $m \in V_N$ y $\varphi(n, m) \in \Delta_0^0$ con parámetros $Y_1, \dots, Y_k$ tales que $X = \{n : \exists m \varphi(n, m)\}$. Por el lema 2.4 sabemos que el conjunto $Z \subseteq \omega^2$ dado por $Z = \{(n, m) : \varphi(n, m)\}$ es $Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$ -computable. Sea $f(n) = \mu m Z(n, m)$ una función $Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$ -computable, entonces se sigue que para cada $p \in \omega$:

$$\begin{aligned} p \in X &\iff \exists m \varphi(p, m) \iff \exists m Z(p, m) \\ &\iff \mu m Z(p, m) \downarrow \iff f(p) \downarrow \iff p \in \text{dom}(f) \end{aligned}$$

De lo cual se implica que $X = \text{dom}(f)$. Puesto que X es dominio de una función $Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$ -computable, entonces se concluye que X es c.e. en $Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$. $\square$

Definición 2.19 (Axiomas base de la aritmética de segundo orden). Definimos a los *axiomas básicos* de L_2 , denotados por PA^- , como las cerraduras universales de las siguientes fórmulas:

1. $\neg(n + 1 = 0)$
2. $((n + 1) = (m + 1)) \rightarrow (n = m)$
3. $((n + (m + 1)) = ((n + m) + 1))$
4. $((n \cdot 0) = 0)$
5. $((n \cdot (m + 1)) = ((n \cdot m) + n))$
6. $\neg(n < 0)$
7. $((n < (m + 1)) \rightarrow ((n < m) \vee (n = m)))$
8. $((n + 0) = n)$

Definición 2.20 (Esquema de inducción). Sea $\Gamma \subseteq \text{Form}$ no vacío. Se define el *esquema de Γ -inducción*, denotado por $\Gamma\text{-IND}$, como el esquema de cerraduras universales:

$$((\varphi(0) \wedge \forall n (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n+1))) \rightarrow \forall n \varphi(n))$$

donde $\varphi \in \Gamma$.

Definición 2.21 (Esquema de Δ_1^0 -comprensión). Se define el *esquema de Δ_1^0 -comprensión*, denotado por $\Delta_1^0\text{-COM}$, como el esquema de cerraduras universales:

$$(\forall n (\varphi(n) \leftrightarrow \psi(n)) \rightarrow \exists X \forall n ((n \in X) \leftrightarrow \varphi(n)))$$

donde $\varphi(n) \in \Sigma_1^0$, $\psi(n) \in \Pi_1^0$ y $\text{Free}[\varphi] = \text{Free}[\psi] = \{n\}$.

Definición 2.22 (ω -modelo). Sean $\Gamma \subseteq \text{Sent}$ no vacío y $S \subseteq 2^\omega$ una ω -estructura. S se denomina *ω -modelo* de Γ si $S \models \varphi$ para cada $\varphi \in \Gamma$.

Capítulo 3

El subsistema RCA_0

Definición 3.1 (RCA_0). Se define al subsistema de L_2 de *axiomas de comprensión recursiva*, o RCA_0 , como el conjunto de axiomas:

$$\text{RCA}_0 := \text{PA}^- \cup \Sigma_1^0\text{-IND} \cup \Delta_1^0\text{-COM}$$

Teorema 3.1. Sea $S \subseteq 2^\omega$ una ω -estructura. S es un ω -modelo de RCA_0 si y solo si es un ideal de Turing.

Demostración. Para la necesidad debemos demostrar lo siguiente:

1. $S \neq \emptyset$

Consideremos la fórmula φ dada por $\neg(n = n)$. Notemos que $\varphi \in \Delta_0^0$ y luego φ es Σ_1^0 y Π_1^0 . Por lo tanto, por $\Delta_1^0\text{-COM}$ sabemos que existe el conjunto $X \in S$ definido por φ . Se tiene entonces lo siguiente:

$$X = \{n : \varphi(n)\} = \{n : \neg(n = n)\} = \emptyset$$

Por lo tanto, $\emptyset \in S$, y luego $S \neq \emptyset$.

2. Para cada $X, Y \in S$ se satisface que $X \oplus Y \in S$.

Consideremos a la fórmula φ dada por:

$$(\exists m < n + 1) (((m \in X) \wedge (n = (m + m))) \vee ((m \in Y) \wedge (n = ((m + m) + 1))))$$

Notemos que $\varphi \in \Delta_0^0$, y entonces por $\Delta_1^0\text{-COM}$ existe $Z \in S$ definido por φ . Se obtiene entonces lo siguiente:

$$\begin{aligned}
Z &= \{n : \varphi(n)\} \\
&= \{n : (\exists m < n+1) (((m \in X) \wedge (n = (m+m))) \\
&\quad \vee ((m \in Y) \wedge (n = ((m+m)+1))))\} \\
&= \{n : ((\exists m < n+1) ((m \in X) \wedge (n = (m+m))) \\
&\quad \vee (\exists m < n+1) ((m \in Y) \wedge (n = ((m+m)+1))))\} \\
&= \{n : (\exists m < n+1) ((m \in X) \wedge (n = (m+m)))\} \\
&\quad \cup \{n : (\exists m < n+1) ((m \in Y) \wedge (n = ((m+m)+1)))\} \\
&= \{2m : m \in X\} \cup \{2m+1 : m \in Y\} \\
&= X \oplus Y
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $X \oplus Y \in S$.

3. para cada $X, Y \in 2^\omega$, si $X \leq_T Y$ y $Y \in S$, entonces $X \in S$.

Ya que $X \leq_T Y$, entonces por el teorema de Post (2.3) sabemos que existe una fórmula φ con parámetro Y la cual es Σ_1^0 y Π_1^0 y que define a X . Puesto que $Y \in S$, entonces por Δ_1^0 -COM se tiene que existe $Z \in S$ definida por φ . Por lo tanto, $X = Z \in S$.

Probemos ahora la suficiencia. Observemos que puesto que S es una ω -estructura, entonces se satisfacen directamente PA^- y Σ_1^0 -IND. Luego, es únicamente necesario demostrar que se satisface el esquema Δ_1^0 -COM.

Sea $\varphi(n) \in \Delta_1^0$ con $\text{Free}[\varphi] = \{n\}$, entonces demostremos que existe $X \in S$ definido por φ . Debido a que $S \neq \emptyset$, podemos suponer que $\varphi(n, Y_1, \dots, Y_k)$ para algunos parámetros $Y_1, \dots, Y_k \in S$ y $k \in \omega^+$. Consideremos al conjunto $X \in 2^\omega$ definido por φ , entonces por el teorema de Post generalizado (2.6) sabemos que $X \leq_T Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k$. Ya que $Y_1, \dots, Y_k \in S$, entonces $Y_1 \oplus \dots \oplus Y_k \in S$, y por lo tanto, $X \in S$. $\square$

3.1. Teoría de números elemental

De ahora en adelante, todos los siguientes teoremas serán demostrados dentro del subsistema RCA_0 , a menos que se diga lo contrario.

Teorema 3.2 (Propiedades básicas de la aritmética). Se satisfacen las siguientes cerraduras universales.

1. $((n + m) + p) = (n + (m + p))$
2. $((0 + n) = n)$
3. $((1 + n) = n)$
4. $((n + m) = (m + n))$
5. $((n \cdot (m + p)) = ((n \cdot m) + (n \cdot p)))$
6. $((n \cdot m) \cdot p) = (n \cdot (m \cdot p))$
7. $((n + m) \cdot p) = ((n \cdot p) + (m \cdot p))$
8. $((0 \cdot n) = 0)$
9. $((1 \cdot n) = n)$
10. $((n \cdot m) = (m \cdot n))$
11. $((n < m) \wedge (m < p)) \rightarrow (n < p)$
12. $((n < m) \leftrightarrow ((n + 1) < (m + 1)))$
13. $(\neg(n = 0) \rightarrow (0 < n))$
14. $((n < m) \vee (n = m) \vee (m < n))$
15. $\neg(n < n)$
16. $((n < m) \leftrightarrow ((n + p) < (m + p)))$
17. $(n < ((n + m) + 1))$
18. $((n + p) = (m + p)) \rightarrow (n = m)$
19. $((\neg(p = 0) \wedge (n < m)) \rightarrow ((n \cdot p) < (m \cdot p)))$
20. $((\neg(p = 0) \wedge ((n \cdot p) < (m \cdot p))) \rightarrow (n < m))$
21. $((\neg(p = 0) \wedge ((n \cdot p) = (m \cdot p))) \rightarrow (n = m))$
22. $((n < m) \rightarrow (\exists p < m)((n + p) + 1 = n))$
23. $(\neg(n = 0) \rightarrow (\exists m < n)((m + 1) = n))$

Demostrar las propiedades del teorema anterior.

Notación 3.1. Realizaremos la siguiente notación:

1. Escribiremos $(t_1 \leq t_2)$ en lugar de la fórmula $(t_1 < t_2 + 1)$ donde $t_1, t_2 \in \text{Term}$.
2. Escribiremos $(t \notin X)$ en lugar de la fórmula $\neg(t \in X)$ donde $t \in \text{Term}$.
3. Escribiremos $(t_1 \neq t_2)$ en lugar de la fórmula $\neg(t_1 = t_2)$ donde $t_1, t_2 \in \text{Term}$.

Definición 3.2 (Mínimo). Sea X un conjunto. Se dice que X tiene un *elemento mínimo* si se satisface la siguiente fórmula:

$$\exists k \forall m ((k \in X) \wedge ((m \in X) \rightarrow (k \leq m)))$$

Teorema 3.3 (Principio del buen orden). Todo conjunto X no vacío, es decir tal que se satisface $\exists n (n \in X)$, tiene un elemento mínimo.

Demostración. Demostremos por contradicción. Consideremos a X un conjunto no vacío, es decir tal que se satisface $\exists n (n \in X)$, para el cual se cumple lo siguiente:

$$\forall k \exists m ((k \notin X) \vee ((m \in X) \wedge (m < k))) \quad (3.1)$$

Sea $\varphi(p)$ la fórmula dada por $(\forall k \leq p) (k \notin X)$, la cual es Δ_0^0 . Mostremos por Σ_1^0 -IND que se satisface la fórmula $\forall p \varphi(p)$.

- (Base) Si $p = 0$, entonces debemos mostrar que $(0 \notin X)$. Supongamos por el contrario que $(0 \in X)$, entonces por la fórmula (3.1) se sigue que existe m tal que $(m < 0)$ y $(m \in X)$. Puesto que por los axiomas PA^- se tiene que para cada n se satisface que $\neg(n < 0)$, entonces llegamos a una contradicción. Por lo tanto, necesariamente $0 \notin X$.
- (Paso inductivo) Sea n tal que se satisface $\varphi(n)$, entonces demostremos que se satisface $\varphi(n+1)$.

Supongamos que $((n+1) \in X)$, entonces por la fórmula (3.1) se sigue que existe m tal que $(m \in X)$ y $m < (n+1)$, es decir, $(m \leq n)$. Ya que se satisface $\varphi(n)$ por hipótesis, se tiene entonces que $(m \notin X)$, lo cual contradice el hecho que $(m \in X)$ como se dedujo anteriormente. Por lo tanto, necesariamente $((n+1) \notin X)$.

Se sigue entonces por Σ_1^0 -IND que:

$$\forall p \varphi(p) \equiv \forall p (\forall k \leq p) (k \notin X) \equiv \forall p (p \notin X)$$

lo cual contradice el hecho que X era no vacío.

En conclusión, por contradicción, se prueba el teorema. $\square$

Definición 3.3 (Cota superior). Sea X un conjunto. X se dice estar *acotado superiormente* si se satisface la siguiente fórmula:

$$\exists n \forall m ((m \in X) \rightarrow (m \leq n))$$

Definición 3.4 (Máximo). Sea X un conjunto. Se dice que X tiene un *elemento máximo* si se satisface la siguiente fórmula:

$$\exists k \forall m ((k \in X) \wedge ((m \in X) \rightarrow (m \leq k)))$$

Teorema 3.4 (Principio del máximo). Todo conjunto X no vacío y acotado superiormente tiene un elemento máximo.

Demostración. Defínase la fórmula $\varphi(n)$ dada por:

$$((\forall k \leq n) (k \notin X)) \vee (\exists p \leq n) (\forall k \leq n) ((k \in X) \rightarrow (k \leq p)) \quad (3.2)$$

la cual es Δ_0^0 . Observemos que esta fórmula se interpreta como que dado n se satisface que todos los elementos menores a n no pertenecen a X o el conjunto $X \cap \{0, \dots, n\}$ tiene máximo. Probemos entonces por Σ_1^0 -IND que se satisface la fórmula $\forall n \varphi(n)$.

1. (Base) Para $n = 0$ se tienen dos casos: $(0 \in X)$ o $(0 \notin X)$. Si se cumple $(0 \notin X)$, entonces directamente se satisface la primera parte de la fórmula (3.2). Si se satisface $(0 \in X)$, entonces tomando $p = 0$ se satisface la segunda parte de la fórmula (3.2). En cualquier caso obtenemos que se satisface $\varphi(0)$.
2. (Paso inductivo) Sea n tal que $\varphi(n)$. Entonces demostremos que se satisface que $\varphi(n+1)$.

Ya que se satisface $\varphi(n)$, entonces tenemos tres casos:

- Si se satisface $((n+1) \in X)$, entonces se satisface la segunda parte de la fórmula $\varphi(n+1)$ tomando $p = (n+1)$.
- Si se satisface $((n+1) \notin X)$ y para cada k con $(k \leq n)$ se cumple que $(k \notin X)$, entonces claramente se cumple la primera parte de la fórmula $\varphi(n+1)$.
- Si se satisface $((n+1) \notin X)$ y existe un elemento máximo de los elementos de X acotados por n , entonces directamente se satisface la segunda parte de la fórmula $\varphi(n+1)$.

Se sigue entonces que en cualquier caso se satisface $\varphi(n+1)$. Luego, por Σ_1^0 -IND se cumple la fórmula $\forall n \varphi(n)$.

Ya que X es acotado superiormente, se deduce que existe m tal que para cada k , si $k \in X$, entonces $k \leq m$. Por lo tanto, se satisface particularmente $\varphi(m)$.

Ahora, puesto que X es no vacío, entonces no se satisface la primera parte de $\varphi(m)$, de lo cual se sigue que existe p con $(p \leq m)$ tal que es máximo de los elementos de X acotados por m . Como m ya es cota superior de X , entonces tal p es un máximo de X .

□

3.2. Sistemas numéricos

3.2.1. Los números enteros

En esta sección desarrollaremos la construcción de los números enteros, racionales y reales que son necesarios para poder abordar el estudio de los teoremas del Análisis Real que analizaremos en cada uno de los subsistemas.

Fuera de RCA_0 , recordemos que la característica más importante de los números enteros es que existe la resta, y que para cada número entero m existen dos números naturales n, k tales que $m = n - k$. Con esta propiedad podemos codificar cada número entero con tal par de números naturales que se interpretan de la forma anterior. Por ejemplo, si tenemos el par $(1, 2)$, entonces lo interpretamos como el número entero $1 - 2 = -1$. Sin embargo, notemos que existen varios pares que nos darían el mismo número entero en ese sentido. Para el caso del -1 se tiene que los pares $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$ y $(4, 5)$ se interpretarían de la misma forma. En ese caso, decimos que todos estos pares son *equivalentes* para representar al número -1 . En general, para cada par de pares (n, m) y (p, q) , estos son equivalentes si se interpretan como el mismo número entero, es decir, si $n - m = p - q$, o equivalentemente $n + q = p + m$. Con esta condición podemos luego definir una relación de equivalencia que nos codifique la *igualdad* entre números enteros en RCA_0 .

Definición 3.5 (Igualdad en $\mathbb{Z}$). Se define la relación $=_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^2$ como sigue para cada $n, m, p, q \in \mathbb{N}$:

$$\langle n, m \rangle =_{\mathbb{Z}} \langle p, q \rangle \iff n + q = p + m$$

Notemos que esta relación puede definirse por medio de una fórmula Δ_0^0 , por lo que existe debido a Δ_1^0 -COM.

Ya que vimos que existen elementos diferentes que son *iguales* mediante esta relación, entonces es necesario demostrar que esta relación es de equivalencia para que toda la construcción sea coherente.

■ **Teorema 3.5.** La relación $=_{\mathbb{Z}}$ es de equivalencia.

Demostración. Demostremos entonces que $=_{\mathbb{Z}}$ es reflexiva, simétrica y transitiva. Sean $n, m, p, q, r, s \in \mathbb{N}$.

1. Reflexividad

Puesto que $n + m = m + n$, entonces se sigue directamente $\langle n, m \rangle =_{\mathbb{Z}} \langle n, m \rangle$. Por lo tanto, $=_{\mathbb{Z}}$ es reflexiva.

2. Simetría

Supongamos que $\langle n, m \rangle =_{\mathbb{Z}} \langle p, q \rangle$, entonces por definición se satisface que $n + q = p + m$, o equivalentemente, $p + m = n + q$. De lo anterior se sigue que $\langle p, q \rangle =_{\mathbb{Z}} \langle n, m \rangle$. Por lo tanto, $=_{\mathbb{Z}}$ es simétrica.

3. Transitividad

Supongamos que $\langle n, m \rangle =_{\mathbb{Z}} \langle p, q \rangle$ y $\langle p, q \rangle =_{\mathbb{Z}} \langle r, s \rangle$, entonces se satisface que $n + q = p + m$ y $p + s = r + q$. Sumando ambas igualdades obtenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} (n + q) + (p + s) &= (p + m) + (r + q) \\ (n + s) + (p + q) &= (r + m) + (p + q) \\ n + s &= r + m \end{aligned}$$

Lo cual implica que $\langle n, m \rangle =_{\mathbb{Z}} \langle r, s \rangle$. Por lo tanto, $=_{\mathbb{Z}}$ es transitiva

En conclusión, la relación $=_{\mathbb{Z}}$ es de equivalencia □

Notación 3.2. Sean $A \subseteq \mathbb{N}$ y $R \subseteq A^2$ de equivalencia, entonces para cada $x \in A$ denotaremos por $[x]_R$ a la clase de equivalencia de x , es decir:

$$[x]_R = \{y \in A : xRy\}$$

Todo esto nos implica que dado cualquier $x \in \mathbb{N}^2$, su clase de equivalencia $[x]_{=_{\mathbb{Z}}}$ es el conjunto de todos los pares de naturales que se interpretan como el mismo número entero. Más aún, puesto que $=_{\mathbb{Z}}$ es un conjunto que existe en RCA_0 , entonces la clase de equivalencia de cualquier par de naturales existe ya que puede definirse fácilmente por una fórmula Δ_0^0 .

Ya que tenemos el concepto de igualdad en los enteros, podemos definir lo que es la suma y producto en ellos. Fuera de RCA_0 , consideremos dos números enteros $x = n - m$ y $y = p - q$, entonces su suma y producto satisface lo siguiente:

$$\begin{aligned} x + y &= (n - m) + (p - q) = (n + p) - (m + q) \\ xy &= (n - m)(p - q) = np - nq - mp + mq = (np + mq) - (nq + mp) \end{aligned}$$

De esta forma, podríamos definir la suma y producto de enteros como los pares $(n + p, m + q)$ y $(np + mq, nq + mp)$ respectivamente. Con esto definimos sus equivalentes en RCA_0 .

Definición 3.6. Definimos las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^2 &\rightarrow \mathbb{N} & g : \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^2 &\rightarrow \mathbb{N} \\ (\langle n, m \rangle, \langle p, q \rangle) &\mapsto \langle n + p, m + q \rangle & (\langle n, m \rangle, \langle p, q \rangle) &\mapsto \langle np + mq, nq + mp \rangle \end{aligned}$$

Por el momento no les denominamos suma ni producto debido a que necesitaremos redefinirlas cuando establezcamos propiamente el conjunto de números enteros.

En cambio, demostremos que estas dos operaciones se “comportan bien”, es decir, que son independientes del representante, son conmutativas, asociativas y distributivas.

Lema 3.6. Para cada $x, y, z, w \in \mathbb{N}^2$ se satisface que si $x =_{\mathbb{Z}} z$ y $y =_{\mathbb{Z}} w$, entonces $f(x, y) =_{\mathbb{Z}} f(z, w)$ y $g(x, y) =_{\mathbb{Z}} g(z, w)$.

Demostración. Sean $n, m, p, q, r, s, t, u \in \mathbb{N}$ tales que $x = \langle n, m \rangle$, $y = \langle p, q \rangle$, $z = \langle r, s \rangle$ y $w = \langle t, u \rangle$.

1. Mostremos que $f(x, y) =_{\mathbb{Z}} f(z, w)$.

Puesto que $x =_{\mathbb{Z}} z$ y $y =_{\mathbb{Z}} w$, entonces $n + s = r + m$ y $p + u = t + q$. Luego:

$$\begin{aligned} (n + s) + (p + u) &= (r + m) + (t + q) \\ (n + p) + (s + u) &= (r + t) + (m + q) \\ \langle n + p, m + q \rangle &=_{\mathbb{Z}} \langle r + t, s + u \rangle \\ f(x, y) &=_{\mathbb{Z}} f(z, w) \end{aligned}$$

2. Mostremos que $g(x, y) =_{\mathbb{Z}} g(z, w)$.

Puesto que $x =_{\mathbb{Z}} z$ y $y =_{\mathbb{Z}} w$, entonces $n + s = r + m$ y $p + u = t + q$. Luego:

$$\begin{aligned}
p + u &= t + q \\
n(p + u) &= n(t + q) \\
np + nu &= nt + nq \\
np + nu + mq &= nt + nq + mq \\
np + mq + nu &= nq + mq + nt \\
np + mq + nu + su &= nq + mq + nt + su \\
np + mq + (n + s)u &= nq + mq + nt + su \\
np + mq + (r + m)u &= nq + mq + nt + su \\
np + mq + ru + mu &= nq + mq + nt + su \\
np + mq + ru + mu + mt &= nq + mq + mt + nt + su \\
np + mq + ru + mu + mt &= nq + m(t + q) + nt + su \\
np + mq + ru + mu + mt &= nq + m(p + u) + nt + su \\
np + mq + ru + mu + mt &= nq + mp + mu + nt + su \\
np + mq + ru + mt &= nq + mp + nt + su \\
np + mq + ru + mt + st &= nq + mp + nt + st + su \\
np + mq + ru + mt + st &= nq + mp + (n + s)t + su \\
np + mq + ru + mt + st &= nq + mp + (r + m)t + su \\
np + mq + ru + mt + st &= nq + mp + rt + mt + su \\
np + mq + ru + st &= nq + mp + rt + su \\
(np + mq) + (ru + st) &= (nq + mp) + (rt + su) \\
\langle np + mq, nq + mp \rangle &=_{\mathbb{Z}} \langle rt + su, ru + st \rangle \\
g(x, y) &=_{\mathbb{Z}} g(z, w)
\end{aligned}$$

□

Lema 3.7. Para cada $x, y, z \in \mathbb{N}^2$ se satisface lo siguiente:

1. $f(x, y) = f(y, x)$
2. $g(x, y) = g(y, x)$
3. $f(x, f(y, z)) = f(f(x, y), z)$

$$4. g(x, g(y, z)) = g(g(x, y), z)$$

$$5. g(x, f(y, z)) = f(g(x, y), g(x, z))$$

Demostración. Sean $n, m, p, q, r, s \in \mathbb{N}$ tales que $x = \langle n, m \rangle$, $y = \langle p, q \rangle$ y $z = \langle r, s \rangle$.

$$1. f(x, y) = f(y, x)$$

Se tiene lo siguiente:

$$f(x, y) = \langle n + p, m + q \rangle = \langle p + n, q + m \rangle = f(y, x)$$

$$2. g(x, y) = g(y, x)$$

Se satisface lo siguiente:

$$g(x, y) = \langle np + mq, nq + mp \rangle = \langle pn + qm, pm + qn \rangle = g(y, x)$$

$$3. f(x, f(y, z)) = f(f(x, y), z)$$

Se satisface lo siguiente:

$$\begin{aligned} f(x, f(y, z)) &= f(x, \langle p + r, q + s \rangle) \\ &= \langle n + (p + r), m + (q + s) \rangle \\ &= \langle (n + p) + r, (m + q) + s \rangle \\ &= f(\langle n + p, m + q \rangle, z) \\ &= f(f(x, y), z) \end{aligned}$$

$$4. g(x, g(y, z)) = g(g(x, y), z)$$

Se satisface lo siguiente:

$$\begin{aligned} g(x, g(y, z)) &= g(x, \langle pr + qs, ps + qr \rangle) \\ &= \langle n(pr + qs) + m(ps + qr), n(ps + qr) + m(pr + qs) \rangle \\ &= \langle npr + nqs + mps + mqr, nps + nqr + mpr + mqs \rangle \\ &= \langle (np + mq)r + (nq + mp)s, (np + mq)s + (nq + mp)r \rangle \\ &= g(\langle np + mq, nq + mp \rangle, z) \\ &= g(g(x, y), z) \end{aligned}$$

$$5. g(x, f(y, z)) = f(g(x, y), g(x, z))$$

Se satisface lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 g(x, f(y, z)) &= g(x, \langle p + r, q + s \rangle) \\
 &= \langle n(p + r) + m(q + s), n(q + s) + m(p + r) \rangle \\
 &= \langle np + nr + mq + ms, nq + ns + mp + mr \rangle \\
 &= \langle (np + mq) + (nr + ms), (nq + mp) + (ns + mr) \rangle \\
 &= f(\langle np + mq, nq + mp \rangle, \langle nr + ms, ns + mr \rangle) \\
 &= f(g(x, y), g(x, z))
 \end{aligned}$$

□

Lema 3.8. Para cada $n \in \mathbb{N}$ se satisface que $\langle 0, 0 \rangle =_{\mathbb{Z}} \langle n, n \rangle$.

Demostración. Se tiene directamente puesto que $n + 0 = 0 + n$. □

Con esto podemos ahora definir propiamente lo que son los números enteros en RCA_0 . Aunque lo más usual en teoría de conjuntos es usar cada clase de equivalencia como cada número entero y luego el conjunto de números enteros se defina como el conjunto cociente $\mathbb{N}^2 / =_{\mathbb{Z}}$, en RCA_0 no existen los conjuntos de conjuntos de números naturales, por lo que no podemos irnos directamente por esa definición. En cambio, de cada clase de equivalencia podríamos elegir un único elemento como representante y luego los números enteros serían tal conjunto de representantes, el cual sí puede existir ya que es un conjunto de naturales, lo cual sí está permitido. Puesto que ya sabemos que dado un conjunto no vacío podemos determinar su elemento mínimo, entonces de cada clase utilizaremos su elemento mínimo como representante.

Definición 3.7 (Números enteros). Definimos la función $Z : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ tal que para cada $x \in \mathbb{N}^2$, $Z(x) = \min[x]_{=_{\mathbb{Z}}}$. Se define al conjunto de *números enteros* como el conjunto $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{N}$ tal que:

$$\mathbb{Z} := \text{ran}(Z)$$

es decir, un *número entero* es cualquier natural $x \in \mathbb{N}$ tal que existe $n \in \mathbb{N}^2$ para el cual $x = \min[n]_{=_{\mathbb{Z}}}$.

Notemos que $\mathbb{Z}$ existe por Δ_1^0 -COM. Además, Z está bien definida porque para cada $x \in \mathbb{N}^2$ se satisface que $x \in [x]_{=_{\mathbb{Z}}}$ y luego su mínimo existe. Otra observación es que claramente para cada $x, y \in \mathbb{N}^2$ tales que $x =_{\mathbb{Z}} y$ se satisface que $Z(x) = Z(y)$, pues x y y forman parte de la misma clase y luego tienen el mismo mínimo.

Ahora podemos también definir adecuadamente la suma y producto de $\mathbb{Z}$, con lo que podemos demostrar que $\mathbb{Z}$ es un anillo con unidad.

Definición 3.8 (Suma y producto en $\mathbb{Z}$). Se define la *suma* y *producto* en $\mathbb{Z}$ como las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} +_{\mathbb{Z}} : \mathbb{Z}^2 &\rightarrow \mathbb{Z} & \cdot_{\mathbb{Z}} : \mathbb{Z}^2 &\rightarrow \mathbb{Z} \\ (x, y) &\mapsto Z(f(x, y)) & (x, y) &\mapsto Z(g(x, y)) \end{aligned}$$

donde f y g son las funciones de la definición 3.6.

Teorema 3.9. El conjunto de enteros $\mathbb{Z}$ es un anillo conmutativo con unidad con las operaciones $+_{\mathbb{Z}}$ y $\cdot_{\mathbb{Z}}$.

Demostración. Sean $x, y, z \in \mathbb{Z}$, entonces mostremos cada una de las siguientes propiedades con ayuda de los lemas 3.6, 3.7 y 3.8:

1. Conmutatividad para la suma

$$x +_{\mathbb{Z}} y = Z(f(x, y)) = Z(f(y, x)) = y +_{\mathbb{Z}} x$$

2. Asociatividad para la suma

$$\begin{aligned} x +_{\mathbb{Z}} (y +_{\mathbb{Z}} z) &= Z(f(x, Z(f(y, z)))) \\ &= Z(f(x, f(y, z))) \\ &= Z(f(f(x, y), z)) \\ &= Z(f(Z(f(x, y)), z)) \\ &= (x +_{\mathbb{Z}} y) +_{\mathbb{Z}} z \end{aligned}$$

3. Existencia del neutro aditivo

Definamos al entero $0_{\mathbb{Z}} := Z(\langle 0, 0 \rangle)$, entonces si $x = \langle n, m \rangle$ para algunos $n, m \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\begin{aligned} x +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} &= Z(f(x, 0_{\mathbb{Z}})) \\ &= Z(f(\langle n, m \rangle, Z(\langle 0, 0 \rangle))) \\ &= Z(f(\langle n, m \rangle, \langle 0, 0 \rangle)) \\ &= Z(\langle n, m \rangle) \\ &= Z(x) = x \end{aligned}$$

4. Existencia de inversos aditivos

Si $x = \langle n, m \rangle$ para algunos $n, m \in \mathbb{N}$, entonces definamos $-x := Z(\langle m, n \rangle)$. Luego:

$$\begin{aligned}
 x +_{\mathbb{Z}} (-x) &= Z(f(x, -x)) \\
 &= Z(f(\langle n, m \rangle, Z(\langle m, n \rangle))) \\
 &= Z(f(\langle n, m \rangle, \langle m, n \rangle)) \\
 &= Z(\langle n + m, n + m \rangle) \\
 &= Z(\langle 0, 0 \rangle) = 0_{\mathbb{Z}}
 \end{aligned}$$

5. Conmutatividad para el producto

$$x \cdot_{\mathbb{Z}} y = Z(g(x, y)) = Z(g(y, x)) = y \cdot_{\mathbb{Z}} x$$

6. Asociatividad para el producto

$$\begin{aligned}
 x \cdot_{\mathbb{Z}} (y \cdot_{\mathbb{Z}} z) &= Z(g(x, Z(g(y, z)))) \\
 &= Z(g(x, g(y, z))) \\
 &= Z(g(g(x, y), z)) \\
 &= Z(g(Z(g(x, y)), z)) \\
 &= (x \cdot_{\mathbb{Z}} y) \cdot_{\mathbb{Z}} z
 \end{aligned}$$

7. Existencia del neutro multiplicativo

Definamos al entero $1_{\mathbb{Z}} := Z(\langle 1, 0 \rangle)$, entonces si $x = \langle n, m \rangle$ para algunos $n, m \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 x \cdot_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} &= Z(g(x, 1_{\mathbb{Z}})) \\
 &= Z(g(\langle n, m \rangle, Z(\langle 1, 0 \rangle))) \\
 &= Z(g(\langle n, m \rangle, \langle 1, 0 \rangle)) \\
 &= Z(\langle n \cdot 1 + m \cdot 0, n \cdot 0 + m \cdot 1 \rangle) \\
 &= Z(\langle n, m \rangle) \\
 &= Z(x) = x
 \end{aligned}$$

8. Distributividad

$$\begin{aligned}
x \cdot_{\mathbb{Z}} (y +_{\mathbb{Z}} z) &= Z(g(x, Z(f(y, z)))) \\
&= Z(g(x, f(y, z))) \\
&= Z(f(g(x, y), g(x, z))) \\
&= Z(f(Z(g(x, y)), Z(g(x, z)))) \\
&= (x \cdot_{\mathbb{Z}} y) +_{\mathbb{Z}} (x \cdot_{\mathbb{Z}} z)
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathbb{Z}$ es un anillo conmutativo con unidad con las operaciones $+_{\mathbb{Z}}$ y $\cdot_{\mathbb{Z}}$. $\square$

Ahora, para definir a los números racionales es fundamental tener el concepto de orden en $\mathbb{Z}$. Fuera de RCA_0 , si tenemos dos números enteros $x = n - m$ y $y = p - q$ para algunos naturales n, m, p y q , sabemos que $x < y$ si y solo si $n - m < p - q$, o equivalentemente, $n + q < p + m$. De esta forma podemos también extender el concepto de orden a $\mathbb{Z}$ en RCA_0 como tal relación.

Definición 3.9 (Orden en $\mathbb{Z}$). Se define la *relación de orden* en $\mathbb{Z}$ como la relación $<_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}^2$ tal que para cada $x = \langle n, m \rangle, y = \langle p, q \rangle \in \mathbb{Z}$:

$$x <_{\mathbb{Z}} y \iff n + q < p + m$$

Se tiene que $<_{\mathbb{Z}}$ existe por $\Delta_1^0\text{-COM}$, y además es un orden lineal.

Teorema 3.10. La relación de orden $<_{\mathbb{Z}}$ es un orden lineal en $\mathbb{Z}$.

Demostración. Sean $x = \langle n, m \rangle, y = \langle p, q \rangle, z = \langle r, s \rangle \in \mathbb{Z}$, entonces mostremos que $<_{\mathbb{Z}}$ es irreflexiva, transitiva y tricotómica.

1. Irreflexividad

Mostremos que $\neg(x <_{\mathbb{Z}} x)$. Puesto que $n + m = m + n$, entonces se satisface que $\neg(n + m < m + n)$, por lo que $\neg(x <_{\mathbb{Z}} x)$.

2. Transitividad

Supongamos que $x <_{\mathbb{Z}} y$ y $y <_{\mathbb{Z}} z$, entonces $n + q < p + m$ y $p + s < r + q$, por lo que se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}
(n + q) + (p + s) &< (p + m) + (r + q) \\
(n + s) + (p + q) &< (r + m) + (p + q) \\
n + s &< r + m
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $x <_{\mathbb{Z}} z$.

3. Tricotomía

Como $n, m, p, q \in \mathbb{N}$, y el orden en $\mathbb{N}$ es tricotómico, entonces se satisface una y solo una de las siguientes afirmaciones: $n + q = p + m$, $n + q < p + m$ o $n + q > p + m$.

Si $n + q = p + m$, entonces $x =_{\mathbb{Z}} y$, lo cual implicaría que $x = y$ ya que al ser enteros, serían representantes de la misma clase de equivalencia.

Si $n + q < p + m$, entonces $x <_{\mathbb{Z}} y$ por definición, y si $n + q > p + m$, también por definición $y <_{\mathbb{Z}} x$.

Por lo tanto, $<_{\mathbb{Z}}$ es tricotómica.

Por lo tanto, $<_{\mathbb{Z}}$ es un orden lineal en $\mathbb{Z}$. □

Para finalizar la construcción de $\mathbb{Z}$, mostremos que los números naturales se pueden encajar en $\mathbb{Z}$, lo cual podemos entender como que existe un subconjunto de $\mathbb{Z}$ que se comporta de manera idéntica como lo haría $\mathbb{N}$ en cuanto a la suma, producto y orden. Formalmente eso significa que debe existir una función inyectiva de $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$ que conserve la suma, producto y orden de $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$.

Puesto que nosotros ya interpretábamos cada par $\langle n, m \rangle$ de naturales como la resta $n - m$, entonces los números naturales serían los enteros tales que su segunda componente es 0. Por ejemplo, el número 2 en $\mathbb{Z}$ sería el representante de la clase de $\langle 2, 0 \rangle$, pues $2 = 2 - 0$.

Aseguramos que esta traducción de naturales a enteros es aquella función inyectiva que nos permite encajar los naturales en los enteros.

Teorema 3.11 (Encaje de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{Z}$). Defínase la función $N : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que para cada $n \in \mathbb{N}$, $N(n) := Z(\langle n, 0 \rangle)$. Entonces N es inyectiva y satisface las siguientes propiedades:

1. Para cada $n, m \in \mathbb{N}$, $N(n + m) = N(n) +_{\mathbb{Z}} N(m)$.
2. Para cada $n, m \in \mathbb{N}$, $N(nm) = N(n) \cdot_{\mathbb{Z}} N(m)$.
3. Para cada $n, m \in \mathbb{N}$, $n < m$ si y solo si $N(n) <_{\mathbb{Z}} N(m)$.

Demostración. Sean $n, m \in \mathbb{N}$, entonces:

1. Inyectividad de N

Supongamos que $N(n) = N(m)$, entonces se tiene que $Z(\langle n, 0 \rangle) = Z(\langle m, 0 \rangle)$, lo cual significa que $\langle n, 0 \rangle =_{\mathbb{Z}} \langle m, 0 \rangle$, es decir que $n + 0 = 0 + m$, o equivalentemente, $n = m$. Por lo tanto, N es inyectiva.

2. Conservación de la suma

Se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 N(n + m) &= Z(\langle n + m, 0 \rangle) \\
 &= Z(f(\langle n, 0 \rangle, \langle m, 0 \rangle)) \\
 &= Z(f(Z(\langle n, 0 \rangle), Z(\langle m, 0 \rangle))) \\
 &= Z(f(N(n), N(m))) \\
 &= N(n) +_{\mathbb{Z}} N(m)
 \end{aligned}$$

3. Conservación del producto

Se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 N(nm) &= Z(\langle nm, 0 \rangle) \\
 &= Z(\langle nm + 0 \cdot 0, n \cdot 0 + 0 \cdot m \rangle) \\
 &= Z(g(\langle n, 0 \rangle, \langle m, 0 \rangle)) \\
 &= Z(g(Z(\langle n, 0 \rangle), Z(\langle m, 0 \rangle))) \\
 &= Z(g(N(n), N(m))) \\
 &= N(n) \cdot_{\mathbb{Z}} N(m)
 \end{aligned}$$

4. Conservación del orden

Sean $N(n) = \langle p, q \rangle$ y $N(m) = \langle r, s \rangle$ para algunos $p, q, r, s \in \mathbb{N}$, entonces sabemos que $n + q = p$ y $m + s = r$ por definición de N , entonces:

$$\begin{aligned}
 n < m &\iff n + q < m + q \\
 &\iff p < m + q \\
 &\iff p + s < m + q + s \\
 &\iff p + s < r + q \\
 &\iff \langle p, q \rangle <_{\mathbb{Z}} \langle r, s \rangle \\
 &\iff N(n) <_{\mathbb{Z}} N(m)
 \end{aligned}$$

□

Con esto hemos mostrado que al trabajar con los enteros, también podemos hacer referencia a los naturales si es que necesitamos tratar con ellos. Aunque cuando hablamos de los naturales en $\mathbb{Z}$ no necesariamente estamos realizando las mismas operaciones en el

propio $\mathbb{N}$, es decir, no necesariamente $2_{\mathbb{Z}} +_{\mathbb{Z}} 3_{\mathbb{Z}} = 2 + 3$, la inyección N nos permite traducir cada expresión de un conjunto a otro de manera sencilla, indicándonos que podemos ignorar esa diferencia entre $\mathbb{N}$ y $\text{ran}(N)$, y en cambio tratarlos como el mismo conjunto. Por eso mismo, no haremos distinción simbólica entre $+_{\mathbb{Z}}$ y la suma en $\mathbb{N}$ al trabajar en $\mathbb{Z}$ debido a ese encaje.

3.2.2. Los números racionales

Ya que hemos construido los números enteros, ya directamente podemos definir lo que son los números racionales, lo cuales son los más fundamentales para el estudio del Análisis Real que realizaremos.

Fuera de RCA_0 , los números racionales se caracterizan por tener *división*, y en general cualquier número racional q puede expresarse como un cociente entre números enteros $q = n/m$, donde $m > 0$. De manera similar podemos codificar un número racional como un par de números enteros interpretados de la forma anterior. Por ejemplo, el número $2/3$ sería el par $(2, 3)$. Sin embargo, el par no es único, pues $2/3$ también puede representarse con los pares $(4, 6)$, $(6, 9)$, $(8, 12)$, etc. Entonces todos estos pares se deberían considerar *equivalentes* al interpretarse como el mismo racional. En general, para cada par de pares (p, q) y (r, s) que representan a los racionales p/q y r/s , estos son equivalentes si y solo si $p/q = r/s$, o equivalentemente $ps = rq$. De esta manera podemos definir la relación de equivalencia entre pares de enteros en RCA_0 que codifica la igualdad entre racionales.

Definición 3.10 (Igualdad en $\mathbb{Q}$). Se define la relación $=_{\mathbb{Q}} \subseteq (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+) \times (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+)$ como sigue para cada $n, m, p, q \in \mathbb{N}$:

$$\langle n, m \rangle =_{\mathbb{Q}} \langle p, q \rangle \iff nq = pm$$

Aquí $\mathbb{Z}^+$ se entiende como el conjunto de enteros positivos, es decir el conjunto $\mathbb{Z}^+ = \{n : (n \in \mathbb{Z}) \wedge (n >_{\mathbb{Z}} 0)\}$. Se tiene también que esta relación existe por Δ_1^0 -COM.

De manera análoga al teorema 3.5 se demuestra que $=_{\mathbb{Q}}$ es de equivalencia, por lo que para cada $q \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+$ existe su clase de equivalencia $[q]_{=_{\mathbb{Q}}}$ por Δ_1^0 -COM. Entonces, de manera similar definiremos a los números racionales como el conjunto de elementos mínimos de cada clase de equivalencia.

Definición 3.11 (Números racionales). Defínase la función $Q : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{N}$ tal que para cada $q \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+$, $Q(q) = \min[q]_{=_{\mathbb{Q}}}$. Entonces definimos al *conjunto de números racionales* como el subconjunto $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{N}$ tal que:

$$\mathbb{Q} := \text{ran}(Q)$$

es decir, un *número racional* es cualquier natural $q \in \mathbb{N}$ tal que existe $n \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+$ para el cual $q = \min[n]_{=\mathbb{Q}}$.

De manera análoga podemos definir las operaciones en $\mathbb{Q}$ por medio de dos funciones auxiliares que codifican la suma y producto de racionales usando los pares de enteros. Fuera de RCA_0 , si tenemos dos racionales $x = n/m$ y $y = p/q$, entonces obtenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} x + y &= \frac{n}{m} + \frac{p}{q} = \frac{nq + mp}{mq} \\ xy &= \left(\frac{n}{m}\right)\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{np}{mq} \end{aligned}$$

Por lo que la suma y producto estarían codificados como los pares $(nq + mp, mq)$ y (np, mq) respectivamente, lo cual podemos llevar a RCA_0 de la siguiente forma.

Definición 3.12. Definimos las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} f : (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+) \times (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+) &\rightarrow \mathbb{N} & g : (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+) \times (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+) &\rightarrow \mathbb{N} \\ (\langle n, m \rangle, \langle p, q \rangle) &\mapsto \langle nq + mp, mq \rangle & (\langle n, m \rangle, \langle p, q \rangle) &\mapsto \langle np, mq \rangle \end{aligned}$$

Al igual que en caso de los enteros, es necesario asegurar que estas operaciones son independientes del representante bajo la igualdad en $\mathbb{Q}$.

Lema 3.12. Para cada $x, y, z, w \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+$ se satisface que si $x =_{\mathbb{Q}} z$ y $y =_{\mathbb{Q}} w$, entonces $f(x, y) =_{\mathbb{Q}} f(z, w)$ y $g(x, y) =_{\mathbb{Q}} g(z, w)$.

Demostración. Sean $n, p, r, t \in \mathbb{Z}$ y $m, q, s, u \in \mathbb{Z}^+$ tales que $x = \langle n, m \rangle$, $y = \langle p, q \rangle$, $z = \langle r, s \rangle$ y $w = \langle t, u \rangle$ donde además $x =_{\mathbb{Q}} z$ y $y =_{\mathbb{Q}} w$. Se tiene entonces que $ns = rm$ y $pu = tq$.

1. Para f se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} (nq + mp)(su) &= nqsu + mpsu \\ &= rmqu + tqms \\ &= (ru + st)(mq) \end{aligned}$$

Por lo que $f(x, y) =_{\mathbb{Q}} f(z, w)$.

2. Para g se tiene lo siguiente:

$$(np)(su) = (ns)(pu) = (rm)(tq)$$

Por lo que $g(x, y) =_{\mathbb{Q}} g(z, w)$.

□

Una observación a realizar es que en los racionales se cumple la cancelación en la división, es decir, si nosotros tenemos el racional np/nq donde $n \neq 0$, entonces $np/nq = p/q$. Traducido a la construcción que estamos realizando se obtiene el siguiente teorema.

Lema 3.13. Para cada $p \in \mathbb{Z}$ y cada $n, q \in \mathbb{Z}^+$ se satisface que $\langle np, nq \rangle =_{\mathbb{Q}} \langle p, q \rangle$.

Demostración. Se sigue directamente puesto que $(np)q = p(nq)$. □

Con esto podemos demostrar que estas funciones se comportan bien, lo cual significa que son conmutativas, asociativas y distributivas.

Lema 3.14. Para cada $x, y, z \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+$ se satisface lo siguiente:

1. $f(x, y) = f(y, x)$
2. $g(x, y) = g(y, x)$
3. $f(x, f(y, z)) = f(f(x, y), z)$
4. $g(x, g(y, z)) = g(g(x, y), z)$
5. $g(x, f(y, z)) =_{\mathbb{Q}} f(g(x, y), g(x, z))$

Demostración. Las demostraciones de los primeros cuatro puntos son análogas a lo que se realiza en las demostraciones del teorema 3.7. La única necesaria a demostrar es la del último punto que es la distributividad.

Sean $n, p, r \in \mathbb{Z}$ y $m, q, s \in \mathbb{Z}^+$ tales que $x = \langle n, m \rangle$, $y = \langle p, q \rangle$, $z = \langle r, s \rangle$, entonces obtenemos lo siguiente usando el lema 3.13:

$$\begin{aligned}
 g(x, f(y, z)) &= g(x, \langle ps + qr, qs \rangle) \\
 &= \langle n(ps + qr), m(qs) \rangle \\
 &= \langle nps + nqr, mqs \rangle \\
 &=_{\mathbb{Q}} \langle m(nps + nqr), m^2qs \rangle \\
 &= \langle (np)(ms) + (mq)(nr), (mq)(ms) \rangle \\
 &= f(\langle np, mq \rangle, \langle nr, ms \rangle) \\
 &= f(g(x, y), g(x, z))
 \end{aligned}$$

□

Lema 3.15. Para cada $n \in \mathbb{Z}^+$ se satisface que $\langle 0, 1 \rangle =_{\mathbb{Q}} \langle 0, n \rangle$ y $\langle 1, 1 \rangle =_{\mathbb{Q}} \langle n, n \rangle$.

Demostración. Se sigue directamente de las igualdades $0 \cdot n = 0$ y $n = n$. $\square$

Podemos entonces ahora definir las operaciones de suma y producto en $\mathbb{Q}$ de manera coherente.

Definición 3.13 (Suma y producto en $\mathbb{Q}$). Se define la *suma* y *producto* en $\mathbb{Q}$ como las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} +_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q}\mathbb{Q}^2 &\rightarrow \mathbb{Q} & \cdot_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q}\mathbb{Q}^2 &\rightarrow \mathbb{Q} \\ (x, y) &\mapsto Q(f(x, y)) & (x, y) &\mapsto Q(g(x, y)) \end{aligned}$$

donde f y g son las funciones de la definición 3.12.

Se puede entonces probar una propiedad fundamental la cual es que $\mathbb{Q}$ es un campo.

Teorema 3.16. El conjunto de números racionales $\mathbb{Q}$ es un campo con las operaciones $+_{\mathbb{Q}}$ y $\cdot_{\mathbb{Q}}$.

Demostración. Solo es necesario demostrar la existencia de neutros e inversos (aditivos y multiplicativos) en $\mathbb{Q}$, pues las otras propiedades de campo son análogas a las de la demostración del teorema 3.9.

1. Neutro aditivo

Sea $x = \langle p, q \rangle \in \mathbb{Q}$ para algunos $p \in \mathbb{Z}$ y $q \in \mathbb{Z}^+$. Entonces si definimos $0_{\mathbb{Q}} := Q(\langle 0, 1 \rangle)$, se obtiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} x +_{\mathbb{Q}} 0_{\mathbb{Q}} &= Q(f(x, 0_{\mathbb{Q}})) \\ &= Q(f(\langle p, q \rangle, Q(\langle 0, 1 \rangle))) \\ &= Q(f(p, q), \langle 0, 1 \rangle) \\ &= Q(p \cdot 1 + q \cdot 0, q \cdot 1) \\ &= Q(\langle p, q \rangle) \\ &= Q(x) = x \end{aligned}$$

2. Neutro multiplicativo

Sea $x = \langle p, q \rangle \in \mathbb{Q}$ para algunos $p \in \mathbb{Z}$ y $q \in \mathbb{Z}^+$. Entonces si definimos $1_{\mathbb{Q}} :=$

$Q(\langle 1, 1 \rangle)$, se obtiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 x \cdot_{\mathbb{Q}} 1_{\mathbb{Q}} &= Q(g(x, 1_{\mathbb{Q}})) \\
 &= Q(g(\langle p, q \rangle, Q(\langle 1, 1 \rangle))) \\
 &= Q(g(p, q), \langle 1, 1 \rangle) \\
 &= Q(\langle p, q \rangle) \\
 &= Q(x) = x
 \end{aligned}$$

3. Inverso aditivo

Sea $x = \langle p, q \rangle \in \mathbb{Q}$ para algunos $p \in \mathbb{Z}$ y $q \in \mathbb{Z}^+$. Entonces si definimos $-x := Q(\langle -p, q \rangle)$, se obtiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 x +_{\mathbb{Q}} (-x) &= Q(f(x, -x)) \\
 &= Q(f(\langle p, q \rangle, Q(\langle -p, q \rangle))) \\
 &= Q(f(p, q), \langle -p, q \rangle) \\
 &= Q(pq + q(-p), q^2) \\
 &= Q(\langle 0, q^2 \rangle) \\
 &= Q(\langle 0, 1 \rangle) = 0_{\mathbb{Q}}
 \end{aligned}$$

4. Inverso multiplicativo

Sea $x = \langle p, q \rangle \in \mathbb{Q}$ para algunos $p \in \mathbb{Z}$ y $q \in \mathbb{Z}^+$. Si $x \neq 0_{\mathbb{Q}}$, entonces $p \neq 0$, luego tenemos dos casos: $p > 0$ o $p < 0$.

Si $p > 0$, entonces definimos $x^{-1} := Q(\langle q, p \rangle)$. Luego:

$$\begin{aligned}
 x \cdot_{\mathbb{Q}} x^{-1} &= Q(g(x, x^{-1})) \\
 &= Q(g(\langle p, q \rangle, Q(\langle q, p \rangle))) \\
 &= Q(g(p, q), \langle q, p \rangle) \\
 &= Q(\langle pq, pq \rangle) \\
 &= Q(\langle 1, 1 \rangle) = 1_{\mathbb{Q}}
 \end{aligned}$$

En cambio, si $p < 0$, entonces definimos $x^{-1} := Q(\langle -q, -p \rangle)$. Luego:

$$\begin{aligned}
 x \cdot_{\mathbb{Q}} x^{-1} &= Q(g(x, x^{-1})) \\
 &= Q(g(\langle p, q \rangle, Q(\langle -q, -p \rangle))) \\
 &= Q(g(p, q), \langle -q, -p \rangle) \\
 &= Q(\langle -pq, -pq \rangle) \\
 &= Q(\langle 1, 1 \rangle) = 1_{\mathbb{Q}}
 \end{aligned}$$

En cualquier caso existe $x^{-1} \in \mathbb{Q}$ tal que $x \cdot_{\mathbb{Q}} x^{-1} = 1_{\mathbb{Q}}$

Por lo tanto, el conjunto $\mathbb{Q}$ es un campo con las operaciones $+_{\mathbb{Q}}$ y $\cdot_{\mathbb{Q}}$. $\square$

Para terminar con la construcción de los racionales definamos el orden en ellos. Sean $x = n/m$ y $y = p/q$. Puesto que m y p se toman como enteros positivos, entonces se tiene que $x < y$ si y solo si $n/m < p/q$, o equivalentemente $nq < pm$. Entonces de esta manera podemos ahora caracterizar el orden de $\mathbb{Q}$ en RCA_0 .

Definición 3.14 (Orden en $\mathbb{Q}$). Se define la *relación de orden* en $\mathbb{Q}$ como la relación binaria $<_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}^2$ tal que para cada $x = \langle n, m \rangle, y = \langle p, q \rangle \in \mathbb{Q}$ para algunos $n, m, p, q \in \mathbb{Z}$:

$$x <_{\mathbb{Q}} y \iff nq < pm$$

Teorema 3.17. La relación $<_{\mathbb{Q}}$ es un orden lineal.

Demostración. Sean $x = \langle n, m \rangle, y = \langle p, q \rangle, z = \langle r, s \rangle \in \mathbb{Q}$ para algunos $n, p, r \in \mathbb{Z}$ y $m, q, s \in \mathbb{Z}^+$. Mostremos entonces que $<_{\mathbb{Q}}$ es irreflexiva, transitiva y tricotómica.

1. Irreflexividad

Puesto que el orden en $\mathbb{Z}$ es irreflexiva, sabemos entonces que $\neg(nm < nm)$, es decir, $\neg(x <_{\mathbb{Q}} x)$.

2. Transitividad

Supongamos que $x <_{\mathbb{Q}} y$ y $y <_{\mathbb{Q}} z$, entonces $nq < pm$ y $ps < rq$. Puesto que $s > 0$, entonces $nqs < pms$. Como $m > 0$, entonces $psm < rqm$. Por transitividad del orden en $\mathbb{Z}$ tenemos que $nqs < rqm$, y como $q > 0$, entonces $ns < rm$. Por lo tanto, $x <_{\mathbb{Q}} z$.

3. Tricotomía

Por la tricotomía en $\mathbb{Z}$ sabemos que se satisface una y solo una de las siguientes afirmaciones: $nq = pm$, $nq < pm$ o $nq > pm$.

Si $nq = pm$, entonces $x =_{\mathbb{Q}} y$, y puesto que $x, y \in \mathbb{Q}$, entonces $x = y$.

Si $nq < pm$, entonces $x <_{\mathbb{Q}} y$; y si $nq > pm$, entonces $y <_{\mathbb{Q}} x$.

Por lo tanto, $<_{\mathbb{Q}}$ es un orden lineal. $\square$

Finalmente podemos demostrar igualmente que podemos encajar $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Q}$ mediante el encaje $n \mapsto Q(\langle n, 1 \rangle)$, pues se interpreta que $n = n/1$.

Teorema 3.18 (Encaje de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Q}$). Defínase la función $Z : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ tal que para cada $n \in \mathbb{Z}$, $Z(n) := Q(\langle n, 1 \rangle)$. Entonces Z es inyectiva y satisface las siguientes propiedades:

1. Para cada $n, m \in \mathbb{Z}$, $Z(n + m) = Z(n) +_{\mathbb{Q}} Z(m)$.
2. Para cada $n, m \in \mathbb{Z}$, $Z(nm) = Z(n) \cdot_{\mathbb{Q}} Z(m)$.
3. Para cada $n, m \in \mathbb{Z}$, $n < m$ si y solo si $Z(n) <_{\mathbb{Q}} Z(m)$.

Demostración. Sean $p, q \in \mathbb{Z}$, entonces:

1. Inyectividad de Z

Supongamos que $Z(p) = Z(q)$, entonces se tiene que $Q(\langle p, 1 \rangle) = Q(\langle q, 1 \rangle)$, lo cual significa que $\langle p, 1 \rangle =_{\mathbb{Q}} \langle q, 1 \rangle$, es decir que $p \cdot 1 = q \cdot 1$, o equivalentemente, $p = q$. Por lo tanto, Z es inyectiva.

2. Conservación de la suma

Se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 Z(p + q) &= Q(\langle p + q, 1 \rangle) \\
 &= Q(f(\langle p, 1 \rangle, \langle q, 1 \rangle)) \\
 &= Q(f(Q(\langle p, 1 \rangle), Q(\langle q, 1 \rangle))) \\
 &= Q(f(Z(p), Z(q))) \\
 &= Z(p) +_{\mathbb{Q}} Z(q)
 \end{aligned}$$

3. Conservación del producto

Se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 Z(pq) &= Q(\langle pq, 1 \rangle) \\
 &= Q(g(\langle p, 1 \rangle, \langle q, 1 \rangle)) \\
 &= Q(g(Q(\langle p, 1 \rangle), Q(\langle q, 1 \rangle))) \\
 &= Q(g(Z(p), Z(q))) \\
 &= Z(p) \cdot_{\mathbb{Q}} Z(q)
 \end{aligned}$$

4. Conservación del orden

Sean $Z(p) = \langle n, m \rangle$ y $Z(q) = \langle r, s \rangle$ para algunos $n, r \in \mathbb{Z}$ y $m, s \in \mathbb{Z}^+$, entonces sabemos que $pm = n$ y $qs = r$ por definición de Z , entonces:

$$\begin{aligned}
 p < q &\iff pm < qm \\
 &\iff n < mq \\
 &\iff ns < mqs \\
 &\iff ns < mr \\
 &\iff \langle n, m \rangle <_{\mathbb{Q}} \langle r, s \rangle \\
 &\iff Z(p) <_{\mathbb{Q}} Z(q)
 \end{aligned}$$

□

3.2.3. Los números reales

Con los racionales podemos entonces definir lo que significa ser un número real. Sin embargo, este tipo de números tiene una peculiaridad, ya que estos no son un conjunto de RCA_0 , pues cualquier construcción de los reales implica que estos son incontables, por lo que estos no pueden codificarse como un subconjunto de $\mathbb{N}$. Aunque puedan existir modelos incontables de RCA_0 , su estructura interna es *contable*, por lo que es imposible codificar a los reales como un conjunto tal cual en RCA_0 .

La forma en que definiremos los números reales es por medio de la construcción de Cauchy. Fuera de RCA_0 , recordemos que una propiedad de los racionales es que, tomando la métrica inducida por el valor absoluto, no son un espacio métrico completo, es decir, no todas las sucesiones de Cauchy son convergentes en $\mathbb{Q}$. Por ejemplo, si nosotros tomamos la sucesión $\{x_n\}_{n \in \omega}$ definida como $x_0 = 1$ y $x_{n+1} = x_n/2 + 1/x_n$ para cada $n \in \omega$, entonces puede demostrarse que es una sucesión decreciente y acotada inferiormente por $\sqrt{2}$, y por tanto convergente en $\mathbb{R}$. Sabemos que toda sucesión convergente en $\mathbb{R}$ es de Cauchy (pues $\mathbb{R}$ es completo), luego tal sucesión es una sucesión de Cauchy de números racionales, pero se tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

En ese sentido, podemos construir a $\mathbb{R}$ *completando* a $\mathbb{Q}$, es decir, podemos tomar todo el conjunto de sucesiones de Cauchy en $\mathbb{Q}$ y crear una relación de equivalencia que codifique la igualdad en $\mathbb{R}$. Si tenemos dos sucesiones de Cauchy $\{x_n\}_{n \in \omega}, \{y_n\}_{n \in \omega} \subseteq \mathbb{Q}$, entonces diremos que son *equivalentes* si tienen el mismo límite. Sin embargo, como tal límite no necesariamente existe en $\mathbb{Q}$, entonces podemos resolverlo considerando la sucesión resta $\{x_n - y_n\}_{n \in \omega}$, la cual necesariamente convergería a 0. Por lo tanto, las dos sucesiones son *equivalentes* si y solo si para cada $\varepsilon > 0$ existe $N \in \omega$ tal que para cada $n \geq N$, $|x_n - y_n| < \varepsilon$.

Sin embargo, notemos que esta definición de equivalencia mediante convergencia de sucesiones es una fórmula Π_2^0 , pero este tipo de fórmulas son muy complejas, entonces nos interesa que tal definición sea lo más simple posible. Intuitivamente la definición que tenemos de equivalencia, dada por la convergencia a cero de la resta, se refiere a que ese conjunto de puntos en $\mathbb{Q}$ se “aceRCAn” cada vez más al cero a medida que el índice $n \in \omega$ se hace más grande. El hecho de que los puntos se “aceRCAn” cada vez más se traduce formalmente con ε cuando este es cada vez más cercano a cero, y el tal N se vuelve una función $N(\varepsilon)$ que nos dice a partir de qué índice ese “aceRCAmiento” es cierto. Una forma más sencilla es no usar un ε arbitrario, sino uno que dependa de los naturales y que sea cada vez más cercano a cero. Una buena propuesta es usar los números 2^{1-n} donde $n \in \omega$, los cuales decaen rápidamente a 0 entre mayor sea n . Se implica entonces que N se vuelve ahora una función de n , es decir que $N(n)$. Sin embargo, notemos que este $N(n)$ puede oscilar alrededor de n , es decir, puede ser que $|x_k - y_k|$ empiece a hacerse más pequeño que 2^{1-n} cuando $k \geq N(n) > n$ y después podría ser que $|x_k - y_k|$ empiece a hacerse más pequeño que $2^{1-(n+3)}$ cuando $k \geq N(n+3)$ pero $N(n+3) < n+3$. En ese caso determinar $N(n)$ puede ser algo muy complicado de una sucesión a otra. Luego, podemos obligar a que tal N sea de hecho n , es decir, $N(n) = n$. Esto deja afuera el hecho de encontrar al N pues ya está más que determinado.

Con todo eso decimos que dos sucesiones $\{x_n\}_{n \in \omega}, \{y_n\}_{n \in \omega} \subseteq \mathbb{Q}$ son equivalentes si para cada $n \in \omega$ se satisface que $|x_n - y_n| < 2^{1-n}$. Sin embargo, notemos que esta definición obliga a que la sucesión resta decaiga a un ritmo exponencial, pero no todas las sucesiones de Cauchy decaen tan rápido como para que tal imposición siempre se satisfaga. Para que nuestra definición de equivalencia sea coherente, podemos a su vez imponer que las sucesiones de Cauchy con las que trabajemos decaigan a su vez al mismo ritmo exponencial. Luego podemos imponer que las sucesiones de Cauchy $\{x_n\}_{n \in \omega} \subseteq \mathbb{Q}$ sean tales que para cada $k, n, m \in \omega$, si $n, m \geq k$, entonces $|x_n - x_m| < 2^{-k}$. Podemos simplificar lo anterior tomando $n = k$ y $m \geq n$, lo cual implica que existe $p \in \omega$ tal que $m = n + p$, por lo que trataremos entonces con las sucesiones $\{x_n\}_{n \in \omega} \subseteq \mathbb{Q}$ tales que para cada $k, p \in \omega$, $|x_k - x_{k+p}| < 2^{-k}$. Con todo esto podemos definir entonces qué significa ser un número real en RCA_0 .

Definición 3.15 (Sucesiones). Una *sucesión de números racionales* es una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$. Se denotará a la sucesión f por $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ si para cada $k \in \mathbb{N}$, $f(k) = x_k$.

Definición 3.16 (Números reales). Un *número real* es cualquier sucesión de racionales $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ tal que para cada $k, p \in \mathbb{N}$, $|x_k - x_{k+p}| < 2^{-k}$.

Definición 3.17 (Igualdad entre números reales). Sean $x = \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ y $y = \{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ números reales. Decimos que x y y son *iguales*, denotado por $x =_{\mathbb{R}} y$, si para cada k se satisface que $|x_k - y_k| < 2^{-k+1}$.

Aunque esta relación $=_{\mathbb{R}}$ no es un conjunto que exista en RCA_0 , ya que es una relación entre conjuntos y no entre números, sí podemos verificar que satisface las propiedades de una relación de equivalencia.

Teorema 3.19. Se demuestra lo siguiente:

1. Para cada número real x se satisface que $x =_{\mathbb{R}} x$.
2. Para cada par de reales x y y se satisface que $x =_{\mathbb{R}} y$ implica $y =_{\mathbb{R}} x$.
3. Para cada terna de reales x , y y z se satisface que $x =_{\mathbb{R}} y$ y $y =_{\mathbb{R}} z$ implica $x =_{\mathbb{R}} z$.

Demostración. Consideremos a los reales $x = \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, $y = \{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ y $z = \{z_k\}_{k \in \mathbb{N}}$.

1. Se satisface claramente para cada k que:

$$|x_k - x_k| = 0 < 2^{-k+1}$$

Por lo que $x =_{\mathbb{R}} x$.

2. Si $x =_{\mathbb{R}} y$, entonces sabemos que para cada k se satisface que $|x_k - y_k| < 2^{-k+1}$. Directamente se sigue que para cada k , $|y_k - x_k| < 2^{-k+1}$, es decir, $y =_{\mathbb{R}} x$.
3. Si $x =_{\mathbb{R}} y$ y $y =_{\mathbb{R}} z$, entonces por definición para cada k , $|x_k - y_k| < 2^{-k+1}$ y $|y_k - z_k| < 2^{-k+1}$. Consideremos un valor fijo $p > 1$, entonces por la desigualdad del triángulo y al ser x , y y z números reales se sigue que para cada k :

$$\begin{aligned} |x_k - z_k| &\leq |x_k - x_{k+p}| + |x_{k+p} - y_{k+p}| + |y_k - y_{k+p}| + |y_k - z_k| \\ &< 2^{-k} + 2^{-k-p+1} + 2^{-k} + 2^{-k+1} \\ &= 2^{-k+1}(2^{-1} + 2^{-p} + 2^{-1} + 1) \\ &= 2^{-k+1}2^{-p+1} \\ &< 2^{-k+1} \end{aligned}$$

□

Ahora definamos el orden dentro de los reales. Fuera de RCA_0 , pensemos en dos números reales $\{x_n\}_{n \in \omega}$ y $\{y_k\}_{k \in \omega}$. Consideremos que $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ y $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$

son tales que $x \leq y$. Por la propuesta de definición que tenemos de convergencia en RCA_0 sabemos que para cada $n, p \in \omega$:

$$\begin{aligned} |x_n - x_{n+p}| &< 2^{-n} \\ |y_n - y_{n+p}| &< 2^{-n} \end{aligned}$$

Tomando el límite cuando $p \rightarrow \infty$ notemos que se tiene lo siguiente para cada $n \in \omega$:

$$\begin{aligned} |x_n - x| &< 2^{-n} \\ |y_n - y| &< 2^{-n} \end{aligned}$$

de lo cual se sigue que $x_n - 2^{-n} < x$ y $y < y_n + 2^{-n}$. Puesto que $x \leq y$ se tiene que para cada $n \in \omega$, $x_n - 2^{-n} < x \leq y < y_n + 2^{-n}$, o equivalentemente se satisface que $x_n < y_n + 2^{-n+1}$. Además, notemos que tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$ obtenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (y_n + 2^{-n+1}) \implies x \leq y$$

Por lo tanto, podemos concluir que $x \leq y$ si y solo si para cada $n \in \omega$ se satisface que $x_n < y_n + 2^{-n+1}$. De esta forma podemos definir la relación de orden de los reales en RCA_0 .

Definición 3.18 (Orden en $\mathbb{R}$). Sean $x = \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ y $y = \{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ números reales.

- Denotaremos por $x \leq_{\mathbb{R}} y$ si para cada k se satisface que $x_k < y_k + 2^{-k+1}$.
- Denotaremos por $x <_{\mathbb{R}} y$ si no se satisface que $y \leq_{\mathbb{R}} x$.

Mostremos que de esta definición de orden se puede demostrar que se satisfacen las propiedades de una relación de orden lineal.

Teorema 3.20. Se demuestra lo siguiente:

1. Si x es un real, entonces se satisface que $x \leq_{\mathbb{R}} x$.
2. Si x, y y z son números reales, $x \leq_{\mathbb{R}} y$ y $y \leq_{\mathbb{R}} z$, entonces $x \leq_{\mathbb{R}} z$.
3. Si x y y son números reales, $x \leq_{\mathbb{R}} y$ y $y \leq_{\mathbb{R}} x$, entonces $x =_{\mathbb{R}} y$.
4. Si x y y son números reales, entonces $x \leq_{\mathbb{R}} y$ o $y <_{\mathbb{R}} x$.

Demostración. Consideremos a los números reales $x = \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, $y = \{y_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ y $z = \{z_k\}_{k \in \mathbb{N}}$.

1. Puesto que para cada k se satisface que $2^{-k+1} > 0$ se sigue que $x_k < x_k + 2^{-k+1}$, es decir, $x \leq_{\mathbb{R}} x$.

2. Si $x \leq_{\mathbb{R}} y$ y $y \leq_{\mathbb{R}} z$, entonces sabemos que para cada k , $x_k < y_k + 2^{-k+1}$ y $y_k < z_k + 2^{-k+1}$. Consideremos un valor fijo $p > 1$, entonces para cada k se sigue lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 x_k &< y_k + 2^{-k+1} \\
 &< y_k - y_{k+p} + y_{k+p} + 2^{-k+1} \\
 &< 2^{-k} + y_{k+p} + 2^{-k+1} \\
 &< 2^{-k} + z_{k+p} + 2^{-k-p+1} + 2^{-k+1} \\
 &< z_{k+p} - z_k + z_k + 2^{-k} + 2^{-k+1} + 2^{-k-p+1} \\
 &< 2^{-k} + z_k + 2^{-k} + 2^{-k+1} + 2^{-k-p+1} \\
 &= z_k + 2^{-k+1} 2^{-p+1} \\
 &< z_k + 2^{-k+1}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $x \leq_{\mathbb{R}} z$.

3. Si $x \leq_{\mathbb{R}} y$ y $y \leq_{\mathbb{R}} x$, entonces para cada k , $x_k < y_k + 2^{-k+1}$ y $y_k < x_k + 2^{-k+1}$. De la segunda desigualdad obtenemos que $y_k - 2^{-k+1} < x_k$, por lo que $y_k - 2^{-k+1} < x_k < y_k + 2^{-k+1}$, es decir, $|x_k - y_k| < 2^{-k+1}$ para cada k . Por lo tanto, $x =_{\mathbb{R}} y$.

□

Referencias

- Dzhafarov, Damir D. y Carl Mummert (2022). *Reverse Mathematics: Problems, Reductions, and Proofs*. Theory and Applications of Computability. Cham: Springer. ISBN: 978-3-031-11366-6. DOI: 10.1007/978-3-031-11367-3.
- Mileti, Joseph (2022). *Modern Mathematical Logic*. Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-1-108-83314-1. DOI: 10.1017/9781108973106.
- Simpson, Stephen G. (2009). *Subsystems of Second Order Arithmetic*. 2.^a ed. Perspectives in Logic. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-88439-6. DOI: 10.1017/CB09780511581007.