

## Valores iniciales - Caso 1 - Crítico - Adulto (BL-1-C-A)



Líder del equipo: Inst		ructor:				Fecha:	_ Fecha:		
Informaci	Información sol			nformaciór	obre el paciente:				
Estos valores iniciales corresponden a un hombre de 5 cayó por las escaleras. El paciente requiere una extrica de la escalera, manejo de las vías respiratorias y la resinmovilización de la columna y transporte rápido. Lea e brinde información a todos los miembros del equipo a rocaso avanza o que los miembros del equipo hacen pre				ación rápida spiración, el caso y medida que el		Cuadro:	El paciente está pálido y diaforético, y labios cianóticos, pantorrilla derecl fracturada, enrojecimiento de la part izquierda del tórax y desgarro leve e cabeza.	na e	
						Posición:	Se encuentra sentado erguido en l esquina de un escalón.	а	
				F	Acciones:	El paciente está despierto, confunc con dolor al mover el tobillo derech la parte izquierda del tórax y abdo	10 0		
Informaci	ón para el despact	10:							
emergeno 18:30 de de un cer Evaluació Cuando II	cia. Su servicio fue una tarde húmeda ntro de traumatolog ón de la escena y c lega a la escena, v	despachado a un hogar re de otoño, y la temperatura yía de nivel II. bservaciones iniciales:	sideno exteri na esc	cial, para at for es de 52	ter 2°	nder a un h F (11°C).	o que presta servicios médicos de ombre que cayó por las escaleras. S Desde la escena, usted está a 18 mi cuidado. Los agentes del orden		
Valoración primaria:				Tratamientos/Acciones *Nota: El ícono señala una acción críticas:					
A:	Vías respiratorias	permeables		Mantener			ción manual de la cabeza y el cuello a columna cervical	A	
B:	puede pronunciar	a y superficial, nonar simétrica, solo ráfagas de palabras 4 palabras y luego					es con oxígeno complementario de apida de las escaleras	<b>A</b>	
C:	externas significa	bil, sin hemorragias tivas; piel pálida y sis alrededor de los labios l		Inmoviliza	aci	ón de la co	lumna y ferulización del tobillo	A	
D:	El paciente está de respuestas adecu	consciente y tiene		Transporte	e ı	ápido a un	centro de traumatología		
E:	Tórax y abdomen						de vías intravenosas durante el ner la tensión arterial sistólica en	A	
Notas:									



## Valores iniciales - Caso 1 - Crítico - Adulto (BL-1-C-A)



Líder del equipo:			Instructor:			Fecha:					
Imp	resión inicial del pa	aciente:									
Valoración secundaria:											
Signos vitales iniciales:				Nue	va medición:		temas ánicos:				
	Tensión arterial: 78/palpación		n	84/palpación			Cabeza:	Desgarro leve de 3/4 pulgadas (2 cm); sangrado mínimo en la frente			
	Pulso:			124 20, asistida							
	Respiración: Saturación de	espiración: 32 aturación de 84 %/RA, 94 %					Cuello:	Aumenta el dolor al tacto en la superficie posterior de la columna			
	oxígeno (SpO <sub>2</sub> ): Escala de coma	con O <sub>2</sub> 15 (O-5, V-4			94 % 15 (O-5, V-4, M-6)		Tórax:	Sonidos simétricos, taquipnea, dolor en la parte inferior izquierda			
	de Glasgow: Glucosa:	6) Sin informa	ción		118 md/dl		D: 1	del tórax Pálida, diaforética y cianótica			
Ш				en la d	cabeza, cuello,	$H \square$	Piel:	•			
tóra			y abdo	men, y tobillo		Abdomen y pelvis:	Dolor en el cuadrante superior izquierdo				
				conocen alergias			Extremidades:	Fractura abierta del tobillo derecho, sangrado mínimo			
	Procesos médicos y Ning quirúrgicos previos:			no			Aspecto	Escala de coma de Glasgow 15 (O-5, V-4, M-6)			
			El alm	lmuerzo, hace 7 horas			neurológico: Posterior:	Sin aspectos destacados			
Eventos previos a la Tropie			ezo sobre una alfombra		Pu	ntos de debate:					
lesión: ubicade escale			ada en la cima de las Ieras			Al final de la evaluación de los valores iniciales,					
Tiempo de transporte: Extric			ación y	/ transporte rápidos	aula	agradezca a los participantes y pídales que regresen al aula. En este momento no se analizará el desempeño					
Destino: Centr		ntro de traumatología			con los participantes.						
Notas:											
1100	<u></u>										