





Líder del equipo: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

Información para el instructor:	Información sobre el paciente:
Los valores iniciales corresponden a un paciente adulto involucrado en una colisión por vehículo automotor (MVC, por sus siglas en inglés) a alta velocidad. Las lesiones incluyen una posible fractura de la pantorrilla, lesiones torácicas y una posible hemorragia interna. Lea el caso y brinde información a todos los miembros del equipo a medida que el caso avanza o que los miembros del equipo hacen preguntas.	<p>Cuadro: El paciente está pálido y diaforético, lechos ungueales y labios cianóticos, pantorrilla derecha fracturada, enrojecimiento de la parte izquierda del tórax y desgarro leve en la cabeza.</p> <p>Posición: Sentado en el auto, desplomado sobre el volante.</p> <p>Acciones: El paciente está despierto, confundido, con dolor al mover el tobillo derecho o la parte izquierda del tórax y abdomen.</p>

Información para el despacho:
Usted y sus compañeros están trabajando para un gran sistema de transporte urbano que presta servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en inglés). Su servicio fue despachado a la intersección de una carretera secundaria del condado y una autopista, donde se produjo una colisión por vehículo automotor. Son las 18:30 de una tarde húmeda de otoño, y la temperatura exterior es de 52 °F (11 °C). Desde la escena, usted está a 18 minutos de un centro de traumatología de nivel II.
Evaluación de la escena y observaciones iniciales:
Usted y sus compañeros llegan a la intersección de una carretera del condado y una autopista, donde un auto colisionó con otro de forma perpendicular. Su paciente estaba conduciendo por la autopista, cuando otro vehículo que estaba conduciendo en la carretera del condado y no se detuvo en la intersección lo chocó en el lado del conductor. Otro equipo se encargará de atender al conductor del otro vehículo. Los agentes del orden público están en la escena dirigiendo el tráfico y el departamento de bomberos está presente, para ayudar según sea necesario.

Valoración primaria:	Tratamientos/Acciones críticas:	*Nota: El ícono señala una acción crítica.
<input type="checkbox"/> A: Vías respiratorias permeables	<input type="checkbox"/> Mantener la estabilización manual de la cabeza y el cuello y la inmovilización de la columna cervical	
<input type="checkbox"/> B: Respiración rápida y superficial, auscultación pulmonar simétrica	<input type="checkbox"/> Asistir con ventilaciones con oxígeno complementario	
<input type="checkbox"/> C: Pulso rápido y débil, sin hemorragias significativas; piel pálida y diaforética; cianosis alrededor de los labios y el lecho ungueal	<input type="checkbox"/> Inmovilización de la columna y ferulización del tobillo	
<input type="checkbox"/> D: El paciente está consciente pero confundido, sus respuestas son inapropiadas y no recuerda lo que sucedió	<input type="checkbox"/> Transporte rápido a un centro de traumatología	
<input type="checkbox"/> E: Tórax y pantorrilla	<input type="checkbox"/> Considere la inserción de vías intravenosas durante el transporte, para mantener la tensión arterial sistólica en 90	

Notas:

Líder del equipo: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

Impresión inicial del paciente:		<input type="checkbox"/> Crítica	
Valoración secundaria:			
Signos vitales iniciales:		Nueva medición:	
<input type="checkbox"/> Tensión arterial:	70/palpación	<input type="checkbox"/> 74/palpación	
<input type="checkbox"/> Pulso:	130	<input type="checkbox"/> 124	
<input type="checkbox"/> Respiración:	32	<input type="checkbox"/> 20, asistida	
<input type="checkbox"/> Saturación de oxígeno (SpO ₂):	94 % con O ₂	<input type="checkbox"/> 96 %	
<input type="checkbox"/> Escala de coma de Glasgow:	14 (O-4, V-4, M-6)	<input type="checkbox"/> 14 (O-4, V-4, M-6)	
<input type="checkbox"/> Glucosa:	Sin información	<input type="checkbox"/> 118 mg/dl	
<input type="checkbox"/> Signos y síntomas:		Sin información	
<input type="checkbox"/> Alergias:		No se conocen alergias	
<input type="checkbox"/> Procesos médicos y quirúrgicos previos:		Ninguno	
<input type="checkbox"/> La última ingesta oral:		El almuerzo, hace 5 horas	
<input type="checkbox"/> Eventos previos a la lesión:		No recuerda	
<input type="checkbox"/> Tiempo de transporte:		Extricación y transporte rápidos	
<input type="checkbox"/> Destino:		Centro de traumatología	
Sistemas orgánicos:			
<input type="checkbox"/> Cabeza:	Desgarro leve con sangrado mínimo en la parte izquierda de la frente		
<input type="checkbox"/> Cuello:	Aumenta el dolor al tacto en la superficie posterior		
<input type="checkbox"/> Tórax:	Sonidos simétricos, taquipnea, dolor en la parte inferior izquierda del tórax		
<input type="checkbox"/> Piel:	Pálida, diaforética y cianótica		
<input type="checkbox"/> Abdomen y pelvis:	Dolor en el cuadrante superior izquierdo		
<input type="checkbox"/> Extremidades:	Fractura abierta del tobillo derecho, sangrado mínimo		
<input type="checkbox"/> Aspecto neurológico:	Escala de coma de Glasgow 14 (O-4, V-4, M-6)		
<input type="checkbox"/> Posterior:	Sin aspectos destacados		
Puntos de debate:			
Al final de la evaluación de los valores iniciales, agradezca a los participantes y pídales que regresen al aula. En este momento no se analizará el desempeño con los participantes.			

Notas:
