

## Estación de Evaluación Final - Caso 1A - Crítico - Adulto (EEF-1A-C-A)



Líder del equipo: Ins		structor:	Fecha:								
nforma	ción del instructor:			Información del paciente:							
ista estación de valoración final se refiere a un paciente ma 14 años sin cinturón de seguridad en una colisión de un so nutomotor (CVA) (automóvil vs. árbol). Los requerimientos extracción rápida, manejo de la vía aérea y ventilación, inma aquídea y transportación rápida. Siga el escenario escrito y nformación a todos los miembros del equipo conforme el exanza o preguntan los miembros del equipo.			lo vehículo son de lovilización / proporcione	Modelo:  Posición: Acciones:	piel es pálida, sudorosa y cianótica, fracabierta de tobillo derecho, eritema izqui tórax, laceración de la cabeza sentada, apoyado sobre el volante. abre los ojos ante el dolor, confuso, pre repetitivas, admite haber tomado cervez	erdo en guntas					
nforma	ción de despacho:										
Isted y sus compañeros trabajan para un gran departamento de transporte de SMU y son enviados a un camino rural por una CVA de utomóvil contra árbol. Son las 04:00 de una mañana húmeda de otoño 11 °C 52 °F), la policía y los bomberos se encuentran en el scenario. Usted está a 24 minutos de un Centro de Trauma de nivel II.											
valuaci	ón en la escena/Observacione	es iniciales:									
Conforme se acerca al escenario usted observa un vehículo con daño extenso del frente, un parabrisas "estrellado" y despliegue de la volsa de aire del lado del conductor. El vehículo tiene acceso total. El departamento de policía controla el tránsito y el de bomberos le está uminando el escenario. Usted cuenta con un paciente.											
valuaci	ón primaria:		Tratamient	os/Acciones o	críticas: *Nota: el ícono indica una Acció	n crítica.					
A:	Vía aérea permeable con cian	osis labial		zación manua geno a flujo a	l de cabeza y cuello, ventilación asistida lto	<b>A</b>					
B:	Rápida y poco profunda, ruido equivalentes	os respiratorios	Extraco	ión rápida, inr	movilización raquídea	<b>A</b>					
C:	Sin pulso radial palpable, el pr débil, hemorragia menor en la de la frente una fractura de to cianosis labial y de lechos ung	a parte izquierda obillo abierta,	Transpo	orte rápido, m	antenga el calor corporal						
D:	D: Confuso, responde ante el dolor		Considere una venoclisis en el camino para mantener la TA de 80 a 90								
E:	Apoyado sobre el volante										
otas:											



Líder del equipo:

## Estación de Evaluación Final - Caso 1A - Crítico - Adulto (EEF-1A-C-A)

Fecha:

Instructor



instructor.												
Impresión inicial del paciente:  En estado crítico												
Evaluación secundaria:												
Signos vitales i	niciales:	Reevalua	Reevaluación:		Sistemas corporales:							
T/A:	· ·		84 / Palpación		Cabeza:	la frente presenta una laceración de 2 cm con hemorragia mínima						
R:	32	asist	asistida con frecuencia de 20		Cuello:	dolor a la palpación de la columna cervical, cara posterior						
SpO <sub>2</sub> :	80% antes del oxígeno	11—			Tórax:	respiración rápida poco profunda con ruidos respiratorios equivalentes						
ECG:	12 (O-2, V-4. M-6)	sin o	sin cambios		Piel:	pálida, fría, cianótica y diaforética						
Glucosa: Signos/sínt	ucosa: 126 mg/dL dolor en la cabeza, e				Abd/Pelvis:	dolor LUQ, crepitación ósea de la pelvis a la palpación						
		el hemitórax izo abdomen y el t	emitórax izquierdo, el omen y el tobillo		Extremidades:	fractura abierta del tobillo derecho, mínima hemorragia						
Alergias:		ninguna	guna		Neurológico:	ECG 12						
Antecedentes médicos: ninguno					Posterior:	sin datos patológicoss						
	Última ingesta oral: 6 a 8 cervezas  Puntos de discusión:											
	e traslado: ા	Jrgente Lentro de Traun	NOTA: El no concluir un paso de acción crítica identifica dentro de este escenario escrito constituirá un intento r exitoso para su estación de evaluación final. Al término									
		a discusión agradezca a los participantes y I salón de clases.										
Notas:												