





Líder del equipo: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

Información del instructor:	Información del paciente:
Esta estación de evaluación final se refiere a un conductor masculino de 30 años sin cinturón de seguridad que fue expulsado después de perder el control de su vehículo durante una persecución a gran velocidad por la policía. El vehículo rodó dos veces y expulsó al paciente. El paciente requerirá un retiro rápido del escenario, manejo de vía aérea/ventilación, inmovilización raquídea y transportación rápida. Siga el escenario escrito y proporcione información a todos los miembros del equipo conforme el escenario avanza o preguntan los miembros del equipo.	<p>Modelo: piel pálida cianótica sudorosa, laceración de cuero cabelludo, fractura de cadera derecha, LUQ roja, aire subcutáneo</p> <p>Posición: en decúbito lateral izquierdo sobre el piso</p> <p>Acciones: alerta ante el dolor, ojos cerrados, insiste preguntando "¿Qué hora es?" Dolor torácico, LUQ y cadera derecha, habla en lapsos de 3 a 4 palabras</p>

Información de despacho:
Usted y sus compañeros trabajan para un gran servicio de transporte de SMU. Se les despacha a un camino rural por una colisión por vehículo automotor único (CVA) con dos giros y expulsión del paciente. Hubo una persecución a gran velocidad por la policía y el paciente perdió el control del vehículo que salió del camino y volcó. Son las 16:30 de un día de primavera 24 °C (76 °F). Se encuentran en el escenario la policía y los bomberos. A partir del escenario usted cuenta con 24 minutos para llegar a un Centro de Trauma de nivel II.
Evaluación en la escena/Observaciones iniciales:
Conforme arriba al escenario usted observa un vehículo fuera del camino con daño significativo y despliegue de bolsas de aire. Su paciente se encuentra a casi 10 metros del vehículo acostado sobre su lado izquierdo en el pasto, con los primeros individuos de respuesta de urgencia que lo atienden mientras le hacen señas en cuando a su localización.

Evaluación primaria:	Tratamientos/Acciones críticas: *Nota: el ícono indica una Acción crítica.
<input type="checkbox"/> A: Permeable y con expresión de 3 a 4 palabras en lapsos	<input type="checkbox"/> Estabilización manual de cabeza y cuello 
<input type="checkbox"/> B: Ruidos respiratorios equivalentes, rápidos y poco profundos	<input type="checkbox"/> Oxígeno a flujo alto, ventilación asistida 
<input type="checkbox"/> C: Pulso rápido y débil, laceración de cuero cabelludo con hemorragia significativa, pálido y diaforético con cianosis de labios y lechos ungulares	<input type="checkbox"/> Presión directa sobre la hemorragia de cuero cabelludo, cobertura de la herida con un apósito, realización de inmovilización raquídea y cobertura para mantener el calor corporal 
<input type="checkbox"/> D: Con confusión del habla y respuesta al dolor	<input type="checkbox"/> Transportación rápida 
<input type="checkbox"/> E: Expulsado del vehículo que giró dos veces, acostado sobre su izquierda en el pasto	<input type="checkbox"/> Inmovilice la extremidad pélvica, considere una venoclisis en camino para mantener la TA de 80 a 90

Notas:
