

## CS3230 Tutorial 2

AY 25/26 Sem 1 — github/omgeta

Q1). Give a tight asymptotic bound for  $T(n) = 4 \cdot T(\frac{n}{4}) + \frac{n}{\log n}$

$$\begin{aligned}
 T(n) &= 4T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n}{\log n} \\
 \implies \frac{T(n)}{n} &= \frac{T(n/4)}{n/4} + \frac{1}{\log n} \\
 \frac{T(n/4)}{n/4} &= \frac{T(n/4^2)}{n/4^2} + \frac{1}{\log n/4} \\
 &\vdots \\
 \frac{T(n/4^{\log_4(n)-1})}{n/4^{\log_4(n)-1}} &= \frac{T(n/4^{\log_4(n)})}{n/4^{\log_4(n)}} + \frac{1}{\log n/4^{\log_4(n)-1}} \quad (\text{when } \frac{n}{4^k} = 1, k = \log_4 n)
 \end{aligned}$$

Then by cancellation,

$$\begin{aligned}
 \frac{T(n)}{n} &= \frac{T(1)}{T(1)} + \frac{1}{\log n} + \dots + \frac{1}{\log n/4^{\log_4(n)-1}} \\
 &= \frac{T(1)}{T(1)} + \frac{1}{\log 4^i} + \dots + \frac{1}{\log 4^1} \quad (\text{let } n = 4^i) \\
 &= \frac{T(1)}{T(1)} + \frac{1}{\log 4} \left\{ \frac{1}{i} + \dots + \frac{1}{1} \right\} \quad (\text{let } n = 4^i) \\
 &= \frac{T(1)}{T(1)} + \Theta(\log i) \quad (\text{harmonic sum}) \\
 &= \frac{T(1)}{T(1)} + \Theta(\log \log n) \\
 \therefore T(n) &\in \Theta(n \log \log n)
 \end{aligned}$$

Q2).  $T(n) = 5T(\frac{n}{3}) + n$ ,  $d = \log_3 5 = 1.46 \dots$  and  $f(n) = n \in O(n^{\log_3 5 - \epsilon})$ , so by case 1  $T(n) \in \Theta(n^{\log_3 5})$

Q3).  $T(n) = 9T(\frac{n}{3}) + n^3$ ,  $d = \log_3 9 = 2$  and  $f(n) = n^3 \in \Omega(n^{2+\epsilon})$  ad for regularity  $9(\frac{n}{3})^3 = \frac{1}{3}n^3 \leq \frac{1}{3}n^3 \wedge \frac{1}{3} < 1$ , so by case 3  $T(n) \in \Theta(n^3)$

Q4).  $T(n) = 16T(\frac{n}{4}) + n^2 \log n$ ,  $d = \log_4 16 = 2$  and  $f(n) = n^2 \log n \in \Theta(n^2 \log n)$ , so by case 2  $T(n) \in \Theta(n^2 \log^2 n)$

Q5). Give a tight asymptotic bound for  $T(n) = 4 \cdot T(\frac{n}{2}) + \sqrt{n}$ .

1. Proof  $T(n) \in O(n^2)$ :

1.1. Guess  $T(n) \leq cn^2 - d\sqrt{n}$

1.2. Base case:  $T(0) = 0 \leq c \cdot 0^2 - d\sqrt{0}$

1.3. Inductive step:

$$T(n) = 4T(\frac{n}{2}) + \sqrt{n} \leq 4(c\frac{n^2}{4} - d\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}) + \sqrt{n} = cn^2 - 2\sqrt{2}d\sqrt{n} + \sqrt{n} = cn^2 + (1 - 2\sqrt{2})d\sqrt{n},$$

so choose  $d < \frac{1}{1-2\sqrt{2}}$  and from base case  $T(1) \leq q$ , therefore

$$T(1) \leq c \times 1^2 - d \times 1 \leq q \implies c \leq q + d$$

2. Proof  $T(n) \in \Omega(n^2)$ :

2.1. Guess  $T(n) \geq cn^2$

2.2. Base case:  $T(0) = 0 \geq c \cdot 0^2$

2.3. Inductive step:  $T(n) = 4T(\frac{n}{2}) + \sqrt{n} \geq 4 \cdot c(\frac{n}{2})^2 = cn^2$

Q6).  $T(k, n) = T(\lceil \frac{k}{2} \rceil, n) + T(\lfloor \frac{k}{2} \rfloor, n) + kn = 2T(\frac{k}{2}, n) + \Theta(kn)$

By recursion tree, there are  $\log k$  levels with  $\Theta(kn)$  work at each level so  $T(k, n) = \Theta(kn \log k)$