

MA1522 Tutorial 10
AY 24/25 Sem 1 — github/omgeta

Q1. (a) $A = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.2 & 0.4 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.5 & 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}$ which has each column adding up to 1 and all values between 0 and 1 ■

(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$ so:

$$x_3 = A^3 x_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^3 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{10}^3 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5}^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 35 \\ 31.2 \\ 33.8 \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

(c) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$ which is the same result as in (b)

(d) As $n \rightarrow \infty$, $D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{10}^n & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5}^n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$:

$$x_\infty = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 33.3 \\ 33.3 \\ 33.3 \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

so in the long run all ants will be equally distributed ■

(e) As $n \rightarrow \infty$, $D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{10}^n & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5}^n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$:

$$x_\infty = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \alpha + \beta + \gamma \\ \alpha + \beta + \gamma \\ \alpha + \beta + \gamma \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

which is always an equilibrium vector ■

Q2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$, so

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \quad \blacksquare$$

Q3. (a) $P = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$ ■

(b) $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2\sqrt{5}}{5} & -\frac{2\sqrt{5}}{15} \\ -\frac{2}{3} & \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4\sqrt{5}}{15} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} \end{pmatrix}$ ■

Q4. (a) $P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$ and $P^T A P = D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ■

(b) Result is the same ■

Q5. (a) $A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{2}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$ ■

(b) Since A is the transpose of the matrix in (a),

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$
 ■

(c) $A = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$ ■

Q6. (a) $A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 40 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 20 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & -\frac{6}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & -\frac{4}{5} \end{pmatrix}$ ■

(b) Result is the same ■