

# 工科数学分析（上）学习笔记

lamaper

2024 年 10 月 28 日

## 1 前置知识

### 1.1 常用数列求和

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$$

### 1.2 和差化积公式

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

### 1.3 积化和差公式

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

## 2 函数、极限与连续

### 2.1 常用定理与推论

#### 2.1.1 一些简单的极限

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0 (|q| < 1)$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$

#### 2.1.2 归并性

例如要证明  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$  不存在，可以使用归并性证明。

证明如下：

令  $f(x) = \sin x$ ，如果取  $x_n = n\pi$  ( $x_n$  单调增加趋于正无穷大)，则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin n\pi = 0$$

然后又取  $x_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$  ( $x_n$  单调增加趋于正无穷大)，则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1$$

所以  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$  不存在。

#### 2.1.3 一种证明极限的思路

要证明  $f(x)$  极限，则要证明  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$

那么设  $f(x) = A + a(x)$ ，那么就要证明  $\lim_{x \rightarrow \infty} a(x) = 0$

这是一种利用无穷小性质来证明极限的方法。

#### 2.1.4 无穷小定理

- 有界函数与无穷小的乘积是无穷小
- 有限个无穷小的和是无穷小
- 有限个无穷小的乘积是无穷小

需要注意的是，无穷小是变量，而不是一个很小的数。

显然的，若  $f(x)$  是无穷小， $\frac{1}{f(x)}$  是无穷大，反之亦然。

## 2.1.5 夹逼定理

如果  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$ , 且  $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ , 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$

利用夹逼定理可以证明一些不好直接说明的极限, 它常与无穷小定理一起使用, 同时伴有数学归纳法。

## 2.1.6 两个重要极限和常用等价无穷小

两个重要极限实际上代表两种特殊的极限形式:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$  ( $\frac{0}{0}$  类型)
- $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$  ( $1^\infty$  类型)

在求解极限时, 所看到的式子进行分析, 确定类型, 然后朝向这两个重要极限进行转化。

重要极限也有一些扩展, 如  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$  ( $a \neq 0$ ).

当  $x \rightarrow 0$  时, 有以下等价无穷小:

- $x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arctan x \sim \arcsin x$ ;
- $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ ;
- $\ln(1+x) \sim e^x - 1 \sim x$ ;
- $(1+x)^a - 1 \sim ax$  ( $a$  是非零常数);
- $\frac{a^x - 1}{x} \sim \ln a$ ;

## 2.1.7 求极限策略

类型	操作	最终形式
$\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$	直接计算	
$0 \cdot \infty$	恒等变化	$\frac{0}{\frac{1}{\infty}}$ 或者 $\frac{\infty}{\frac{1}{0}}$
$\infty - \infty$	通分	$\frac{\infty}{\infty}$ 或者 $\frac{0}{0}$
$\infty^0$ 或者 $0^0$ 或者 $1^\infty$	朗博同构: $\lim u^v = e^{\lim(v \ln u)}$	$\frac{0}{\frac{1}{\infty}}$ 或者 $\frac{\infty}{\frac{1}{0}}$

## 2.2 典型例题

### 2.2.1 利用数学归纳法证明

证明下列数列有极限且求出极限：

$$(1) y_1 = 10, y_{n+1} = \sqrt{6 + y_n}, (n = 1, 2, \dots);$$

$$(2) y_1 = \sqrt{2}, y_{n+1} = \sqrt{2y_n}, (n = 1, 2, \dots);$$

解：

(1) 先证明 $y_n$ 有界，再证明 $y_n$ 单调，最后说明 $y_n$ 有极限。

$$\text{由表达式知道 } y_n > 0, y_1 = 10, y_2 = \sqrt{6+10} = 4, y_3 = \sqrt{6+4} = \sqrt{10}$$

观察猜测 $y_n$ 应当不断减小，且减小趋势越来越小，所以 $y_n$ 应当有下界且单调递减。

接下来先证明有界：

$$y_1 = 10 > 3, y_2 = 4 > 3, y_3 = \sqrt{10} > 3, \text{从而猜测 } y_n > 3,$$

$$\text{由数学归纳法，假设 } y_n > 3, \text{则 } y_{n+1} = \sqrt{6 + y_n} > \sqrt{6 + 3} = 3,$$

从而证明了 $y_n$ 有下界。

再证明 $y_n$ 单调：

$$y_{n+1} - y_n = \sqrt{6 + y_n} - y_n = \frac{6 + y_n - y_n^2}{\sqrt{6 + y_n} + y_n} = \frac{(2 + y_n)(3 - y_n)}{\sqrt{6 + y_n} + y_n}$$

由于 $y_n > 3$ ，所以 $y_{n+1} - y_n < 0$ ，从而证明了 $y_n$ 单调递减。

(技巧：面对根式相减，可以利用平方差公式构造恒正的分母，用无根号的分子来判断整个式子的正负)

最后求极限：

$$\text{设 } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A, \text{则有 } \lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{6 + y_n} = \sqrt{6 + A}$$

$$\text{即 } A = \sqrt{A + 6}, \text{通过解方程可得 } A = 3 \text{ 或 } A = +2,$$

但是由于 $y_n > 3 > 0$ ，所以舍去负根

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 3$$

解：

(2) 仿照(1)的方法，先证明 $y_n$ 有界，再证明 $y_n$ 单调，最后说明 $y_n$ 有极限。

$$y_1 = \sqrt{2} < 2, y_2 = \sqrt{2\sqrt{2}} < 2, \text{猜测 } y_n < 2,$$

$$\text{由数学归纳法，则 } y_{n+1} = \sqrt{2y_n} < \sqrt{2 \cdot 2} = 2,$$

从而证明了 $y_n$ 有上界。

再证明 $y_n$ 单调：

$$y_{n+1} - y_n = \sqrt{2y_n} - y_n = \frac{2y_n - y_n^2}{\sqrt{2y_n} + y_n} = \frac{y_n(2 - y_n)}{\sqrt{2y_n} + y_n}$$

由于 $y_n < 2$ ，所以 $y_{n+1} - y_n > 0$ ，从而证明了 $y_n$ 单调递增。

最后求极限:

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$ , 则有  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2y_n} = \sqrt{2A}$   
即  $A = \sqrt{2A}$ , 通过解方程可得  $A = 2$

### 2.2.2 已知极限值求参数

这类题通常需要到一个结论:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x) = 0, \text{ 若 } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$$

求出下列式子中  $\alpha$  与  $\beta$  的值:

- (1) 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \arctan x - \alpha x - \beta) = 0$ ;  
(2) 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{1-x^3} - \alpha x - \beta) = 0$ ;

(1) 解:

若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \arctan x - \alpha x - \beta) = 0$ , 则有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\arctan x - \alpha x - \frac{\beta}{x}) = 0$ .

由于  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ , 所以  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\arctan x - \alpha x - \frac{\beta}{x}) = 0$ .

由于  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\beta}{x} = 0$ , 所以  $\alpha = \frac{\pi}{2}$ .

接下来回代  $\alpha = \frac{\pi}{2}$ , 则有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \arctan x - \frac{\pi}{2}x) = \beta$ .

设  $u = \arctan x, x = \tan u$ , 即求  $\lim_{u \rightarrow \frac{\pi}{2}} -\tan u(\frac{\pi}{2} - u)$ . 为了方便可以再次换元  $x = \frac{\pi}{2} - u$ , 即求  $\lim_{x \rightarrow 0} -x \tan(\frac{\pi}{2} - x)$ . 即  $\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{x}{\cot x} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{x}{\sin x} \cos x = -1$ .

所以  $\beta = -1$ .

综上,  $\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = -1$ .

(2) 解: 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{1-x^3} - \alpha x - \beta) = 0$ , 则有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}} - 1 - \alpha - \frac{\beta}{x}) = 0$ .

即  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}} - 1 - \alpha - \frac{\beta}{x}) = 0$ , 可以求得  $\alpha = -1$ .

回代  $\alpha = -1$ , 则有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{1-x^3} + x) = \beta$ .

$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{1-x^3} + x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x(\sqrt[3]{1+\frac{-1}{x^3}} - 1)$ , 这里可以用等价无穷小  $(1+x)^a - 1 \sim ax$  替换, 则原式变为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$

综上,  $\alpha = -1, \beta = 0$ .

练习:

已知  $\exists c > 0$  使得  $\lim_{x \rightarrow \infty} [(x^5 + 7x^4 + 2)^c - x]$  存在且不为 0, 求  $c$

解:

由题意知  $\lim_{x \rightarrow \infty} [(x^5 + 7x^4 + 2)^c - x] = A$ , 其中  $A \neq 0$ .

则原式变为  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{5c} [(1 + \frac{7}{x} + \frac{2}{x^5}) - x^{1-5c}] = A$ .

由于  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{5c} = +\infty$ , 所以  $\lim_{x \rightarrow \infty} [(1 + \frac{7}{x} + \frac{2}{x^5}) - x^{1-5c}] = 0$ .

(这一步在后面详细解释)

由于  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1-5c} = 0$ , 所以  $1 - 5c = 0$ , 即  $c = \frac{1}{5}$ .

接着回代  $c = \frac{1}{5}$ , 则有  $\lim_{x \rightarrow \infty} [(x^5 + 7x^4 + 2)^{\frac{1}{5}} - x] = A$ .

进行变换  $\lim_{x \rightarrow \infty} [(x^5 + 7x^4 + 2)^c - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} [x \cdot \sqrt[5]{1 + \frac{7}{x} + \frac{2}{x^5}} - 1]$ , 利用  $(1+x)^a - 1 \sim ax$  替换则有  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{5} \cdot (\frac{7}{x} + \frac{2}{x^5}) = \frac{7}{5}$ .

不难发现, 在这其中我们仍然用到了无穷小与无穷大转换的思想:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x) = C, \text{ 若 } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \frac{C}{\infty} = 0$$

因为  $\frac{C}{\infty}$  实际上是无穷小, 所以此处极限就是0, 与上文提到的题目解法相同。

### 2.2.3 利用夹逼定理证明极限

求下列极限:

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\frac{1}{n^2+\pi} + \frac{1}{n^2+2\pi} + \dots + \frac{1}{n^2+n\pi});$

(2)  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^3+1} + \frac{4}{n^3+4}) + \dots + \frac{n^2}{n^3+n^2};$

(1) 解:

观察知  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\frac{1}{n^2+n\pi} + \frac{1}{n^2+n\pi} + \dots + \frac{1}{n^2+n\pi}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} n(\frac{1}{n^2+\pi} + \frac{1}{n^2+2\pi} + \dots + \frac{1}{n^2+n\pi}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} n(\frac{1}{n^2+\pi} + \frac{1}{n^2+\pi} + \dots + \frac{1}{n^2+\pi});$

不等式前一项  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\frac{1}{n^2+n\pi} + \frac{1}{n^2+n\pi} + \dots + \frac{1}{n^2+n\pi}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+n\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\frac{\pi}{n}} = 1;$

不等式后一项  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\frac{1}{n^2+\pi} + \frac{1}{n^2+\pi} + \dots + \frac{1}{n^2+\pi}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\frac{\pi}{n^2}} = 1;$

即  $1 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} n(\frac{1}{n^2+\pi} + \frac{1}{n^2+2\pi} + \dots + \frac{1}{n^2+n\pi}) \leq 1$ , 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\frac{1}{n^2+\pi} + \frac{1}{n^2+2\pi} + \dots + \frac{1}{n^2+n\pi}) = 1$

(2) 解:

观察知  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^3+n^2} + \frac{4}{n^3+n^2} + \dots + \frac{n^2}{n^3+n^2}) \leq \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^3+1} + \frac{4}{n^3+4} + \dots + \frac{n^2}{n^3+n^2}) \leq \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^3+1} + \frac{4}{n^3+1} + \dots + \frac{n^2}{n^3+1});$

即  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3+n^2} (\sum_{i=1}^n i^2) \leq \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^3+1} + \frac{4}{n^3+4} + \dots + \frac{n^2}{n^3+n^2}) \leq \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3+1} (\sum_{i=1}^n i^2);$

又  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3+n^2} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{1}{3}, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3+1} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{1}{3};$

$$\text{所以 } \frac{1}{3} \leq \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^3+1} + \frac{4}{n^3+4} + \dots + \frac{n^2}{n^3+n^2} \right) \leq \frac{1}{3};$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^3+1} + \frac{4}{n^3+4} + \dots + \frac{n^2}{n^3+n^2} \right) = \frac{1}{3}.$$

### 2.2.4 直接求极限

求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan 2x \tan \left( \frac{\pi}{4} - x \right);$$

(1) 解: 首先需要注意的是, 这个题  $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$  而不是  $x \rightarrow 0$ , 所以前面那么多的等价无穷小替换在这里没有办法使用。

如果足够敏锐, 可以发现这是一个  $\infty \cdot 0$  的极限, 我们可以通过变形使它可求。这里使用另外的办法:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan 2x \tan \left( \frac{\pi}{4} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \cdot \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \tan x}{(1 + \tan x)^2} = \frac{1}{2}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \tan \frac{\pi x}{2};$$

(2) 解: 本题也是一个  $\infty \cdot 0$  的极限, 首先通过换元法, 把它变得正常一点:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \tan \frac{\pi x}{2} = \lim_{t \rightarrow 0} t \cdot \tan \left( \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} t \right) = \lim_{t \rightarrow 0} t \cdot \frac{1}{\tan \frac{\pi}{2} t}$$

然后便可以由等价无穷小替换直接算出结果:  $\lim_{t \rightarrow 0} t \cdot \frac{1}{\tan \frac{\pi}{2} t} = \frac{2}{\pi}$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + x^3 + \dots + x^n - n}{x - 1};$$

(3) 解: 本题证明比较巧妙, 主要是通过对  $n$  的妙用来解决题目:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + x^3 + \dots + x^n - n}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) + (x^2-1) + (x^3-1) + \dots + (x^n-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} 1 + (x+1) + (x^2+x+1) + \dots + (x^{n-1} + \dots + 1) = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(1+n)}{2} \end{aligned}$$

### 2.2.5 函数的连续性与间断点问题

$$(1) \text{ 若 } f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & (x < 0) \\ 3x & (0 < x < 1), \text{ 在 } x=1 \text{ 处连续, 求 } a \text{ 的值.} \\ e^{2ax} - e^{ax} + 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$(2) \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} \frac{\sin ax}{\sqrt{1-\cos x}} & (x < 0) \\ b & (x = 0), \text{ 证明 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续.} \\ \frac{1}{x} [\ln x - \ln(x^2 + x)] & (x > 0) \end{cases}$$

(1) 解:

(2) 解:

### 3 导数与微分

#### 3.1 常用导数

函数	导数
$y = a^x$	$y' = a^x \ln a$
$y = \log_a x$	$y' = \frac{1}{x \ln a}$
$y = \sin x$	$y' = \cos x$
$y = \cos x$	$y' = -\sin x$
$y = \tan x$	$y' = \sec^2 x$
$y = \cot x$	$y' = -\csc^2 x$
$y = \sec x$	$y' = \sec x \tan x$
$y = \csc x$	$y' = -\csc x \cot x$
$y = \arcsin x$	$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$y = \arccos x$	$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$y = \arctan x$	$y' = \frac{1}{1+x^2}$
$y = -1/x$	$y' = \frac{1}{x^2}$
$y = \operatorname{arcsec} x$	$y' = \frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$
$y = \operatorname{arsh} x$	$y' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$y = \ln  x $	$y' = \frac{1}{x}$

特别地,  $\operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$



## 3.2 导数的运算法则

### 3.2.1 反函数求导

若可导函数  $y = f(x)$  的反函数为  $x = \Phi(y)$ , 则

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

或者有

$$\Phi(x) = \frac{1}{f'(x)}$$

### 3.2.2 参数方程求导

若  $x = x(t), y = y(t)$  均可导, 则有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

特别地, 整理出参数方程二阶导计算公式:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right) = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}$$

### 3.2.3 极坐标求导

一般将极坐标方程化为  $\begin{cases} x = \rho(\theta) \cos \theta \\ y = \rho(\theta) \sin \theta \end{cases}$ , 然后利用参数方程求导法则求导。

## 3.3 高阶导数

### 3.3.1 几个重要的高阶导数

$$\bullet y = x^m, \text{ (m是正整数)}, y^{(n)} = \begin{cases} m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)x^{m-n} & n < m \\ m! & n = m \\ 0 & n > m \end{cases}$$

$$\bullet y = x^a, \text{ (a不是正整数)}, y^{(n)} = a(a-1)(a-2)\dots(a-n+1)x^{a-n}$$

$$\bullet y = e^x, y^{(n)} = e^x$$

$$\bullet y = \sin x, y^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$\bullet y = \cos x, y^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$\bullet y = \ln x, y^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}$$

$$\bullet y = \frac{c}{ax+b}, y^{(n)} = c \frac{(-1)^n n!}{(ax+b)^{n+1}}$$

### 3.3.2 Leibniz公式

若  $u(x) = f(x)g(x)$ , 则有

$$u^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)$$

可以类比二项式定理。

### 3.3.3 $f(0) = 0$ 的妙用

在本章节中, 常出现  $x = 0$  处的导数问题, 通常需要利用导数定义的变形来求解, 当  $f(0) = 0$  时:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

## 3.4 微分

## 3.5 典型例题

### 3.5.1 利用定义计算导数

设  $f(x)$  可导, 且导函数有界,  $g(x) = f(x) \sin^2 x$ , 求  $g''(0)$ .

解:

由题意知  $g'(x) = f'(x) \sin^2 x + f(x) \sin 2x$ .

由于不知道  $f''(x)$  是否存在, 故使用定义直接求  $g''(0)$ .

所以有:

$$\begin{aligned} g''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) - g'(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) \sin^2 x + f(x) \sin 2x - f'(0) \sin^2 0 - f(0) \sin 2 \cdot 0}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) \sin^2 x + f(x) \sin 2x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) \sin^2 x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \sin 2x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cdot x \cdot \frac{\sin^2 x}{x} + f(0) \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{\sin 2x}{2x} = 0 + 2f(0) = 2f(0) \end{aligned}$$

### 3.5.2 可导性证明与分段函数的导数

- (1) 利用函数  $f(x)$  在  $x = a$  处可导, 证明  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 f(a) - a^2 f(x)}{x - a} = 2af(a) - a^2 f'(a)$ ;
- (2) 设  $f(x) = x|\sin x|$ ,  $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , 求  $f''(x)$ ;

(1) 解:

(2) 解:

### 3.5.3 隐函数求导及其二阶导

(1)  $\sin y + xe^y = 0$ , 求  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

(1) 解:

### 3.5.4 参数方程和极坐标方程求导及其二阶导


(1)  $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3, \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ , 求  $\frac{dy}{dx}$ .

(2) 求双扭线  $\rho^2 = 2a^2 \cos 2\theta$  在  $\theta = \frac{\pi}{12}$  处的切线斜率.

(1) 解:

(2) 解:

### 3.5.5 带有极限的分段函数



在这部分, 需要利用指数函数的极限性质来求解问题。不难发现,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ 。

(1) 设  $f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} + (a-1)x^n - 1}{x^{2n} - ax^n - 1}$  ( $a \neq 0$ ):

- (i) 求  $f(x)$ ;
- (ii) 当  $x \geq 0$  时, 若  $f(x)$  在连续, 求  $a$  的值.
- (2) 设  $f(x) = \frac{x^2 e^{n(x+1)} + ax + b}{e^{n(x+1)} + 1}$ , 试确定  $a, b$  使得  $f(x)$  在处处可导, 并  $f'(x)$ .

(1) 解:

(2) 解:

## 4 微分中值定理与导数的应用

### 4.1 微分中值定理

#### 4.1.1 罗尔定理

若函数  $f(x)$  满足: 在  $[a, b]$  上连续; 在  $(a, b)$  内可导;  $f(a) = f(b)$ ; 则在  $(a, b)$  内至少存在一个  $\xi \in (a, b)$ , 使得  $f'(\xi) = 0$ .

#### 4.1.2 拉格朗日中值定理

如果函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 在开区间  $(a, b)$  内可导, 则至少存在一点  $\xi \in (a, b)$ , 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

#### 4.1.3 柯西中值定理

如果函数  $f(x)$  与  $g(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 在开区间  $(a, b)$  内可导, 并且在  $(a, b)$  内可  $g'(x) \neq 0$ , 则至少存在一点  $\xi \in (a, b)$ , 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

#### 4.1.4 微分中值定理证明题

(1) 设实数  $a_0, a_1, \dots, a_n$  满足  $a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{3} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$ , 证明: 方程  $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = 0$  在  $(0, 1)$  至少有一个实根.

(1) 解: 本题考察注意力。

注意到当我们设  $F(x) = a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$  时,  $F(1) = 0$ .

同时  $F'(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$  就是我们要证明的函数.

所以由罗尔定理, 对于  $[0, 1]$  连续,  $(0, 1)$  可导的  $F(x)$ , 有  $F(0) = F(1)$ , 则至少存在一

个  $\xi \in (0, 1)$  使得  $F'(\xi) = 0$ .

## 4.2 洛必达法则

洛必达法则用于求解不定式极限，主要适用于  $\frac{0}{0}$  和  $\frac{\infty}{\infty}$  两种类型的不定式。

**定理：** 设函数  $f(x)$  和  $g(x)$  在  $x = a$  的某邻域内可导，且  $g'(x) \neq 0$ ，如果

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

**例题：**

- 例1：求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 。

**解：** 直接应用洛必达法则：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \cos 0 = 1.$$

- 例2：求  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}$ 。

**解：** 直接应用洛必达法则：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty.$$

## 4.3 泰勒公式及其应用

### 4.3.1 泰勒公式

**定理1：**

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

其中  $R_n(x) = o((x-a)^n)$  称为皮亚诺余项。

**定理2：**

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

其中  $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$  称为拉格朗日型余项。

### 4.3.2 麦克劳林公式

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$

### 4.3.3 泰勒公式的应用