

---


# Sustaining HIV Care in Mexico During the COVID-19 Pandemic

## Polling Overview

Produced by Your Conference Live Platform

December 12, 2020, 12:40 AM ET

## Poll: Si usted trata casos de VIH, ¿cuántos pacientes atiende en una semana típica?



### Option

<10

10-25

26-50

51-100

>100

### Votes

3

1

3

3

1

### Percentage

27.3%

9.1%


27.3%

27.3%

9.1%

**Total 11**

## Poll: Si usted trata casos de COVID-19, ¿cuántos pacientes atiende en una semana típica?



### Option

<10

10-25

26-50

51-100

>100

### Votes

7

1

1

0

1

### Percentage

70.0%

10.0%


10.0%

0.0%

10.0%


**Total 10**

## Presurvey 1: ¿Cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 en el número de diagnósticos de VIH en México en 2020?



Option	Votes	Percentage
El acceso reducido a la PrEP ha aumentado los diagnósticos de VIH	0	0.0%
El incremento en las transmisiones verticales ha aumentado los diagnósticos de VIH	0	0.0%
La reducción de pruebas ha disminuido los diagnósticos de VIH	8	66.7%
La reducción de conductas de riesgo ha disminuido los diagnósticos de VIH	1	8.3%
Sin determinar	3	25.0%
Total 12		

## Assessment 1: ¿Cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 en el número de diagnósticos de VIH en México en 2020?



● La reducción de pruebas ha disminuido los diagnósticos de VIH

### Option

El acceso reducido a la PrEP ha aumentado los diagnósticos de VIH

### Votes

0

### Percentage

0.0%

El incremento en las transmisiones verticales ha aumentado los diagnósticos de VIH

0

0.0%

La reducción de pruebas ha disminuido los diagnósticos de VIH

9

100.0%

La reducción de conductas de riesgo ha disminuido los diagnósticos de VIH

0

0.0%

Sin determinar

0

0.0%

**Total 9**

## Presurvey 2: De acuerdo con las últimas indicaciones del secretario de Salud, ¿cuáles de los siguientes grupos deben retomar las pruebas de carga viral y conteo de células CD4+?



Option	Votes	Percentage
Todas las personas con VIH	10	83.3%
Solo las personas con VIH y virus indetectable	0	0.0%
Solo las personas con VIH y virus detectable	2	16.7%
Las personas que no tienen VIH	0	0.0%
Sin determinar	0	0.0%
Total 12		

**Assessment 2: De acuerdo con las últimas indicaciones del secretario de Salud, ¿cuáles de los siguientes grupos deben retomar las pruebas de carga viral y conteo de células CD4+?**



Option	Votes	Percentage
Todas las personas con VIH	11	91.7%
Solo las personas con VIH y virus indetectable	0	0.0%
Solo las personas con VIH y virus detectable	1	8.3%
Las personas que no tienen VIH	0	0.0%
Sin determinar	0	0.0%
Total 12		