
# Sustaining HIV Care in Mexico During the COVID-19 Pandemic

#### **Polling Overview**


Produced by Your Conference Live Platform December 10, 2020, 4:33 AM ET

### Poll: Si usted trata casos de VIH, ¿cuántos pacientes atiende en una semana típica?




Option <10	Votes 3	Percentage 27.3%
10-25	1	9.1%
26-50	3	27.3%
51-100	3	27.3%
>100	1	9.1%
	Total 11	

#### Poll: Si usted trata casos de COVID-19, ¿cuántos pacientes atiende en una semana típica?



Option <10	Votes 7	Percentage 70.0%
10-25	1	10.0%
26-50	1	10.0%
51-100	0	0.0%
>100	1	10.0%
	Total 10	

#### Survey 1: ¿Cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 en el número de diagnósticos de VIH en México en 2020?




Option	Votes	Percentage
El acceso reducido a la PrEP ha aumentado los diagnósticos de VIH	0	0.0%
El incremento en las transmisiones verticales ha aumentado los diagnósticos de VIH	0	0.0%
La reducción de pruebas ha disminuido los diagnósticos de VIH	8	66.7%
La reducción de conductas de riesgo ha disminuido los diagnósticos de VIH	1	8.3%
Sin determinar	3	25.0%
	Total 12	

#### Survey 1: ¿Cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 en el número de diagnósticos de VIH en México en 2020?



Option	Votes	Percentage
El acceso reducido a la PrEP ha aumentado los diagnósticos de VIH	0	0.0%
El incremento en las transmisiones verticales ha aumentado los diagnósticos de VIH	0	0.0%
La reducción de pruebas ha disminuido los diagnósticos de VIH	9	100.0%
La reducción de conductas de riesgo ha disminuido los diagnósticos de VIH	0	0.0%
Sin determinar	0	0.0%
	Total 9	

### Survey 2: De acuerdo con las últimas indicaciones del secretario de Salud, ¿cuáles de los siguientes grupos deben retomar las pruebas de carga viral y conteo de células CD4+?



Option Todas las personas con VIH	<b>Votes</b> 10	Percentage 83.3%
Solo las personas con VIH y virus indetectable	0	0.0%
Solo las personas con VIH y virus detectable	2	16.7%
Las personas que no tienen VIH	0	0.0%
Sin determinar	0	0.0%
	Total 12	

## Survey 2: De acuerdo con las últimas indicaciones del secretario de Salud, ¿cuáles de los siguientes grupos deben retomar las pruebas de carga viral y conteo de células CD4+?



Option Todas las personas con VIH	<b>Votes</b> 11	Percentage 91.7%
Solo las personas con VIH y virus indetectable	0	0.0%
Solo las personas con VIH y virus detectable	1	8.3%
Las personas que no tienen VIH	0	0.0%
Sin determinar	0	0.0%
	Total 12	