

一、填空题：（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x^2} = \underline{\quad 0 \quad}.$

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} + 1, & x > 0 \\ a + x^2, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 连续，则 $a = \underline{\quad 1 \quad}.$

3. 曲线 $y = \frac{1}{x+1} e^{-x^2}$ 的铅直渐近线为 $\underline{\quad x = -1 \quad}.$

4. 设 $f'(1) = -1$ ，则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - f(1)}{h} = \underline{\quad 2 \quad}.$

5. 设 $y = \int_0^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt$ ，则 $dy = \underline{\quad \frac{2 \sin x^2}{x} dx \quad}.$

6. 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 过对应于 $t = \frac{\pi}{6}$ 的点 P 的法线方程为 $\underline{\quad y = \sqrt{3}x - 1 \quad}.$

7. 设 $y = f(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - \sin x + 6y = 0$ 确定，则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\quad \frac{1}{6} \quad}.$

8. 曲线 $y = \ln(1+x^2)$ 在区间 $\underline{\quad [-1, 1] \quad}$ 上是凹的.

9. $\int_{-1}^1 \frac{1+x^3}{1+x^2} dx = \underline{\quad \frac{\pi}{2} \quad}.$

10. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \underline{\quad 1 \quad}.$

二、计算题：（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

11. 设 $f(x) = \frac{3x+1}{e^x}$ ，求 (1) $f'(x), f''(x)$ ；(2) $f(x)$ 带皮亚诺余项的 3 阶麦克劳林公式；(3) $f^{(2021)}(0)$.

解：(1) $f'(x) = 3e^{-x} - (3x+1)e^{-x},$

$$f''(x) = -6e^{-x} + (3x+1)e^{-x}.$$

(2) $f'''(x) = 9e^{-x} - (3x+1)e^{-x}, \quad f(0) = 1, f'(0) = 2, f''(0) = -5, f'''(0) = 8,$

资料由公众号【工大喵】收集整理并免费分享

$$\begin{aligned}
 f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + o(x^3) \\
 &= 1 + 2x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3),
 \end{aligned}$$

$$(3) \quad f^{(4)}(x) = -12e^{-x} + (3x+1)e^{-x}, \quad \dots, f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1}3ne^{-x} + (-1)^n(3x+1)e^{-x},$$

$$\text{故 } f^{(2021)}(0) = 6062.$$

12. 计算不定积分 $\int x \arctan \sqrt{x} dx$.

解: 令 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2, dx = 2t dt$,

$$\begin{aligned}
 \text{则 } \int x \arctan \sqrt{x} dx &= 2 \int t^3 \arctan t dt \\
 &= \frac{1}{2} \int \arctan t dt^4 \\
 &= \frac{1}{2} t^4 \arctan t - \frac{1}{2} \int \frac{t^4}{1+t^2} dt \\
 &= \frac{1}{2} t^4 \arctan t - \frac{1}{2} \int \frac{t^4 - 1 + 1}{1+t^2} dt \\
 &= \frac{1}{2} t^4 \arctan t - \frac{1}{2} \int (t^2 - 1) dt - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+t^2} dt \\
 &= \frac{1}{2} t^4 \arctan t - \frac{1}{6} t^3 + \frac{1}{2} t - \frac{1}{2} \arctan t + C \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \arctan \sqrt{x} - \frac{1}{6} x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \arctan \sqrt{x} + C
 \end{aligned}$$

13. 计算 $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{(x+1)^3}} dx$.

解: 令 $\sqrt{x+1} = t$, 则 $x = t^2 - 1, dx = 2t dt$, $x=0, t=1; x=2, t=\sqrt{3}$,

$$\begin{aligned}
 \text{则 } \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{(x+1)^3}} dx &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2t}{t+t^3} dt = 2 \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+t^2} dt \\
 &= 2 \arctan t \Big|_1^{\sqrt{3}}
 \end{aligned}$$

资料由公众号【工大喵】收集整理并免费分享

$$= \frac{\pi}{6}$$

14. 求函数 $f(x) = x^2 \ln x$ 的极值.

解: 定义域 $x \in (0, +\infty)$,

$$f'(x) = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1),$$

$$\text{令 } f'(x) = 0, \text{ 得 } x = 0 \text{ (舍) 或 } x = \frac{1}{\sqrt{e}},$$

$$\text{当 } x \in (0, \frac{1}{\sqrt{e}}) \text{ 时, } f'(x) < 0; \text{ 当 } x \in (\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty) \text{ 时, } f'(x) > 0;$$

$$\text{所以在 } x = \frac{1}{\sqrt{e}} \text{ 取得极小值, 极小值 } f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{1}{2e}.$$

15. 记曲线段 $x^2 + y^2 = 4 (y \geq 0, 0 \leq x \leq 1)$ 与直线 $x = 0, x = 1$ 及 x 轴所围的图形为 D ,

(1) 求平面图形 D 的面积;

(2) 求图形 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

$$\text{解: (1) } S = \int_0^1 \sqrt{4-x^2} dx, \text{ 令 } x = 2 \sin t, \text{ 则 } dx = 2 \cos t dt,$$

$$\text{故平面图形 } D \text{ 的面积 } S = 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 + \cos 2t) dt = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$(2) \text{ 圆柱体积 } V_1 = \sqrt{3}\pi,$$

$$\text{剩余旋转体体积 } V_2 = \pi \int_{\sqrt{3}}^2 \left(\sqrt{4-y^2} \right)^2 dy = 4\pi y \Big|_{\sqrt{3}}^2 - \frac{\pi}{3} y^3 \Big|_{\sqrt{3}}^2 = \frac{16}{3}\pi - 3\sqrt{3}\pi,$$

$$\text{图形 } D \text{ 绕 } y \text{ 轴旋转一周所得旋转体的体积 } V = \frac{16}{3}\pi - 2\sqrt{3}\pi.$$

$$16. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{2}, & x \leq 0 \\ 0, & 0 < x \leq e \\ \frac{A}{x(2\ln x + \ln^2 x)}, & x > e \end{cases}$$

(1) 求函数 $\int_{-\infty}^x f(t)dt$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的表达式;

(2) 设 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = A$, 试确定 A 的值.

解: (1) $x \leq 0$ 时, $\int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^x \frac{e^t}{2} dt = \frac{e^t}{2} \Big|_{-\infty}^x = \frac{e^x}{2},$

$0 < x \leq e$ 时, $\int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 \frac{e^t}{2} dt + \int_0^x 0 dt = \frac{e^t}{2} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{1}{2},$

$x > e$ 时, $\int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 \frac{e^t}{2} dt + \int_0^e 0 dt + \int_e^x \frac{A}{t(2\ln t + \ln^2 t)} dt = \frac{1}{2} + \frac{A}{2} \ln \left(\frac{\ln t}{2 + \ln t} \right) \Big|_e^x$

$$= \frac{1}{2} + \frac{A}{2} \ln \left(\frac{\ln x}{2 + \ln x} \right) - \frac{A}{2} \ln \frac{1}{3}.$$

(2) $A = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^x f(t)dt$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{A}{2} \ln \left(\frac{\ln x}{2 + \ln x} \right) - \frac{A}{2} \ln \frac{1}{3} \right)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{A}{2} \ln \frac{1}{3},$$

故 $A = \frac{1}{2 - \ln 3}.$

三、证明题: (本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

17. 当 $x > 4$ 时, 证明: $2^x > x^2$.

证明一: 设 $f(x) = 2^x - x^2$, 公众号【工大喵】收集整理并免费分享

则 $f'(x) = 2^x \ln 2 - 2x$, $f''(x) = 2^x (\ln 2)^2 - 2$, $f'''(x) = 2^x (\ln 2)^3 > 0$,

故当 $x > 4$ 时 $f''(x)$ 单调增加, 即 $f''(x) > f''(4) = 2^4 (\ln 2)^2 - 2 > 0$,

当 $x > 4$ 时 $f'(x)$ 单调增加, 即 $f'(x) > f'(4) = 2^4 \ln 2 - 8 > 0$,

当 $x > 4$ 时 $f(x)$ 单调增加, 即 $f(x) > f(4) = 2^4 - 4^2 = 0$,

即有 $2^x > x^2$.

证明二: 设 $f(x) = x^2 \cdot 2^{-x}$,

则 $f'(x) = 2x \cdot 2^{-x} - \ln 2 \cdot x^2 \cdot 2^{-x} = 2^{-x} \cdot x(2 - x \ln 2)$,

当 $x > 4$ 时 $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 单调减少, 有 $f(x) < f(4) = 1$, 即有 $2^x > x^2$.

18. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = -f(1) = 1$,

证明: 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $\xi f'(\xi) + 3f(\xi) = 0$.

证明: 令 $F(x) = x^3 f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导,

因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = -f(1) = 1$,

由零点定理, $\exists \eta \in (0,1)$, 使得 $f(\eta) = 0$,

所以 $F(0) = F(\eta) = 0$,

由罗尔定理 $\exists \xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$, 即 $\xi f'(\xi) + 3f(\xi) = 0$.