

## 题一. 求极限

1.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(x^2 + e^{y^2})}{x^2 + y^2}$ ; (极限为 1)
2.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x - y) \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ ; (极限为 0)
3.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$ ; (极限不存在)
4.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|x||y|^p}}{\sqrt{|x| + |y|}}$ , 其中  $p > 1$ . (极限为 0)
5.  $\lim_{x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty} (x^2 + y^4) e^{-(x+y)}$ ; (极限为 0)
6.  $\lim_{x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty} \left( \frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{y^2}$ . (极限为 0)

注记: 求极限一般原则(以二元函数为例)

(i) 在考察极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$  是否存在时, 如果观察到动点  $(x, y)$  沿不同的路径, 例如沿不同射线, 趋向于  $(x_0, y_0)$  时, 趋向于不同的值, 则可断言极限不存在. 例如上述极限3.

(ii) 当所考虑极限存在时, 常常可以利用一元函数求极限的模式求极限. 例如上述第极限1,2,5. 应牢记一元函数的若干极限公式(模式). 例如

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

(iii) 适当放大或缩小, 然后观察是否存在极限. 例如上述极限4,5.

(iv) 给出必要的计算过程.

题二. 假设二元函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处的重极限以及两个累次极限均存在, 证明这三个极限相等. (课本习题1.3题4(2)).

题三. 设  $f(x, y) = |x - y|\phi(x, y)$ , 其中  $\phi(x, y)$  在原点  $(0, 0)$  处连续. 考虑函数  $f(x, y)$  在原点  $(0, 0)$  处的可微性 (课本习题1.4题1(4)).

注: 研究二元函数  $f(x, y)$  的可微性之一般准则:

(i) 若两个偏导数  $f_x(x_0, y_0)$  和  $f_y(x_0, y_0)$  的其中之一不存在, 则可断言函数  $f$  在点  $(x_0, y_0)$  处不可微.

(ii) 当两个偏导数  $f_x(x_0, y_0)$  和  $f_y(x_0, y_0)$  均存在时, 分别记作  $a, b$ , 若以下极限式

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - a\Delta x - b\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0,$$

不成立, 则可断言函数在点  $(x_0, y_0)$  处不可微.

题四. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x - \sin x}{|x| + 2|y|}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证明  $f(x, y)$  在原点  $(0, 0)$  处可微, 并求微分  $df(0, 0)$ .

题五. 设  $A \subset \mathbb{R}^n$  为平面点集. 定义平面上的点  $z_0 = (x_0, y_0)$  到点集  $A$  的距离为  $\rho(z_0, A) \triangleq \inf\{\|z - z_0\|, z \in A\}$ , 这里  $\|z - z_0\| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ ,  $z = (x, y)$ . 证明

(i) 对于任意两点  $z, w \in \mathbb{R}^2$ , 成立  $|\rho(z, A) - \rho(w, A)| \leq \|z - w\|$ ;

(ii) 点集  $A$  的闭包可以表示为  $\bar{A} = \{z \in \mathbb{R}^2, \rho(z, A) = 0\}$ .

注：根据结论(i)可知，对于给定的平面点集  $A$ ，距离  $\rho(z, A)$  作为定义在整个  $\mathbb{R}^2$  上的函数处处连续. 参见课本第一章总复习题第6题(第96页).

题六. 设  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  为  $n$  元函数. 证明函数  $f$  在  $\mathbb{R}^n$  上处处连续, 当且仅当对  $\mathbb{R}$  中的任何开集  $G \subset \mathbb{R}$  的原象  $f^{-1}(G) \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n, f(x) \in G\}$  是  $\mathbb{R}^n$  中的开集. (注: 这是第1章总复习题第4题 page 96.)

题七. 设二元函数  $f(x, y)$  在全平面  $\mathbb{R}^2$  上处处连续且满足条件  $\lim_{x^2+y^2 \rightarrow +\infty} f(x, y) = +\infty$ . 证明函数  $f(x, y)$  在全平面  $\mathbb{R}^2$  上可取得最小值, 即存在点  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^n$ , 使得

$$f(x_0, y_0) \leq f(x, y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(注: 这是课本习题1.3第8题 page 24).

题八: 假设二元函数  $f(x, y)$  在平面开区域  $D \subset \mathbb{R}^2$  上的两个偏导数恒为零. 证明函数  $f(x, y)$  在开区域  $D$  上为常数.

注1: 熟知, 若开区间上一元函数的导数恒为零, 则这个函数为常数函数. 题七的结论是这个一元情形的结论对于二元情形的推广. 显然这个结论可以推广到一般  $n$  元情形, 即若一个  $n$  元函数的  $n$  个偏导数均恒为零, 则函数必为常数函数. 证明方法同如下二元情形的证明方法.

注2: 设二元函数  $f(x, y)$  在平面开区域  $D \subset \mathbb{R}^2$  上连续可微. 若它的一个偏导数, 比如说  $f_y(x, y)$  恒为零, 则当  $D$  为凸域时(区域称为凸的, 如果区域中的任何两点之间的线段均包含在  $D$  中), 函数  $f(x, y)$  与变量  $y$  无关. 但当区域  $D$  非凸时, 函数  $f(x, y)$  仍可能与变量  $y$  有关. 例如设  $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y), x \geq 0, y = 0\}$ . 易见  $D$  非凸. 令

$$f(x, y) = \begin{cases} x^3, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

显然  $f_y(x, y) = 0, \forall (x, y) \in D$ . 但函数  $f(x, y)$  的值变量  $y$  有关. 例如  $f(1, 1) = 1$ , 而  $f(1, -1) = 0$ .

题九. 考虑偏微分方程的初值问题  $z_t = az_x + bz_y$ ,  $z(x, y, 0) = z_0(x, y)$ , 其中  $a, b$  均为常数,  $z_0(x, y)$  为全平面  $\mathbb{R}^2$  上的连续可微函数. 证明这个初值问题有唯一解, 且这个唯一解可表示为  $z(x, y, t) = z_0(x + at, y + bt)$ ,  $\forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^3$ . (这是第一章总复习题第11题 page 96. 方程  $z_t = az_x + bz_y$  称为运输方程.)

注: 三元函数  $z(x, y, t)$  称为上述初值问题的解是指, 函数  $z(x, y, t)$  在  $\mathbb{R}^3$  上连续可微, 且满足方程  $z_t = az_x + bz_y$ , 即如下恒等式成立,

$$z_t(x, y, t) \equiv az_x(x, y, t) + bz_y(x, y, t), \quad \forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^3.$$

此外还满足初值条件, 即

$$z(x, y, 0) \equiv z_0(x, y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$