$$e^{2\pi i\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$

$$f(x) = a_0 + \sum_n a_n \cos\frac{n\pi x}{L} + \sum_n b_n \sin\frac{n\pi x}{L}$$

$$\int \delta(\mathbf{r}-\mathbf{a})\, d\mathbf{r} = 1$$

$$\delta(x) = \lim_{a\to\infty} \frac{a}{\sqrt{\pi}}\, e^{-a^2 x^2}$$

$$= a_0 + \sum_n a_n \cos\frac{n\pi x}{L} + \sum_n b_n \sin\frac{n\pi x}{L}$$

$$f(x) = \sum_n A_n\, e^{\pi i n x/L}$$

$$\int \delta(\mathbf{r}-\mathbf{a})\, d\mathbf{r} = 1$$

$$\Pi(x) = H(x+\tfrac{1}{2}) - H(x-\tfrac{1}{2})$$

$$f(\mathbf{r}) \leftrightarrow F(\mathbf{k})$$

$$f(x) = \sum_n A_n\, e^{\pi i n x/L}$$

$$f(\mathbf{r}) \leftrightarrow F(\mathbf{k})$$

$$\delta(x) = \lim_{a\to\infty} \frac{a}{\sqrt{\pi}}\, e^{-a^2 x^2}$$

$$A_n = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{+L} f(x)\, e^{-\pi i n x/L}\, dx$$

$$A_n = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{+L} f(x)\, e^{-\pi i n x/L}\, dx$$

$$e^{2\pi i\,\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$

$$\Pi(x) = H(x+\tfrac{1}{2}) -$$