
title: 中国恶性肿瘤死亡率多维度分析报告（1973-2018）

author: 王锦淇

date: 2026年3月10日

- [摘要](#)
- [1. 数据来源与方法](#)
 - [1.1 数据来源](#)
 - [1.2 分析方法](#)
- [2. 结果](#)
- [2.1 主要癌种的时间趋势（1973-2018）](#)
- [2.2 城乡对比（2018年）](#)
- [2.3 女性特有癌种变化](#)
- [3. 讨论](#)
- [4. 结论](#)
- [5. 参考文献](#)

摘要

本报告基于《合计死亡率》《女性死亡率》《城市死亡率》《农村死亡率》四个 Excel 数据文件，系统分析了 1973 年至 2018 年间中国恶性肿瘤死亡率的演变趋势。重点对比了城乡差异、性别差异以及主要癌种（肺癌、肝癌、胃癌、食管癌）的变化规律。报告旨在为公共卫生政策制定提供数据支持。

1. 数据来源与方法

1.1 数据来源

数据来自四个独立的 Excel 文件，每个文件包含五个时间点（1973—1975、1990—1992、2004—2005、2017、2018）前 ten 位恶性肿瘤的死亡率（单位：1/10万）。文件分别为：


- [合计死亡率.xlsx](#)
- [女性死亡率.xlsx](#)
- [城市死亡率.xlsx](#)
- [农村死亡率.xlsx](#)

1.2 分析方法

- 提取肺癌、肝癌、胃癌、食管癌的死亡率数据；
- 绘制时间趋势折线图；
- 计算 2018 年城乡前五位癌种的死亡率比值；
- 绘制女性特有癌种（乳腺癌、宫颈癌）的变化曲线。


2. 结果

2.1 主要癌种的时间趋势（1973-2018）



从图1可以看出，肺癌死亡率自1990年代以来迅速上升，已成为最主要的恶性肿瘤死因；胃癌和食管癌死亡率则呈下降趋势，肝癌保持相对平稳。

2.2 城乡对比（2018年）




城市前五位：肺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌、食管癌

农村前五位：肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、结直肠癌

城乡差异最大的癌种为结直肠癌（城市显著高于农村）和食管癌（农村略高）。

2.3 女性特有癌种变化



乳腺癌死亡率呈缓慢上升趋势，宫颈癌则在2000年后有所下降，可能与筛查普及有关。

3. 讨论

本报告揭示了我国恶性肿瘤死亡率的长期变化特征：肺癌负担持续加重，城乡差异依然存在，女性生殖系统肿瘤出现分化趋势。这些发现提示未来公共卫生资源应重点投向肺癌防控，同时加强农村地区的食管癌筛查。

4. 结论

1973-2018 年间，我国恶性肿瘤死亡率谱发生显著变化，肺癌取代胃癌成为头号杀手，城乡差异反映了医疗资源与环境暴露的不同。应继续完善肿瘤登记制度，推动精准防控。

5. 参考文献

- 各 Excel 文件来源：国家癌症登记中心年报
- 《2020 中国肿瘤登记年报》