

云南大学 2017 秋季学期物理与天文学院物理系

2016 级《概率论与数理统计》考试题 B 卷参考答案

一、 填空题(每空 2 分,共 20 分)

1、  $\frac{3}{5}$       2、  $\frac{1}{3}$       3、  $N(0,13)$       4、  $\rho=0$       5、  $N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

6、  $\frac{4}{5}$       7、  $\frac{2}{3}$       8、  $\chi^2(1)$       9、 10      10、 36

二、 选择题(每题 2 分,共 20 分)

1、 ②    2、 ①    3、 ③    4、 ③    5、 ①

6、 ④    7、 ①    8、 ②    9、 ④    10、 ④

三、 证明：①  $(X, Y)$  关于  $X, Y$  的边缘概率密度为：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \underline{(1 \text{ 分})}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{\pi} dx = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} & -1 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \underline{(1 \text{ 分})}$$

$$\therefore f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} & -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \neq f(x, y) \quad \underline{(3 \text{ 分})}$$

$\therefore X, Y$  不相互独立。

② 又  $\therefore E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx = \int_{-1}^1 \frac{2}{\pi} x\sqrt{1-x^2} dx = 0 \quad \underline{(1 \text{ 分})}$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y)dy = \int_{-1}^1 \frac{2}{\pi} y\sqrt{1-y^2} dy = 0 \quad \underline{(1 \text{ 分})}$$

$$E(XY) = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} xyf(x, y)dxdy = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \cos \theta \times r \sin \theta dr = 0 \quad \underline{(1 \text{ 分})}$$

$$\therefore \rho_{XY} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = 0 \quad [ \text{注： } D(X) \text{ 和 } D(Y) \text{ 均不为 } 0 ]$$

$\therefore X, Y$  不相关。

(2

分)

四、解：令事件  $A$  表示系统可靠性，则： $A = (A_1 A_2 \dots A_n) \cup (B_1 B_2 \dots B_n)$

(2 分) 因  $A_i, B_i (i = 1, 2, \dots, n)$  相互独立，且  $P(A_i) = P(B_i) = r$  故所求概率为：

$$P(A) = P((A_1 A_2 \dots A_n) \cup (B_1 B_2 \dots B_n)) \quad \underline{(2 \text{ 分})}$$

$$= P(A_1 A_2 \dots A_n) + P(B_1 B_2 \dots B_n) - P(A_1 A_2 \dots A_n B_1 B_2 \dots B_n) \quad \underline{(2 \text{ 分})}$$

$$= r^n (2 - r^n) \quad \underline{(4 \text{ 分})}$$

五、(1) 由  $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$  有  $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} A \exp[-(2x + y)] dx dy = 1$

得  $A = 2 \quad \underline{(4 \text{ 分})}$

(2) 满足条件  $Y \leq X$  在  $xOy$  平面上为平面上直线  $y = x$  及其下方的区域  $G$

故  $P(Y \leq X) = P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$

$$= \int_0^{\infty} \int_y^{\infty} 2 \exp[-(2x + y)] dx dy$$

$$= \frac{1}{3} \quad \underline{(6 \text{ 分})}$$

六、 $\because X_i \sim N(20, 3) \quad (i = 1, 2, \dots, 10) \quad Y_j \sim N(20, 3) \quad (j = 1, 2, \dots, 15)$

$$\therefore \bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i \sim N(20, \frac{3}{10}) \quad \underline{(1 \text{ 分})} \quad \bar{Y} = \frac{1}{15} \sum_{j=1}^{15} Y_j \sim N(20, \frac{3}{15}) \quad \underline{(1$$

分)

$$\therefore \bar{X} - \bar{Y} \sim N(0, \frac{1}{2}) \quad \text{或} \quad \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \sim N(0, 1) \quad \underline{(2 \text{ 分})} \quad \text{所求概}$$

率为：

$$P\{|\bar{X} - \bar{Y}| < 0.3\} = P\{-0.3 < \bar{X} - \bar{Y} < 0.3\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= P\left\{-0.3\sqrt{2} < \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} < 0.3\sqrt{2}\right\} = \Phi(0.3\sqrt{2}) - \Phi(-0.3\sqrt{2})$$

$$= 2\Phi(0.3\sqrt{2}) - 1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 0.3256 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{或: } P\{|\bar{X} - \bar{Y}| < 0.3\} = 1 - [P\{|\bar{X} - \bar{Y}| > 0.3\}] \quad (2$$

分)

$$= 1 - [P\{\bar{X} - \bar{Y} > 0.3\} + P\{\bar{X} - \bar{Y} < -0.3\}] \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 1 - 2(1 - \Phi(0.4242)) = 0.3256 \quad (2 \text{ 分})$$

七、总体  $X$  的一阶、二阶矩为：

$$\mu_1 = E(X) = \frac{a+b}{2}$$

①

$$\mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \frac{(b-a)^2}{12} + \frac{(a+b)^2}{4} \quad ②$$

$$\text{由 ①、② 联立求得 } a = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)} \quad b = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}$$

由于总体的  $k$  阶矩  $\mu_k = E(X^k)$  与样本的  $k$  阶矩  $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$  的关系为

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} \mu_k \quad k = 1, 2, \dots$$

$\therefore$  分别以样本的一阶、二阶矩  $A_1, A_2$  代替总体的一阶、二阶矩  $\mu_1, \mu_2$ ,

得未知参数  $a$  和  $b$  的矩估计量为：

$$\hat{a} = A_1 - \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\hat{b} = A_1 + \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

即未知参数  $a$  和  $b$  的矩估计量为:

$$\hat{a} = \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\hat{b} = \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

八、 $\because \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

$$\therefore \int_0^1 (ax^2 + bx + c) dx = 1 \quad \text{即: } \frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b + c = 1 \quad \text{①} \quad (2$$

分)

$$\text{由 } E(X) = \frac{1}{2} \quad \text{得: } \int_0^1 x(ax^2 + bx + c) dx = \frac{1}{2}$$

$$\text{即: } \frac{1}{4}a + \frac{1}{3}b + \frac{1}{2}c = \frac{1}{2} \quad \text{②}$$

(2 分)

$$\text{由 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{20} \quad \text{得} \quad \int_0^1 x^2(ax^2 + bx + c) dx = \frac{2}{5}$$

$$\text{即: } \frac{1}{5}a + \frac{1}{4}b + \frac{1}{3}c = \frac{2}{5} \quad \text{③}$$

(2 分)

$$\text{联立①、②、③求解得: } a = 12, b = -12, c = 3 \quad (4 \text{ 分})$$