

Monograf **EFEKTIVITAS PRENATAL YOGA TERHADAP NYERI PUNGGUNG PADA IBU HAMIL TRIMESTER III**

Sri Ilawati
Novi Susanti
Namiroh Falah Hasibuan



Buku Monograf
EFEKTIVITAS PRENATAL YOGA
TERHADAP NYERI PUNGGUNG
PADA IBU HAMIL TRIMESTER III

Sri Ilawati., SST., M.Kes.
Novi Susanti., SST., M.Kes.
Namiroh Falah Hasibuan, S.Tr.Keb., MKM.



Buku Monograf
EFEKTIVITAS PRENATAL YOGA
TERHADAP NYERI PUNGGUNG PADA IBU HAMIL
TRIMESTER III

Sri Ilawati., SST., M.Kes.
Novi Susanti., SST., M.Kes.
Namiroh Falah Hasibuan, S.Tr.Keb., MKM.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-623-89972-4-4
Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal
Tiktok @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



Prakata

Buku ini membahas tentang prenatal yoga terhadap nyeri punggung pada ibu hamil trimester III. Nyeri punggung pada ibu hamil dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perubahan postur tubuh, hal ini sejalan dengan bertambahnya berat badan secara bertahap selama proses kehamilan dan retribusi ligamen, pusat gravitasi tubuh bergeser kedepan dan jika dikombinasikan dengan peregangan otot abdomen yang lemah, hal ini sering mengakibatkan lekukan pada bahu, ada kecenderungan otot punggung untuk memendek dan memicu ketegangan yang dapat dirasakan diatas ligament.

Olahraga ringan mampu mengurangi rasa ketidaknyamanan yang dirasakan ibu saat proses kehamilan salah satunya yaitu prenatal yoga.

Buku ini bermanfaat untuk terapi yoga terhadap nyeri punggung pada ibu hamil trimester III Yang dimana prenatal yoga sangat berpengaruh dalam menurunkan rasa nyeri punggung pada ibu hamil khususnya di trimester III.

April, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v

BAB 1 Pendahuluan.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 Kehamilan	5
------------------------------	----------

A. Konsep Dasar Kehamilan	5
B. Tanda dan Gejala Kehamilan	6
C. Perubahan Anatomis dan Fisiologis Kehamilan	10
D. Trimester I (Periode Penyesuaian Terhadap Kehamilan).....	13
E. Trimester II (Periode sehat)	14
F. Trimester III	14
G. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil.....	15
H. Ketidaknyamanan selama Kehamilan Trimester III	17


BAB 3 Prenatal Yoga	23
----------------------------------	-----------

A. Pengertian Prenatal Yoga	23
B. Manfaat Prenatal Yoga bagi Ibu Hamil	29
C. Manfaat Prenatal Yoga Bagi Janin	34
D. Indikasi Prenatal Yoga.....	35
E. Prosedur Pelaksanaan Prenatal Yoga.....	37
F. Gerakan Prenatal Yoga	39

BAB 4 Efektivitas Prenatal Yoga Terhadap Nyeri Punggung pada Ibu Hamil Trimester III	50
---	-----------

A. Konsep Nyeri	50
B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Nyeri.....	53
C. Pengukuran Skala Nyeri	54
D. Nyeri Punggung pada Ibu Hamil Trimester III	55

E. Etiologi Nyeri Punggung pada Kehamilan	59
F. Mekanisme Terjadinya Nyeri Punggung pada Kehamilan	61
G. Manajemen Nyeri Punggung pada Kehamilan	64
H. Pengaruh Prenatal Yoga terhadap Nyeri Punggung	67
BAB 5 Penutup.....	69
Daftar Pustaka	72
Glosarium	75
Profil Penulis.....	77



BAB 1

Pendahuluan

Kehamilan merupakan proses alami dan normal. Selama hamil seorang ibu mengalami perubahan-perubahan fisik yang terjadi maupun psikologis. Perubahan tersebut menyebabkan ibu hamil mengalami ketidaknyamanan (Manuaba, 2010). Prenatal Yoga merupakan olahraga yang sangat aman juga efektif untuk membantu ibu hamil mengurangi nyeri punggung bawah. Nyeri punggung disebabkan karena bertambahnya berat badan ibu hamil, dan ketidakstabilan sendi-sendi yang diakibatkan melenturnya ligament-ligament, gangguan kurva spinlis, dan meregangnya otot abdomen. (Jiang *et al*, 2015).

Yoga juga meningkatkan kekuatan otot khususnya sangat bermanfaat dalam mencegah *back pain*. Latihan yoga dalam penelitian ini tidak hanya menguatkan kelompok otot-otot

bahu, belakang dan kaki, tetapi juga membantu memperoleh posisi tubuh yang benar, dimana hal tersebut dapat mengurangi nyeri punggung pada wanita hamil. (Rafika, 2018). Senam yoga merupakan upaya praktis dalam menyelaraskan tubuh, pikiran dan jiwa yang mana manfaat yoga membentuk postur tubuh yang tegap, serta membina otot yang lentur dan kuat, memurnikan saraf pusat yang terdapat pada di tulang punggung. Senam yoga yang dilakukan dapat mengurangi keluhan yang dirasakan ibu hamil trimester III salah satunya yaitu nyeri punggung. (Devi, 2014).


Nyeri punggung saat hamil biasanya terjadi karena adanya peregangan tulang-tulang. Apabila nyeri punggung ini tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kualitas hidup ibu hamil menjadi buruk. Masalah ini akan berlanjut dalam bentuk cedera kambuhan atau muncul terus menerus dalam kondisi lebih buruk sesuai dengan perjalanan usia kehamilannya. Upaya untuk mengatasi keluhan nyeri punggung yaitu dengan terapi farmakologis dan terapi non farmakologis. Senam yoga merupakan bagian dari terapi non farmakologis yang dapat menurunkan nyeri. (Kantonis, 2011)

Setiap tahunnya di dunia Penyakit nyeri punggung bawah sangat bervariasi dengan angka mencapai 15 – 45 %. Menurut WHO *World Health Organization* dalam (Anggraika *et al*, 2019) bahwa 33% penduduk di Negara berkembang mengalami nyeri persisten. Di Inggris sekitar 17,3 juta orang pernah mengalami nyeri punggung dan dari jumlah tersebut sekitar 1,1 juta orang mengalami lumpuh yang diakibatkan dari nyeri punggung tersebut. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (2018), prevalensi penyakit muskuloskeletal di Indonesia yang pernah di diagnosisi oleh tenaga kesehatan yaitu 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau gejala yaitu 24,7%. Jumlah penderita nyeri punggung bawah di Indonesia tidak diketahui pasti, namun diperkirakan antara 7,6% sampai 37%.

Sementara itu, berdasarkan laporan Profil Data Kesehatan Indonesia tahun 2016, terdapat 5.354.594 orang ibu hamil di Indonesia, di wilayah Provinsi Sumatra Utara jumlahnya 343.978 orang. Untuk wilayah kota Medan terdapat 53.734 orang ibu hamil. Hasil dari penelitian pada ibu hamil di berbagai daerah Indonesia mencapai 60-80% orang

mengalami back pain (nyeri punggung) pada kehamilannya. (Apriliyanti, 2015)

Hasil yang telah dilakukan Lina Fitriani (2018) di Puskesmas Pekkabata Polewali Mandar pada bulan Januari-Desember 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan yoga hamil artinya ada hubungan yang bermakna antara ibu hamil yang melakukan yoga hamil dengan penurunan nyeri punggung.



BAB 2

Kehamilan

A. Konsep Dasar Kehamilan

Ibu hamil adalah seorang wanita yang sedang mengandung yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kehamilan adalah waktu transisi, yaitu masa antara kehidupan sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam kandungan dan kehidupan nanti setelah anak itu lahir (Ratnawati, 2020).

Kehamilan merupakan penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Maka, dapat disimpulkan bahwa kehamilan merupakan bertemunya sel telur dan sperma di dalam atau diluar Rahim dan berakhir dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir (Yulaikhah, 2019)

Kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah dan fisiologis. Setiap perempuan yang memiliki organ reproduksi yang sehat, telah mengalami menstruasi, dan melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang sehat maka besar kemungkinan akan terjadi kehamilan. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya bayi dengan lama 280 hari atau 40 minggu yang dihitung dari hari pertama haid terakhir. (Amriani, 2021)

B. Tanda dan Gejala Kehamilan

Tanda dan Gejala Kehamilan diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Tanda dan gejala kehamilan pasti

Tanda dan gejala kehamilan pasti, antara lain:

a. Ibu merasakan gerakan kuat bayi di dalam perutnya.

Sebagian besar ibu mulai merasakan tendangan bayi pada usia kehamilan lima bulan.

b. Bayi dapat dirasakan di dalam Rahim. Semenjak umur kehamilan 6 atau 7 bulan.

c. Denyut jantung bayi dapat terdengar. Saat usia kehamilan menginjak bulan ke-5 atau ke-6 denyut jantung bayi terkadang dapat didengar menggunakan

instrument yang dibuat untuk mendengarkan, seperti stetoskop atau fetoskop.

- d. Tes kehamilan medis menunjukkan bahwa ibu hamil. Tes ini dilakukan dengan perangkat tes kehamilan di rumah atau di laboratorium dengan urine atau darah ibu. (Sutanto & Fitriana, 2019).

2. Tanda dan gejala kehamilan tidak pasti

- a. Ibu tidak menstruasi Kemungkinan penyebab tanda lain adalah gizi buruk, masalah emosi, atau menopause (berhenti haid).
- b. Mual atau ingin muntah, kebanyakan ibu hamil juga mengalami mual dan muntah, tapi ada beberapa ibu yang mual sepanjang hari. Kemungkinan penyebab lain dari mual adalah penyakit atau parasit.
- c. Payudara menjadi peka Payudara lebih lunak, sensitive, gatal dan berdenyut seperti kesemutan dan jika disentuh terasa nyeri. Hal ini menunjukkan peningkatan produksi hormone estrogen dan progesterone.
- d. Ada bercak darah dan kram perut Adanya bercak darah dan kram perut disebabkan oleh implantasi

atau menempelnya embrio ke dinding ovulasi atau lepasnya sel telur matang dari Rahim. Hal ini merupakan keadaan yang normal.

- e. Ibu merasa letih dan mengantuk sepanjang hari Rasa letih dan mengantuk umum dirasakan pada 3 atau 4 bulan pertama kehamilan. Hal ini diakibatkan oleh perubahan hormone dan kerja ginjal, jantung serta paru-paru yang semakin keras untuk ibu dan janin. Kemungkinan penyebab lain tanda ini adalah anemia, gizi buruk, masalah emosi dan terlalu banyak bekerja.
- f. Sakit kepala Sakit kepala terjadi karena lelah, mual, dan tegang serta depresi yang disebabkan oleh perubahan hormone tubuh saat hamil.
- g. Ibu sering berkemih Tanda ini terjadi pada 3 bulan pertama dan 1 hingga 2 bulan terakhir kehamilan. Kemungkinan penyebab lain tanda ini adalah stress, infeksi, diabetes, ataupun infeksi saluran kemih
- h. Sembelit Sembelit dapat disebabkan oleh meningkatnya hormone progesterone. Selain mengendurkan otot Rahim, hormone itu juga mengendurkan otot dinding usus, sehingga

memperlambat gerakan usus agar penyerapan nutrisi janin lebih sempurna

- i. Sering meludah Sering meludah atau hipersalivasi disebabkan oleh perubahan kadar estrogen.
 - j. Temperature basal tubuh naik Temperature basal adalah suhu yang diambil dari mulut saat bangun pagi. Temperature ini sedikit meningkat setelah ovulasi dan akan turun ketika mengalami haid.
 - k. Ngidam Tidak suka atau tidak ingin makanan tertentu merupakan ciri khas ibu hamil. Penyebabnya adalah perubahan hormone.
 - l. Perut ibu membesar Setelah 3 atau 4 bulan kehamilan biasanya perut ibu tampak cukup besar sehingga terlihat dari luar. Kemungkinan penyebab lain tanda ini adalah ibu mengalami kanker atau pertumbuhan lain di dalam tubuhnya.
3. Tanda dan gejala kehamilan palsu
- Pseudocyesis (kehamilan palsu) merupakan keyakinan dimana seorang wanita merasakan dirinya sedang hamil namun sebenarnya ia tidak hamil. Wanita yang mengalami pseudocyesis akan merasakan sebagian

besar atau bahkan semua tanda-tanda dan gejala kehamilan. Meskipun penyebab pastinya masih belum diketahui, dokter menduga bahwa faktor psikologislah yang mungkin menjadi penyebab tubuh untuk “berpikir bahwa ia hamil. Tanda-tanda kehamilan palsu :

- a. Gangguan menstruasi
- b. Perut bertumbuh
- c. Payudara membesar dan mengencang, perubahan pada puting dan mungkin dan produk ASI
- d. Merasakan pergerakan janin
- e. Mual dan muntah.
- f. Kenaikan berat badan (Sutanto & Fitriana, 2019)

C. Perubahan Anatomis dan Fisiologis Kehamilan

1. Uterus

Uterus mengalami peningkatan ukuran dan perubahan bentuk. Pada saat kehamilan uterus akan membesar pada bulan pertama karena pengaruh dari hormone esterogen dan progesterone yang kadarnya meningkat. Pada wanita hamil berat uterus 1000 gram dengan panjang kurang lebih 2,5 cm.

2. Decidua

Decidua merupakan sebutan yang diberikan kepada endometrium pada kehamilan. Progesterone dan estrogen pada awalnya diproduksi oleh korpus luteum yang menyebabkan decidua menjadi lebih tebal , lebih vaskuler dan lebih kaya di fundus.

3. Myometrium

Hormon estrogen sangat berperan dalam pertumbuhan otot di dalam uterus. Pada usia kehamilan 8 minggu, uterus akan mulai menghasilkan gelombang kecil dari kontraksi yang dikenal dengan kontraksi Braxton Hicks.

4. Serviks mengalami pelunakan dan sianosis.

Kelenjar pada serviks mengalami proliferasi. Segera setelah terjadi konsepsi, mucus yang kental akan diproduksi dan menutup kanalis servikal.

5. Vagina dan perineum

Adanya hipervaskularisasi pada saat kehamilan mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah dan agak kebiruan (livide). Tanda ini disebut tand Chadwick.

6. Ovarium

Pada awal kehamilan masih terdapat korpus luteum

graviditas kira – kira berdiameter 3 cm. kemudian, ia mengecil setelah plasenta terbentuk.

7. Payudara (*Breast*)

Payudara akan membesar dan tegang akibat stimulasi hormone somatomammotropin, estrogen, dan progesterone tetapi belum mengeluarkan air susu.

8. Kulit

Pada kulit terdapat deposit pigmen dan hiperpigmentasi alat – alat tertentu. Pigmentasi terjadi karena pengaruh melanophore stimulating hormone (MSH) yang meningkat. MSH ini adalah salah satu hormon yang juga dikeluarkan oleh lobus anterior hipofisis. Kadang – kadang terdapat deposit pigmen pada pipi, dahi dan hidung, yang dikenal dengan kloasma gravidarum. (Sutanto & Fitriana, 2019).

4. Perubahan Psikologis pada kehamilan Trimester III:

- a. Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik.
- b. Merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu.

- c. Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat melahirkan, khawatir akan keselamatannya.
- d. Khawatir bayi akan di lahirkan dalam keadaan yang tidak normal, bermimpi yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya.
- e. Merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya.
- f. Merasa kehilangan perhatian dan lebih sensitif.
- g. Libido menurun
- h. Hasrat untuk melakukan hubungan seks berbeda-beda pada setiap wanita, tetapi kebanyakan akan mengalami penurunan. (Saljus,2024)

D. Trimester I (Periode Penyesuaian Terhadap Kehamilan)

Pada awal kehamilan sering muncul perasaan ambivalen dimana ibu hamil merasa ragu terhadap kenyataan bahwa dirinya hamil. Ambivalen dapat terjadi sekalipun kehamilan ini direncanakan dan sangat diharapkan. Gambaran respon terhadap ambivalen ini yaitu selama beberapa minggu awal kehamilan apakah ibu hamil atau tidak serta menghabiskan banyak waktu untuk membuktikan kehamilan (Widatiningsih & Dewi, 2017).

Pada trimester I ini dapat terjadi labilitas emosional, yaitu perasaan yang mudah berubah dalam waktu singkat dan tidak dapat diperkirakan. Dapat timbul perasaan khawatir seandainya bayi yang dikandungnya cacat atau tidak sehat, khawatir akan jatuh, cemas dalam melakukan hubungan seksual dan sebagainya (Widatiningsih & Dewi, 2017).

E. Trimester II (Periode sehat)

Trimester ini ibu merasa lebih stabil, kemampuan mengatur diri lebih baik, kondisi ibu lebih menyenangkan, ibu mulai terbiasa dengan perubahan fisik tubuhnya, janin belum terlalu besar sehingga belum menimbulkan ketidaknyamanan. Ibu sudah mulai menerima dan mengerti tentang kehamilannya. Secara kognitif, pada trimester II ibu cenderung membutuhkan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan bayinya serta perawatan kehamilannya (Widatiningsih & Dewi, 2017).

F. Trimester III

Trimester ini sering disebut periode penantian dengan penuh kewaspadaan. Pada periode ini wanita mulai

menyadari kehadiran bayi sebagai makhluk yang terpisah sehingga ia menjadi tidak sabar menanti kehadiran sang bayi. Ada perasaan cemas mengingat bayi dapat lahir kapanpun. Hal ini membuatnya berjaga-jaga sementara ia memperhatikan dan menunggu tanda dan gejala persalinan muncul. Rasa cemas dan takut akan proses persalinan dan kelahiran meningkat, yang menjadi perhatian yaitu rasa sakit, luka saat melahirkan, kesehatan bayinya, kemampuan jadi ibu yang bertanggung jawab dan bagaimana perubahan hubungan dengan suami, ada gangguan tidur, harus dijelaskan tentang proses persalinan dan kelahiran agar timbul kepercayaan diri pada ibu bahwa ia dapat melalui proses persalinan dengan baik (Dartiwen dan yati, 2019).

G. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil

1. Oksigen; untuk memenuhi kebutuhan oksigen, ibu hamil perlu melakukan latihan napas melalui senam hamil, tidur dengan bantal lebih tinggi, makan sesuai kebutuhan (tidak terlalu banyak), kurangi atau hentikan merokok, konsultasikan ke dokter bila memiliki kelainan atau gangguan pernapasan seperti asma, dll.

2. Nutrisi; pada saat hamil ibu harus makan makanan yang mengandung gizi bermutu tinggi (menu seimbang), ibu hamil harus mengonsumsi makanan yang mengandung protein, zat besi, dan minum cukup cairan.
3. Personal hygiene; adalah kebersihan yang dilakukan ibu hamil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi.
4. Pakaian; baju hendaknya yang longgar dan mudah digunakan serta memilih bahan yang mudah menyerap keringat, sebab ibu hamil mudah berkeringat karena peningkatan hormon membuat metabolisme tubuh meningkat sehingga memicu kelenjar keringat menjadi lebih aktif.
5. Eliminasi; keluhan yang sering dialami ibu hamil berkaitan dengan eliminasi adalah sering buang air kemih dan konstipasi. Peningkatan frekuensi berkemih merupakan keluhan yang umum terjadi pada ibu hamil trimester I dan III. Pada awal kehamilan hal ini terjadi karena pembesaran uterus yang mendesak kandung kemih, sedangkan pada trimester III, frekuensi BAK meningkat karena penurunan kepala

ke Pintu Atas Panggul (PAP). Tindakan mengurangi asupan cairan untuk mengurangi asupan cairan agar keluhan ini berkurang sangat tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan dehidrasi, yang harus dilakukan adalah tetap menjaga kebersihan area genitalia setelah berkemih. BAB sering obstipasi (sembelit) karena pengaruh relaksasi otot polos oleh meningkatnya hormon, tekanan uterus yang makin membesar serta pengaruh tekanan kepala bayi yang telah masuk PAP.

6. Seksual; hubungan seksual selama kehamilan tidak dilarang selama tidak ada riwayat gangguan kehamilan dan harus dilakukan dengan hati-hati. Pada akhir kehamilan jika kepala bayi sudah masuk PAP sebaiknya coitus dihentikan karena dapat menimbulkan perasaan sakit dan perdarahan.

H. Ketidaknyamanan selama Kehamilan Trimester III

Ketidaknyamanan selama kehamilan trimester III adalah keadaan tidak nyaman yang dialami ibu hamil selama menjalani kehamilan trimester III yang disebabkan karena posisi dan ukuran bayi yang semakin membesar

(Susanto, 2019). Memasuki trimester ketiga, panjang bayi dalam kandungan akan mencapai 34cm dan berat badannya lebih dari 1000gr. Sampai akhir trimester ketiga, panjang bisa mencapai 50-55cm dengan berat beragam yang bisa mencapai 4000gr, hal inilah yang menimbulkan berbagai keluhan ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester III (Hidajati, 2010).

Membedakan ketidaknyamanan selama kehamilan dengan komplikasi kehamilan, yaitu dengan mengkaji keluhan yang dirasa pasien dengan anamnesis yang efektif dan komunikatif, dikuatkan dengan pemeriksaan fisik terutama yang berkaitan dengan keluhan yang dirasa pasien, pengambilan keputusan secara tepat untuk mengurangi resiko komplikasi (Pattiyah, 2021)

Beberapa masalah ketidaknyamanan ibu hamil yang dialami selama trimester III diantaranya adalah sesak napas, sering BAK, dan salah satunya adalah nyeri punggung. Jika masalah ketidaknyamanan ini tidak teratasi, ibu hamil akan mengalami permasalahan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. (Diana, 2023)

Nyeri punggung adalah salah satu rasa ketidaknyaman yang paling umum selama kehamilan. Nyeri punggung dapat terjadi karena adanya tekanan pada otot punggung ataupun pergeseran pada tulang punggung sehingga menyebabkan sendi tertekan (Rejeki, 2019).

Faktor predisposisi nyeri punggung meliputi pertumbuhan uterus yang menyebabkan perubahan postur, penambahan berat badan, pengaruh hormone relaksin terhadap ligamen, riwayat nyeri punggung terdahulu, paritas dan aktivitas. Oleh karena itu latihan otot abdomen perlu diajarkan pada masa antenatal untuk memastikan kembalinya bentuk otot ke bentuk normal pascanatal dengan cepat, kemampuan mengejan yang efektif saat persalinan dan mengurangi nyeri punggung selama kehamilan. (Muzayyana, 2023)

Perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada ibu hamil trimester ketiga:

1. sakit punggung disebabkan karena meningkatnya beban berat bayi dalam kandungan.
2. pernapasan; pada kehamilan 33-36 minggu, banyak

ibu hamil yang susah bernapas, ini karena tekanan bayi yang berada di bawah diafragma menekan paru ibu.

3. sering buang air kecil; pembesaran rahim, dan penurunan bayi ke PAP membuat tekanan pada kandung kemih ibu (Walyani, 2015).

Nyeri punggung terjadi akibat adanya perubahan pada hormon kehamilan yang meningkatkan kadar hormon relaksin. Hal ini mempengaruhi fleksibilitas jaringan ligamen yang akhirnya meningkatkan mobilitas sendi di pelvis dan akan berdampak pada ketidakstabilan spinal dan pelvis serta menyebabkan rasa tidak nyaman (Wijaya, 2018).


Ketidaknyamanan pada kehamilan trimester III dengan usia kehamilan 28 - > 40 minggu, terjadinya karena perubahan fisik terutama pada berat badan, akibat pembesaran uterus dan sendi panggul sedikit mengendor menyebabkan ibu sering kali mengalami nyeri pinggang. (Muzayyana, 2023)

Menurut Rukiyah (2009) Nyeri punggung juga dapat disebabkan karena semakin tuanya kehamilan, perut semakin membesar dan punggung menjadi lordosis, sehingga pada saat melakukan aktivitas ibu akan mengalami kelelahan dan dapat terjadi kesalahan dalam melakukan aktivitas. Hal tersebut umum dirasakan saat kehamilan lanjut yang disebabkan oleh progesterone dan relaksasi (melunakan jaringan ikat) dan postur tubuh yang berubah serta meningkatnya beban berat yang dibawah dalam Rahim (Kudarti,219)

Gangguan ketidaknyamanan selama hamil dapat dipengaruhi oleh faktor fisik terkait perubahan anatomi, dan faktor psikologis. Pada umumnya gangguan ini bersifat fisiologis, namun dapat berubah menjadi patologis apabila tidak diatasi dengan tepat. Diagnosis yang tepat terkait gangguan ketidaknyamanan kehamilan dan penyebabnya penting dilakukan untuk penatalaksanaan yang tepat. Masing-masing wanita dapat diberikan treatment yang berbeda dengan kasus yang sama, untuk itu dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh dari bidan agar dapat

membantu ibu dalam mengatasi gangguan dan ketidaknyamanan selama kehamilan. (Muzayyana, 2023)

Berat badan yang meningkat drastis menyebabkan ibu hamil cepat merasa lelah, sukar tidur, nafas pendek, kaki dan tangan odema. Sejalan dengan pertumbuhan janin yang mendorong diafragma ke atas menyebabkan bentuk dan ukuran rongga dada berubah, karena bentuk dari rongga thorak berubah dan bernafas lebih cepat, sekitar 60% ibu hamil mengeluh sesak nafas. Meningkatnya tinggi fundus uteri yang disertai pembesaran perut, membuat beban tubuh lebih ke arah depan. Dalam upaya menyesuaikan dengan beban tubuh yang berlebihan sehingga tulang belakang mendorong ke arah belakang, membentuk postur lordosis. Hal ini yang menyebabkan rasa pegal pada punggung, varises dan merasakan kram pada kaki. (Perdoman, 2022).



BAB 3

Prenatal Yoga

A. Pengertian Prenatal Yoga

Yoga adalah ilmu kuno dari India yang bersifat spiritual dan fisik. Yoga menggunakan Teknik pernafasan, Gerakan dan meditasi untuk membantu meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan. Arti kata yoga dalam Bahasa Sansekerta adalah penyatuan. Dalam konteks aslinya, yoga adalah praktik pengembangan spiritual untuk melatih tubuh dan pikiran. Latihan-latihan yoga untuk menumbuhkan kearifan, pengaturan diri dan kesadaran yang lebih tinggi dalam diri individu. Yoga kehamilan atau prenatal yoga merupakan kombinasi dari latihan kardiovaskuler dapat menjadi cara yang ideal bagi ibu hamil agar tetap bugar (Mualimah, 2021).

Yoga adalah sebuah filosofi saat dimana pola pikir sehari-hari kita, beserta dengan keseluruhan keinginan, rasa kuatir, rasa takut dan kebingungan yang kita miliki akhirnya hilang. Yoga adalah belajar tentang mindfulness, dimana gerakan yang dilakukan bukan sekedar ingin “show off” namun gerakan yang penuh dengan filosofi dan kesadaran serta kelembutan kasih sayang (Yayuk, 2023).

Yoga adalah suatu metode penyembuhan yang memberikan pengaruh positif pada kesehatan tubuh, psikologi, perasaan, dan reaksi terhadap kehidupan yang sedang kita jalani. Tujuan dari rangkaian latihan yoga untuk menciptakan keseimbangan jiwa dan raga, kekuatan tubuh, ketenangan, kedamaian, mempersiapkan ibu hamil secara fisik, mental dan spiritual untuk proses persalinan. Dengan persiapan matang, ibu akan lebih percaya diri dan memperoleh keyakinan menjalani persalinan dengan lancar dan nyaman serta tidak mengalami kecemasan. Yoga telah berhasil diadaptasi untuk berbagai kepentingan dan gaya hidup dari orang-orang barat, sehingga yoga dikenal sebagai salah satu seni olahraga (Yayuk, 2023)

Yoga berasal dari india sekitar 4000 tahun yang lalu. Nama yoga diambil dari kata yang artinya kesatuan dalam Bahasa sansekerta. Yoga memang merupakan falsafah hidup holistik yang tertua yang dikenal manusia. Yoga menciptakan kesadaran fisik dan perasaan rileksasi yang lama, ditambah pikiran yang jernih dan emosi yang stabil. (Bingan, 2019)

Gerakan prenatal yoga dirancang khusus untuk melatih otot-otot rahim agar bisa menunjang ruang gerak janin di dalam kandungan. Dengan begitu, janin bisa berkembang dan bergerak secara optimal. Yoga juga membuat calon ibu lebih rileks, dan kondisi ini baik untuk janin. Saat melakukan yoga seorang ibu harus merasa senang dan tidak stress, karena dapat merugikan ibu dan mengganggu pertumbuhan janin. (Perdorman, 2022)

Prenatal yoga merupakan modifikasi dari gerakan senam yoga yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Gerakan dalam prenatal yoga diciptakan dengan tempo yang lebih lambat dan menyesuaikan dengan kapasitas gerak ibu hamil. Yoga pada kehamilan merupakan suatu olah tubuh,

pikiran dan mental yang membantu ibu dalam melenturkan persendian, menenangkan pikiran ibu dan membawa ibu kedalam situasi kehamilan yang lebih tenang sehingga fisik ibu lebih baik dan dapat membangun bonding dengan bayinya (Melicha, 2022).

Yoga merupakan kombinasi antara olah tubuh dan peregangan dengan nafas dalam dan meditasi. Yoga didesain untuk meregangkan otot dan menjaga fleksibilitas tulang belakang dan sendi. Yoga dilakukan dengan pernafasan dalam sehingga meningkatkan aliran oksigen ke otak sehingga dapat mengurangi kecemasan, depresi, gangguan psikologis dan gejala nyeri termasuk nyeri punggung bawah. (Darwitri, 2021)

Yoga dalam kehamilan menggabungkan postur khusus dan teknik yang bermanfaat bagi ibu hamil dan membantu menghilangkan ketidaknyamanan yang disebabkan perubahan tubuh selama kehamilan. Terlebih lagi, yoga yang dilakukan ibu hamil dapat membuat tubuh lebih lentur, nyaman, menunjang sirkulasi darah, mengatasi sakit

punggung, pinggang hp/photon, pegal dan bengkok. (Darwitri, 2021)

Prenatal Yoga merupakan salah satu jenis modifikasi dari hatha yoga disesuaikan dengan kondisi ibu hamil TM III. Prenatal gentle yoga yang dilakukan pada kehamilan trimester III dapat mengurangi keluhan yang dirasakan ibu hamil selama trimester III salah satunya yaitu nyeri punggung bawah. (Atik,2024)

Prenatal yoga memiliki efek positif untuk ibu hamil yaitu mengurangi stress, kecemasan, rasa sakit saat kehamilan, ketidaknyamanan dan mengurangi nyeri persalinan. Senam prenatal yoga memiliki lima cara yaitu latihan fisik yoga, pernapasan (pranayama), positions (mudra), meditasi dan deep relaksasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat selama kehamilan dan kelahiran anak secara alami dan dapat membantu dalam memastikan bayi yang sehat. (Muzayyana, 2023).

Gerakan janin seperti bernapas, gerak tubuh dan mulut dimonitor dan direkam selama 24 minggu dapat

menghasilkan melambatnya irama jantung secara berarti yang terjadi selama para ibu melakukan olahraga. Sementara irama jantung janin pada para ibu yang tidak banyak beraktivitas justru lebih tinggi. (Perdoman, 2022)

Salah satu upaya mengatasi nyeri punggung yang dialami wanita hamil adalah dengan menggunakan teknik nonfarmakologi yaitu prenatal yoga. Prenatal yoga adalah suatu rangkaian gerakan yoga yang disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan gerak ibu hamil. Prenatal yoga merupakan upaya praktis dalam menyelaraskan tubuh, pikiran dan jiwa sehingga terbentuk postur tubuh yang tegap, otot yang lentur dan kuat serta memurnikan saraf pusat yang terdapat di tulang punggung (Melicha, 2022)

Tujuan Prenatal Yoga adalah mempersiapkan ibu hamil secara fisik, mental, dan spiritual untuk proses persalinan. Dengan persiapan matang, ibu akan lebih percaya diri dan memperoleh keyakinan menjalani persalinan dengan lancar. (Atik, 2024). Karena menurut (Perdoman, 2022) Yoga bertujuan melatih otot panggul dan sekitarnya, agar menjadi lebih kuat dan elastis. Sirkulasi darah disekitar

daerah panggul menjadi lebih lancar sehingga memudahkan ibu melakukan persalinan secara normal. Dengan latihan pernafasan yang dilakukan selama yoga, ibu akan terbiasa melakukan nafas pendek dan cepat dengan ritme yang teratur serta panjang dan dalam baik saat menghirup maupun melepaskan udara. Pelatihan nafas mampu menenangkan calon ibu untuk melalui rasa sakit dalam proses persalinan, serta memicu sistem saraf yang memperlancar pembukaan dan peregangan dinding vagina.

Prenatal yoga efektif menurunkan nyeri punggung bawah pada ibu hamil, dilakukan dengan durasi 30 – 60 menit dan frekuensi satu minggu sekali selama dua minggu. (Diana, 2023)

B. Manfaat Prenatal Yoga bagi Ibu Hamil

Prenatal *gentle* yoga memberikan manfaat fisik pada ibu hamil diantaranya; menjaga kebugaran tubuh membantu mengembangkan rasa percaya diri yang positif, citra tubuh, dan pandangan terhadap diri sendiri yang lebih nyaman dan realistis, membantu memperbaiki postur tubuh, memperbaiki pola nafas ibu dan meningkatkan oksigenasi

dalam tubuh, menguatkan otot punggung dan melatih otot dasar. (Diana, 2023)

Berlatih yoga selama masa kehamilan dapat membantu melatih pernafasan dan membuat ibu hamil menjadi rileks sehingga memudahkan adaptasi ibu terhadap perubahan tubuhnya selama kehamilan. Yoga selama kehamilan dapat menciptakan ketenangan jiwa yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Yoga aman dilakukan dalam kehamilan dan merupakan cara sederhana serta mudah untuk mempersiapkan persalinan. (Pattiyah, 2021)

Menurut Wariyah dan Khairiah (2023) manfaat senam prenatal yoga adalah

1. Mengurangi Ketidaknyamanan pada Ibu Hamil

Ibu hamil yang sudah mengikuti kelas prenatal yoga, mengatakan bahwa prenatal yoga dapat mengurangi keluhan fisik seperti, mengurangi kram pada kaki, pegal-pegal dikaki dan nyeri pinggang, badan terasa lebih ringan serta terasa lebih nyaman. Ibu hamil trimester III yang sudah melakukan prenatal yoga mengalami penurunan Intensitas nyeri punggung yang dirasakan ibu

hamil mengalami penurunan setelah diberikan prenatal yoga.

2. Kecemasan

Kecemasan muncul pada ibu primigravida (hamil yang pertama) karna ibu belum memiliki pengalaman sehingga muncul pertanyaan dan bayangan apakah dapat melahirkan normal, cara mengejan yang benar, apakah akan terjadi sesuatu saat melahirkan, atau apakah bayi lahir selamat, akan semakin sering muncul dalam pikiran ibu hamil. Untuk mengatasi kecemasan tersebut salah satunya adalah kepercayaan tentang persalinan serta perasaan menjelang persalinan.

3. Stress

Intervensi yoga akan berdampak positif pada ibu yang mengalami stres, hal ini terjadi karna berkurangnya nada simpatik, yang melemaskan arteri uterina, sehingga menghasilkan sirkulasi darah yang lebih baik.

4. Persiapan Persalinan

Prenatal yoga meningkatkan kesiapan proses persalinan, ibu sudah mengetahui informasi persalinan, tubuh ibu sudah siap melakukan proses persalinan karena ibu yakin tubuh sudah lebih lentur, ibu telah memahami teknik

pernafasan yang benar dalam menghadapi kontraksi, serta ibu mendapatkan adanya afirmasi positif yang selama ikut prenatal yoga.

Teknik Iyengar Yoga dapat menjadi metode yang baik untuk menunjang keberhasilan dan keselamatan persalinan. skor nyeri persalinan signifikan lebih rendah pada kelompok yoga Iyengar yang Dimodifikasi pada kelompok kontrol ($p < 0,05$). hal ini menunjukkan bahwa latihan modifikasi Iyengar yoga dapat mengurangi nyeri persalinan pada ibu primigravida.

Teknik prenatal yoga untuk mempersiapkan ibu hamil secara fisik, mental dan spiritual untuk proses persalinan. Dengan persiapan yang matang, dari segi fisik dan mental, ibu akan lebih percaya diri dan memperoleh keyakinan menjalani persalinan dengan lancar dan nyaman. menghindari persalinan tidak normal seperti sectio caesaria.

5. Hubungan Sosial

Prenatal yoga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesempatan keterhubungan social bagi peserta dengan orang lain, baik dengan teman-teman mereka dalam kelompok, atau mungkin yang lebih penting, bayi

mereka sendiri dalam kandungan.

6. Komplikasi Maternal

Yoga yang dilakukan selama masa kehamilan dilaporkan dapat menurunkan risiko komplikasi maternal, seperti diabetes melitus gestasional dan preeklamsia. Pada periode kehamilan membuat sebagian ibu hamil mengalami stress, dan yoga dapat membantu pikiran tenang dan otot ibu hamil menjadi lebih rileks sehingga terhindar dari peningkatan tekanan darah.

Menurut (Atik, 2024) gerakan yoga juga dapat merangsang tubuh menghasilkan hormon endorfin yang dapat memicu rasa nyaman, senang dan bahagia. Hormon endorfin akan memblokir reseptor opioid yang terdapat pada sel saraf sehingga penghantaran sinyal nyeri akan terganggu.

Menurut (Perdoman, 2023) yoga sangat bermanfaat yoga bagi ibu hamil, bersalin dan nifas yaitu dapat meringankan edema dan kram yang sering terjadi pada bulan-bulan terakhir kehamilan, membantu posisi bayi dan pergerakan, meningkatkan sistem pencernaan dan

nafsu makan, meningkatkan energi dan memperlambat metabolisme untuk memulihkan ketenangan dan fokus, mengurangi rasa mual, morning sickness dan suasana hati, meredakan ketegangan di sekitar leher rahim dan jalan lahir, yang berfokus pada membuka pelvis untuk mempermudah persalinan, membantu.

C. Manfaat Prenatal Yoga Bagi Janin

Menurut (Nurlaila, 2021) manfaat yoga bagi janin adalah

1. Hubungan keterikatan ibu dan janin

Yoga prenatal dapat meningkatkan hubungan keterikatan antara ibu dan janin.

2. Komplikasi neonatal

Yoga prenatal dapat menurunkan prevalensi IUGR dan *small for age gestation* (SAG).

3. Presentasi Janin

Yoga dapat membantu merubah presentasi janin memberikan ruang yang lebar di abdomen, melenturkan otot-otot rahim dan panggul. Tiga gerakan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *cat cow*, *downwardfacing dog* dan *puffy pose*. Gerakan ini memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk membantu

perputaran kepala janin. Perubahan presentasi janin selama kehamilan dipengaruhi oleh gaya fisik yang bekerja pada uterus dan janin. Pengaruh rata-rata waktu yang diperlukan untuk merubah presentasi janin dari presentasi bokong ke presentasi kepala pada ibu hamil yang melakukan prenatal yoga dan posisi *knee-chest*. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk merubah presentasi janin dari presentasi bokong ke presentasi kepala pada ibu hamil yang melakukan prenatal yoga 15 – 16 hari. Sedangkan, rata-rata waktu yang diperlukan untuk merubah presentasi janin dari presentasi bokong ke presentasi kepala pada ibu hamil yang melakukan posisi *knee-chest* 21 hari. Hasil ini memperlihatkan bahwa prenatal yoga lebih efektif merubah presentasi janin dibandingkan *knee-chest*.

D. Indikasi Prenatal Yoga

Sebelum melakukan Prenatal Yoga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Sebelum melakukan latihan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan dan minta nasihat dokter atau bidan.

2. Latihan baru dapat dimulai setelah usia kehamilan 22 minggu.
3. Latihan harus dilakukan secara teratur dan disiplin dalam batas-batas kemampuan fisik ibu.
4. Latihan sebaiknya dilakukan di rumah sakit atau klinik bersalin.
5. Latihan tidak menekan area perut dengan tidak melakukan latihan untuk otot perut dan menghindari posisi tengkurap.
6. Latihan tidak meregangkan area perut dengan tidak melakukan Gerakan melenting ke belakang atau backbend berlebihan.
7. Latihan tidak memutar area perut.

Indikasi secara khusus adalah indikasi ibu hamil yang bias mengikuti meditation prenatal yoga yaitu dilakukan pada usia kehamilan diatas 20 minggu dengan tidak ada komplikasi. Riwayat kehamilan, persalinan dan bayi sebelumnya. Kontraindikasi untuk melakukan meditation prenatal yoga yaitu terdapat Riwayat Obstetric yang buruk, tekanan darah tinggi, pelaksanaan ibu hamil mengalami keluhan pusing, gangguan penglihatan, tremor, jantung berdebar. (Handayani, 2022)

Menurut (Annisa,2021) ada beberapa persiapan prenatal yoga yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Kenakan Pakaian yang longgar dan nyaman.
2. Berlatih tanpa alas kaki diatas yoga mat.
3. Jaga perut agar tidak kenyang dan tidak terlalu lapar.
4. Berlatih di pagi hari atau sore hari saat perut kosong.
Lakukan 1-2 jam setelah makan.
5. Gunakan bantal, guling atau kursi sebagai sebagai alat bantu melakukan prosedur yoga.
6. Minum air yang banyak setelah berlatih.

E. Prosedur Pelaksanaan Prenatal Yoga

Prinsip Senam Prenatal Yoga Menurut (Annisa, 2021) prinsip-prinsip senam Prenatal Yoga adalah:

1. Napas dengan penuh kesadaran
Napas yang dalam dan teratur menyembuhkan dan menenangkan. Melalui teknik pernapasan yang benar, sang ibu akan lebih dapat mengontrol pikiran dan tubuhnya.
2. Gerakan yang lembut dan perlahan
Gerakan yang lembut dan mengalir akan membuat tubuh ibu lebih luwes sekaligus kuat. Gerakan Prenatal

Yoga fokus pada otot-otot dasar panggul, otot panggul, pinggul, paha dan punggung.

3. Relaksasi dan Meditasi

Dengan relaksasi dan meditasi seluruh tubuh dan pikiran ibu dalam kondisi yang relaks, tenang dan damai.

4. Ibu dan Bayi

Prenatal Yoga meluangkan waktu spesial dan meningkatkan bonding antar ibu dan calon bayi. Jika ibu bahagia dan relaks bayi pun akan merasakan hal yang sama.

Prenatal yoga sama halnya dengan senam hamil dapat dilakukan oleh semua ibu yang memiliki kehamilan sehat, tanpa kontraindikasi, seperti preeklamsia, plasenta previa totalis, *cervix incompetence* hipertensi, ada riwayat abortus yang disebabkan oleh lemah kandungan, dan penyakit jantung, sangat disarankan untuk berlatih yoga secara teratur. Berlatih yoga seminggu 1-2 kali dengan bimbingan instruktur selama 60-90 menit/sesi dan di hari-hari lainnya dapat berlatih secara mandiri. Masuk pada trimester III mungkin ibu hamil merasa kurang nyaman, karena perut

semakin besar. Pada fase ini ada beberapa tips ketika akan melakukan prenatal yoga.

Beberapa tips tersebut antara lain:

1. Lakukan semua pose berdiri dengan tumit ke dinding atau gunakan kursi untuk dukungan agar tidak kehilangan keseimbangan dan resiko cedera pada ibu hamil atau janin nya.
2. Gunakan alat peraga seperti balok dan tali untuk membantu bergerak melalui berbagai pose dengan stabilitas yang lebih baik.
3. Jangan menahan pose dalam waktu yang lama. Karena berdiri terlalu lama memperlambat laju aliran darah kembali ke jantung pada beberapa wanita hamil. (Annsa, 2021)

F. Gerakan Prenatal Yoga

Pemanasan sangat penting sebelum berlatih prenatal yoga. Jika tidak melakukan pemanasan, otot-otot tubuh akan kaget dan akibatnya tubuh merasa nyeri atau pegal setelah latihan. Pemanasan yang dilakukan dengan kesadaran napas akan membuat tubuh relaksasi dan aktif sehingga

tubuh siap melakukan gerakan-gerakan yoga. (Annisa, 2021)

1. Pemanasan leher

Manfaat:

- a. Meredakan ketegangan diarah leher
- b. Melancarkan energi diarah leher dan kepala



Gambar 3.1 Duduk Bersila

Instruksi:

- 1) Duduk bersila dengan nyaman dan luruskan tulang punggung
- 2) Letakkan kedua tangan diatas lutut
- 3) Arahkan kepala ke arah kanan. Tahan posisi dan bernapas rileks 3-5 kali
- 4) Arahkan kepala ke arah kiri. Tahan posisi dan bernapas rileks 3- 5 kali



Gambar 3.2 Rebahkan Kepala

Instruksi:

- 1) Rebahkan kepala ke samping kanan. Tahan posisi dan bernapas relaks 3-5 kali
- 2) Rebahkan kepala ke samping kiri. Tahan posisi dan bernapas relaks 3-5 kali



Gambar 3.3 Tundukan Kepala

Instruksi:

- 1) Tundukkan kepala seluruhnya kebawah dan rasakan peregangan leher bagian belakang
 - 2) Perlahan putar pergelangan leher dan kepala kiri, belakang kanan dan kembali kedepan. Lakukan sebanyak 3-4 kali
 - 3) Putar leher dan kepala ke arah sebaliknya. Lakukan sebanyak 3-4 kali.
 - 4) Tundukkan kepala seluruhnya kebawah dan bernapas normal
 - 5) Angkat kepala kembali ketengah dan rileks
2. Peregangan dan pemutaran samping tubuh manfaat
- a. Meredakan ketegangan tubuh di daerah tulang belakang, pinggang dan panggul
 - b. Mempelancar energi tubuh dan memperdalam kapasitas napas.



Gambar 3.4 Regangkan Tubuh

Instruksi:

- 1) Duduk bersila dengan nyaman
- 2) Buang napas, regangkan tubuh ke samping dan pandangan keatas. Tahan lembut posisi ini dan bernafas normal 3-5 kali. Ulangi sisi lainnya.



Gambar 3.5 Memutar Tubuh

Instruksi:

- 1) Kembali duduk bersila menghadap kedepan
- 2) Buang napas, perlahan memutar tubuh kesamping kanan. Tahan lembut posisi ini dan bernafas normal 3-5 kali. Ulangi sisi lainnya

3. Peregangan bahu dan pundak

Manfaat:

- a. Mengurangi ketegangan di Pundak, bahu dan dada
- b. Memperancarkan energi tubuh dan memperdalam kapasitas nafas.



Gambar 3.6 Peregangan Bahu dan Pundak

Instruksi:

- 1) Duduk bersila dengan nyaman

- 2) Letakkan kedua tangan dipundak dan kedua siku bersentuhan
- 3) Tarik napas, putar lengan keatas dan kedua siku menghadap keatas
- 4) Buang napas, lalu putar lengan ke belakang e)
Ulangi gerakan 3-5 kali

Menurut Dyah Paramitha (2024) waktu yang tepat untuk memulai melakukan prenatal yoga yaitu saat usia kehamilan 14-16 minggu kehamilan. Ibu dapat melakukan sebanyak 2-3x dalam seminggu dengan durasi 60-90 menit setiap sesi latihan. Sebelum melakukan prenatal yoga, sebaiknya ibu memastikan diri terlebih dahulu bahwa ibu dan janin dalam kondisi yang sehat. Kondisi ibu yang tidak disarankan melakukan prenatal yoga yaitu tekanan darah di atas 140/90 mmHg, pernah mengalami perdarahan selama kehamilan, letak plasenta menutupi jalan lahir dan sering mengalami kram pada perut selama kehamilan.

Berikut ini beberapa gerakan yang umum dilakukan dalam yoga prenatal antara lain:

1. Cat-Cow Pose

Pose ini terdiri dari dua gerakan yang mengalir secara bergantian, membentuk gerakan yang lembut dan mengalir antara posisi kucing (Cat Pose) dan posisi sapi (Cow Pose). Cat-Cow Pose membantu mengurangi ketegangan di bagian belakang, meningkatkan kelenturan tulang belakang, serta membantu melancarkan peredaran darah. Selain itu, pose ini juga dapat membantu mengurangi gejala ketidaknyamanan yang sering dialami selama kehamilan, seperti nyeri punggung dan ketegangan otot.



Gambar 3.7 Cat-Cow Pose

2. Child's Pose

Child's Pose, juga dikenal sebagai Balasana dalam bahasa Sanskerta, adalah gerakan yoga yang populer dan sering dipraktikkan karena efek menenangkan dan merilekskan

bagi pikiran dan tubuh. Gerakan ini sering digunakan sebagai posisi istirahat selama latihan yoga atau sebagai cara untuk mengurangi stres dan ketegangan, menenangkan pikiran serta membantu merangsang pencernaan dan mengurangi ketidaknyamanan pencernaan.



Gambar 3.8 Child' Pose

3. Pelvic Tilts

Pelvic Tilts adalah gerakan sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan tulang belakang dan otot panggul. Gerakan ini digunakan dalam berbagai jenis latihan, termasuk yoga, pilates, dan rehabilitasi fisik, untuk memperkuat otot inti dan meningkatkan fleksibilitas pinggul.



Gambar 3.9 Pelvic Tilts

4. Butterfly Stretch

Butterfly Stretch, atau dikenal sebagai gerakan kupu-kupu, adalah peregangan yang populer untuk meningkatkan fleksibilitas otot panggul dan paha. Gerakan ini sering digunakan dalam yoga, senam, dan latihan peregangan untuk meredakan ketegangan otot dan meningkatkan rentang gerak tubuh.



Gambar 3.10 Butterfly Stretch

5. Relaksasi

Manfaat: Relaksasi sangat bermanfaat untuk memperdalam napas, menurunkan adrenalin, meredakan ketegangan otot tubuh, menambah daya tahan tubuh, melancarkan aliran darah, melancarkan aliran darah, mengeluarkan endofrin, mengurangi stress dan ketegangan, serta memberi rasa tenang, nyaman dan tentram sehingga ibu lebih siap menghadapi persalinan.



Gambar 3.11 Relaksasi

BAB 4

Efektivitas Prenatal Yoga Terhadap Nyeri Punggung pada Ibu Hamil Trimester III

A. Konsep Nyeri

1. Pengertian Nyeri

The Internasional Association for the Study of Pain (IASP) mendefinisikan nyeri sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan atau ancaman kerusakan jaringan actual dan potensial (Siti Cholifah, *et al* 2020). Nyeri punggung adalah nyeri yang terjadi pada area lumbosakral. Nyeri punggung juga bisa disebabkan karena perubahan hormonal yang menimbulkan perubahan pada jaringan lunak penyangga dan penghubung sehingga menurunnya *elastisitas* dan *fleksibilitas* otot. (Anggraika P, Apriani, P. D, 2019).

2. Fisiologis Nyeri

Munculnya nyeri berkaitan dengan reseptor dan adanya rangsangan. *Nociceptor* merupakan rangsangan nyeri yang berupa ujung-ujung saraf bebas dan mempunyai sedikit atau bahkan tidak mempunyai *myelin* yang tersebar pada kulit, khususnya pada persendian, hati, dan kandung empedu. Reseptor nyeri dapat memberikan respon akibat adanya rangsangan. Stimulasi tersebut dapat berupa kimiawi seperti, termal, listrik, atau bisa juga mekanis. Stimulasi oleh zat kimiawi di antaranya seperti histamine, bradikinin, prostaglandin, dan macam-macam asam yang dilepas apabila terdapat kerusakan pada jaringan akibat kekurangan oksigenisasi. (aydede, 2017).

3. Klasifikasi Nyeri

Nyeri dapat di klasifikasikan menjadi:

a. Nyeri Nociceptive

Tipe nyeri normal yang muncul dari jaringan yang benar-benar atau berkemungkinan rusak dan hasil dari aktivasi nociceptor dan proses yang berikutnya di system saraf yang utuh. (de Boer, 2018)

b. Nyeri Sosmatik

Nyeri somatik adalah variasi dari nyeri nociceptive yang diperantarai oleh serabut afferent somatosensoris yang mana lebih mudah dilokalisasi dengan kualitas tajam, sakit dan berdenyut. Variasi nyeri biasanya seperti nyeri pasca operasi, traumatis, dan inflamasi local. (de Boer, 2018)

c. Nyeri Visceral

Ini menjelaskan tentang perasaan tidak enak dan kesulitan emosional yang disebabkan oleh nyeri visceral. Ini dapat dirasakan pada tempat asal dari nyeri atau bias juga mengarah ke tempat lain, contohnya dari diafragma ke bahu. (de Boer, 2018)

d. Nyeri neuropatik

Nyeri ini disebabkan oleh kerusakan pada jaringan saraf. Ia selalu diarahkan ke distribusi sensoris dari struktur saraf yang terkena. (de Boer, 2018)

B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Nyeri

Ada berapa faktor yang mempengaruhi nyeri, antara lain:

1. Usia

Usia merupakan variable penting yang mempengaruhi nyeri, khususnya pada anak dan lansia. (Smeltzer & Bare, 2015).

2. Kebudayaan

Keyakinan dan nilai-nilai budaya mempengaruhi cara individu mengatasi nyeri. Menurut Clancy dan Vicar (Cit Perry & Potter) menyatakan bahwa sosialisasi budaya menentukan perilaku psikologis seseorang. Hal ini dapat mempengaruhi pengeluaran fisiologis opiate endogen sehingga terjadilah persepsi nyeri. . (Smeltzer & Bare, 2015).

3. Ansietas

Hubungan antara nyeri dan ansietas bersifat kompleks. Ansietas sering kali meningkatkan persepsi nyeri, tetapi nyeri juga dapat menimbulkan suatu perasaan ansietas. . (Smeltzer & Bare, 2015).


4. Keletihan

Keletihan disertai kesulitan tidur, persepsi nyeri terasa lebih berat dan jika mengalami suatu proses periode

tidur yang baik maka nyeri berkurang. (Smeltzer & Bare, 2015).

C. Pengukuran Skala Nyeri

Intensitas nyeri (skala nyeri) adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri yang dirasakan oleh seseorang tersebut, pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan individual dan kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda. Nyeri dinilai berdasarkan perilaku manusia sehingga latar belakang mempengaruhi ekspresi dan pemahaman terhadap nyeri. Penilaian skala nyeri dapat dibagi menjadi dua yaitu pasien yang memiliki kemampuan verbal dan dapat melaporkan sendiri rasa sakitnya (*self reported*) dan pasien dengan ketidakmampuan verbal.



Gambar 4.1 Skala Pengukuran Nyeri VAS
(Sumber : Sulisty, 2016)

Keterangan:

1. Tidak Neri (Skala 0): Tidak Nyeri

2. Nyeri Ringan (Skala 1-3):

Secara objektif pasien dapat berkomunikasi dengan baik.

3. Nyeri Sedang (Skala 4-6):

Secara objektif pasien mendesis, menyeringai, dapat menunjukkan lokasi nyeri, dan dapat mengikuti perintah dengan baik.

4. Nyeri Berat (Skala 7-9):

Secara objektif pasien terkadang tidak dapat mengikuti perintah tetapi masih dapat merespon.

5. Nyeri Sangat Berat (Skala 10):

Pasien sudah tidak mampu lagi berkomunikasi atau memukul.

D. Nyeri Punggung pada Ibu Hamil Trimester III

Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri punggung pada kehamilan yaitu:

1. Usia Ibu

Usia sangat menentukan status kesehatan ibu. Ibu hamil dikatakan beresiko tinggi apabila ibu hamil berusia dibawah 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Perbedaan

perkembangan akan mempengaruhi respon terhadap nyeri. Perkembangan tersebut yaitu secara fisik dan organ-organ pada usia kurang dari 20 tahun belum siap untuk melaksanakan tugas reproduksi dan belum matang secara psikis. Usia muda atau kurang dari 20 tahun akan sulit mengendalikan nyeri. Usia reproduksi lebih dari 35 tahun, fisik dan fungsi organ-organ tubuh terutama sistem reproduksi mengalami penurunan (Judha, 2012).

2. Paritas

Paritas adalah jumlah persalinan yang pernah dialami oleh seorang ibu selama hidupnya. Menurut hasil penelitian terdapat hubungan antara paritas dengan nyeri punggung pada kehamilan. Ibu hamil yang memiliki paritas tinggi yaitu lebih 5 atau sama dengan empat (*grande multi gravida*) lebih beresiko mengalami nyeri punggung bawah. Hal tersebut akibat setiap kehamilan yang disertai persalinan akan menyebabkan kelainan pada uterus, dalam hal ini terjadi kerusakan pada pembuluh darah dinding uterus yang mempengaruhi sirkulasi nutrisi ke janin. Hal tersebut dapat menurunkan

fungsi otot-otot dan organ reproduksi (Mirnawati, 2010; Salam, 2016).

3. Usia Kehamilan

Keluhan nyeri punggung sebagian besar dialami oleh ibu hamil trimester III. Hal ini disebabkan karena penambahan umur kehamilan menyebabkan perubahan postur pada kehamilan 10 sehingga terjadi pergeseran pusat gravitasi tubuh ke depan, sehingga jika otot perut lemah menyebabkan lekukan tulang pada daerah lumbar dan menyebabkan nyeri punggung (Ulfah, 2017).

4. Pekerjaan

Pekerjaan ibu dapat dihubungkan dengan kondisi kelelahan yang dialami ibu. Kelelahan secara tidak langsung dapat memperburuk persepsi nyeri. Selain itu, kelelahan menyebabkan sensasi nyeri semakin intensif dan menurunkan mekanisme koping (Ulfah, 2017).

5. Olahraga

Latihan fisik merupakan hal yang penting dalam menentukan kesehatan ibu dan bayi. Salah satu olahraga selama kehamilan yang aman untuk ibu hamil adalah senam hamil dan prenatal yoga. Senam hamil akan membantu dalam memperkuat otot-otot abdomen dan

pelvis yang akan sangat berguna saat melahirkan sedangkan prenatal yoga membantu dalam menyeimbangkan tubuh, jiwa, pikiran sehingga menciptakan persalinan yang lancar, nyaman dan minim trauma (Judha, 2012)

6. Riwayat nyeri terdahulu

Setiap individu belajar dari pengalaman nyeri. Pengalaman nyeri sebelumnya tidak selalu berarti bahwa individu tersebut akan menerima nyeri dengan lebih mudah pada masa yang akan datang.

Riwayat nyeri pinggang pada kehamilan sebelumnya akan mempengaruhi kejadian nyeri pinggang pada kehamilan sekarang (Awlya, 2020).

7. Pola kebiasaan aktivitas

Nyeri punggung juga dapat merupakan akibat kebiasaan postur yang salah. Membungkuk yang berlebihan, berjalan tanpa 11 istirahat, angkat beban, terutama bila semua kegiatan ini dilakukan saat wanita tersebut sedang lelah dan duduk dengan bersandar lama ini akan mempengaruhi stabilitas otot panggul dan keseimbangan rahim sehingga tulang

belakang akan memendek dan keluhan nyeri punggung bawah sering terjadi (Aprilia dan Setyorini, 2017).

8. Budaya

Latar belakang budaya dan suku mempengaruhi keyakinan, nilai, dan kebiasaan individu. Budaya mempengaruhi cara melaksanakan kesehatan pribadi. Kultur atau budaya memiliki peran yang kuat untuk menentukan faktor sikap individu dalam mempersepsikan dan merespon nyerinya (Judha,2012).

E. Etiologi Nyeri Punggung pada Kehamilan

Penyebab utama dari nyeri punggung disebabkan oleh faktor mekanik dan dapat di klasifikasikan menjadi dua tipe yaitu:

1. Statik

Nyeri punggung bawah pada tipe ini terjadi karena kesalahan postur seperti kepala menunduk ke depan, bahu melengkung ke depan, perut menonjol ke depan dan lordosis lumbal berlebihan.

2. Dinamik

Dalam keadaan normal, gerakan tulang belakang berlangsung dan terintegrasi dengan baik dan terjadi pembatas oleh otot dan ligament. Agar tidak menimbulkan keluhan nyeri, gerakan melanggar keterbatasan-keterbatasan ini (Sunarto, 2008).

Pengaruh hormon pada kehamilan dapat membawa dampak pada system musculoskeletal. Hormon relaksin yang diproduksi selama kehamilan mengubah komposisi kolagen, substansi yang terdapat pada kapsul sendi, ligament, dan jaringan penyambung fibrosa. Kolagen yang telah berubah bentuk ini memiliki elastisitas dan daya ekstensi yang lebih besar, sendi-sendi menjadi relaks dan ruang abdomen menjadi bertambah.

Seiring dengan pembesaran uterus, pusat gravitasi berpindah ke arah depan dan perpindahan ini menyebabkan ibu harus menyesuaikan posisinya berdiri. Postur ini akan bergantung pada kekuatan otot, penambahan berat badan, sifat relaksasi sendi, kelelahan,

serta postur sebelum hamil. Perubahan ini seringkali memicu lengkung lumbar (lordosis) dan lengkung kompensasi spinalis torakik (kifosis). Mekanisme ini terjadi antara bulan ke-4 dan ke-9 masa kehamilan dan terus berlangsung sampai 12 minggu masa pascanatal (Brayshaw, 2007).

F. Mekanisme Terjadinya Nyeri Punggung pada Kehamilan

Pada kehamilan trimester III terjadi adaptasi psikologis dan adaptasi fisiologis. Pembesaran uterus yang terjadi pada adaptasi fisiologis mengakibatkan peningkatan kelengkungan dari vertebrae lumbosacral. Selain itu hormon steroid yang bersirkulasi, menghaluskan dan merelaksasi sendi-sendi pelvic. Pembesaran uterus meregangkan otot-otot abdominal. Penambahan berat badan menimbulkan kemiringan pada pelvic anterior secara bertahap sehingga kelengkungan spinal bertambah (Old, 1992).

Nyeri punggung selama kehamilan sebagian disebabkan oleh hormon kehamilan yang mengendurkan sendi, ikatan tulang dan otot di pinggul sebagai persiapan proses

persalinan, dan ditambah lagi dengan meningkatnya berat badan janin saat bertambah besar. Hal ini menyebabkan ibu hamil mencondongkan perut sehingga menambah kelengkungan pada bagian bawah punggung (Tiran, 2007).

Lordosis progresif pada kehamilan terjadi untuk mengkompensasi posisi anterior uterus yang membesar, lordosis menggeser pusat gravitasi ke belakang pada tungkai bawah. Selama kehamilan terdapat peningkatan mobilitas sendi sakroiliaka, sakrokoksigeal, dan sendi pubis yang kemungkinan diakibatkan oleh perubahan hormonal. Mobilitas tersebut mungkin menyebabkan perubahan postur ibu, dan selanjutnya mengakibatkan rasa tidak nyaman di punggung bawah, terutama pada akhir kehamilan (Cunningham, 2005).

Pada kehamilan, akan terjadi perubahan pelvis menjadi sedikit berputar ke depan karena pengaruh hormonal dan laxity (hipermobilitas) ligament. Pada keadaan hiperekstensi tulang belakang, terjadi pergesekan antara kedua facet dan menjadikan tumpuan berat badan, sehingga permukaan sendi tertekan; keadaan ini akan menimbulkan rasa nyeri,

kadang-kadang dapat mengiritasi saraf ischiadicus; dan apabila terjadi penyempitan pada bantalan tulang belakang, nyeri akan bertambah hebat. Keadaan ini akan menimbulkan ketidakseimbangan kekuatan antara otot perut dan otot punggung.

Sendi yang membentuk tulang belakang dan panggul sebagian merupakan sendi sindesmosis. Sendi sakroiliak berbentuk huruf L, permukaan sendinya tidak simetris, tidak rata dan posisinya hampir dalam bidang sagital serta permukaan tulang sakrum lebih cekung. Gerakan yang terjadi adalah rotasi dalam jarak gerak terbatas . Pelvis menerima beban dari tulang belakang dengan distribusi gaya merupakan ring tertutup. Pada kehamilan gerak sendi ini dapat meningkat karena pengaruh hormonal. Panggul dan sakrum yang bergerak ke depan menyebabkan posisi sendi sakroiliaka juga berubah, dikombinasi dengan adanya laxity (hipermobilitas) akan menyebabkan keluhan- keluhan pada sendi yang lain.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab yang paling dominan menyebabkan Nyeri Pinggang Bawah saat kehamilan adalah oleh adanya ketidakseimbangan kerja otot bagian belakang dan bagian depan.

Dengan bertambahnya usia kehamilan maka jelas bahwa pertambahan sudut lengkungan tulang belakang juga semakin meningkat yang dikenal dengan nama Sway Back, terjadi gerak pelvis ke depan sehingga menyebabkan jaringan pengikat sendi menegang dan bilamana posisi yang salah tersebut berlangsung lama akan menimbulkan ketegangan pada jaringan ikat sendi dan otot, sehingga menimbulkan kelelahan pada otot-otot perut (Suharto, 2001).

G. Manajemen Nyeri Punggung pada Kehamilan

1. Metode Farmakologi

Manajemen nyeri dengan metode farmakologi merupakan cara menghilangkan rasa nyeri dengan pemberian obat-obatan analgesia yang disuntikan melalui infus intravena, inhalasi pernafasan atau dengan

blokade saraf yang menghantarkan rasa sakit. Syarat terpenting dalam tindakan ini adalah tidak membahayakan dan menimbulkan efek samping, baik bagi ibu maupun bayinya (Suwondo dkk., 2017).

2. Metode Non Faramokologi

Menurut Brunner dan Suddarth (2012) dalam Safitri (2019), metode pengontrolan nyeri secara nonfarmakologi sangat penting karena tidak membahayakan, metode ini seperti:

a. Ditraksi

Memfokuskan perhatian pasien pada suatu selain pada nyeri merupakan mekanisme yang bertanggung jawab pada teknik kognitif afektif lainnya.

b. Relaksasi

Seluruh sistem saraf, organ tubuh dan panca indra dapat beristirahat, untuk melepaskan ketegangan yang ada dan pada dasarnya tetap sadar, salah satunya dengan control pernafasan.

c. Pemijatan/massage

Massage adalah stimulasi kutaneus tubuh secara umum, sering dipusatkan pada daerah pinggang dan bahu. Massage menstimulasi reseptor tidak nyeri.

Massage membuat ibu hamil lebih nyaman karena memberikan relaksasi otot.

d. Hypnosis

Efek untuk menurunkan nyeri akut dan kronis teknik ini mungkin membantu pereda nyeri trauma dalam periode sulit.

e. Memberi rangsangan alternatif yang kuat

Penanganannya berupa kompres hangat dan kompres dingin.

f. Prenatal yoga

Prenatal yoga adalah salah satu modifikasi hatha yoga yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Tujuan prenatal yoga adalah mempersiapkan ibu hamil secara fisik, mental, dan spiritual untuk menghadapi proses persalinan. Gerakan peregangan otot dalam prenatal yoga dapat meminimalisasi bahkan menghilangkan ketidaknyamanan yang seringkali dirasakan selama masa kehamilan seperti heart burn, nyeri di pinggul, atau tulang rusuk, kram di kaki atau sakit kepala (Aprilia dan Setyorini, 2017).

g. Senam hamil


Senam hamil dapat memberikan manfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik ibu hamil, memperlancar peredaran darah, mengurangi keluhan kram atau pegalpegal, dan mempersiapkan pernafasan, aktivitas otot dan panggul untuk menghadapi proses persalinan (Fitriani, 2018).

H. Pengaruh Prenatal Yoga terhadap Nyeri Punggung

Prenatal Yoga atau Yoga hamil merupakan bentuk modifikasi pengobatan fisik dan spiritual yang sudah dilakukan lebih dari 5000 tahun yang lalu. Teknik yang digunakan pada saat yoga membawa keseimbangan pada aspek tubuh, pikiran, dan kepribadian yang berbeda sehingga penggunaanya penuh dengan energi, kekuatan dan kejelasan tujuan hidup (Tia Pratigny, 2014)

Prenatal yoga berpengaruh terhadap penurunan nyeri punggung pada ibu hamil trimester III karena dapat membantu ibu mengurangi rasa ketidaknyamanan dan sakit pada daerah punggung selama proses kehamilan.

Dengan melakukan prenatal yoga secara rutin akan menghasilkan hasil yang signifikan terhadap penurunan nyeri punggung ibu hamil.



BAB 5

Penutup

Prenatal yoga atau yoga dalam kehamilan merupakan bentuk modifikasi pengobatan fisik dan spiritual dengan membawa keseimbangan pada aspek tubuh, pikiran dan kepribadian yang berbeda sehingga penggunaanya penuh dengan energy, kekuatan dan kejelasan tujuan hidup (Tia Pratigny, 2014).

Yoga dalam kehamilan menggabungkan postur khusus dan Teknik yang bermanfaat bagi ibu hamil dan membantu menghilangkan ketidaknyamanan yang disebabkan perubahan tubuh selama kehamilan (Darwitri, 2021).

Manfaat prenatal yoga yaitu:

1. Mengurangi ketidaknyamanan pada ibu hamil: ibu hamil yang sudah mengikuti kelas prenatal yoga, mengatakan bahwa prenatal yoga dapat mengurangi keluhan fisik

seperti, mengurangi kram pada kaki, pegal-pegal dikaki dan nyeri pinggang, badan terasa lebih ringan serta lebih nyaman. Ibu hamil trimester III yang sudah melakukan prenatal yoga mengalami penurunan Intensitas nyeri punggung yang dirasakan ibu hamil mengalami penurunan setelah diberikan prenatal yoga

2. Kecemasan: Kecemasan muncul pada ibu primigravida (hamil yang pertama) karna ibu belum memiliki pengalaman sehingga muncul pertanyaan dan bayangan apakah dapat melahirkan normal, cara mengejan yang benar, apakah akan terjadi sesuatu saat melahirkan, atau apakah bayi lahir selamat, akan semakin sering muncul dalam pikiran ibu hamil. Untuk mengatasi kecemasan tersebut salah satunya adalah kepercayaan tentang persalinan serta perasaan menjelang persalinan
3. Stress: Intervensi yoga akan berdampak positif pada ibu yang mengalami stres, hal ini terjadi karna berkurangnya nada simpatik, yang melemaskan arteri uterina, sehingga menghasilkan sirkulasi darah yang lebih baik
4. Persiapan persalinan: Prenatal yoga meningkatkan kesiapan proses persalinan, ibu sudah mengetahui informasi persalinan, tubuh ibu sudah siap melakukan proses

persalinan karena ibu yakin tubuh sudah lebih lentur, ibu telah memahami teknik pernafasan yang benar dalam menghadapi kontraksi, serta ibu mendapatkan adanya afirmasi positif yang selama ikut prenatal yoga

5. Hubungan sosial: Prenatal yoga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesempatan keterhubungan social bagi peserta dengan orang lain, baik dengan teman-teman mereka dalam kelompok, atau mungkin yang lebih penting, bayi mereka sendiri dalam kandungan
6. Komplikasi maternal: Yoga yang dilakukan selama masa kehamilan dilaporkan dapat menurunkan risiko komplikasi maternal, seperti diabetes melitus gestasional dan preeklamsia. Pada periode kehamilan membuat sebagian ibu hamil mengalami stress, dan yoga dapat membantu pikiran tenang dan otot ibu hamil menjadi lebih rileks sehingga terhindar dari peningkatan tekanan darah.

Daftar Pustaka

- Annisa, 2021. Pengaruh Senam Prenatal Yoga Terhadap Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Trimester Iii Dalam Menghadapi Persalinan
- Amalia, A. 2015. Tetap Sehat dengan Yoga. Jagakarsa Diganjur: Panda Media.
- Aprilia. 2010, Hipnostetri: Rileks, Nyaman, dan Aman Saat Hamil dan Melahirkan, Jakarta: Penerbit Gagas Media
- Dartiwen. (2019). *Asuhan Kebidanan pada Kehamilan*. CV Andi Offset.
- Darwitri, 2021. Prenatal Yoga Menurunkan Keluhan Fisik pada Ibu Hamil Trimester II dan III.
- Diana, 2023. Efektifitas Prenatal Yoga Terhadap Nyeri Pinggang Ibu Hamil Trimester III Di Puskesmas Modung Bangkalan
- Fitriani, L. 2019. Efektivitas Senam Hamil dan Yoga Hamil terhadap Penurunan Nyeri Punggung pada Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Pekkabata. *J-KESMAS J. Kesehatan Masy.* 4, 72.
- Judha, Mohammad. dkk, 2012. Teori Pengukuran Nyeri dan Nyeri Persalinan. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kudarti. (2019). Kelas Prenatal Yoga Mengatasi Nyeri Punggung dan Kram: Persepsi Ibu Hamil Trimester 3. *Jurnal Publikasi Kebidanan*,

- Manuba,I. B. G. (2010). Gawat_Darurat Obstetri Ginekologi dan Obstetri Ginekologi Sosial untuk Profesi Bidan. Jakarta: EGC.
- Melicha, 2022. Efektivitas Prenatal Yoga Terhadap Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil Trimester III
- Muzayyana, 2023. Efektifitas Prenatal Yoga Terhadap Pengurangan Ketidaknyamanan Dalam Kehamilan Trimester III di Puskesmas Ollot Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang
- Pattiyah, 2021. Pengaruh Senam Prenatal Yoga Terhadap Kenyamanan Ibu Hamil Trimester III
- Perdoman, 2022. Prenatal Yoga Untuk Mengurangi Ketidaknyamanan Kehamilan Trimester 3
- Rafika, R. 2018. Efektivitas Prenatal Yoga terhadap Pengurangan Keluhan Fisik pada Ibu Hamil Trimester III. *J. Kesehat.9, 86.*
- RI, Kemenkes. 2016. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015.* Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Saljus, 2024. Hubungan Senam Hamil Dengan Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil Trimester III
- Smeltzer, Bare. 2002. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. Brunner Suddarth, Vol. 1. Jakarta: EGC
- Sutanto, A.V. & Fitriana, Y. Asuhan Pada Kehamilan. (Pustaka Baru Press, 2017).
- Ulfah, M., & Wirakhmi, I. N. (2017). Perbedaan Manfaat Sebelum Dan Sesudah Latihan Pelvic Tilt Terhadap Nyeri Punggung Ibu Hamil Trimester III. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Kesehatan*, 15(2), 80–83

- Walyani, E. S. 2015. Asuhan Kebidanan dan Kehamilan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wulandari, S. (2021). Ketidaknyamanan Ibu Hamil Trimester 3. *Ketidaknyamanan Ibu Hamil Trimester 3*
- Wijaya, K. A. (2018). *Pengaruh Yoga Prenatal terhadap Intensitas NyeriPunggung pada Ibu Hamil Trimester II dan III di Puskesmas Mlati II Sleman Tahun 2018.*
- Yayuk & Ika. 2023. Prenatal Yoga terhadap Tingkat Kesehatan Mental Ibu Hamil



Glosarium

B

Butterfly Stretch atau dikenal sebagai gerakan kupu-kupu, adalah peregangan yang populer untuk meningkatkan fleksibilitas otot panggul dan paha

C

Cat-Cow Pose adalah pose yang terdiri dari dua gerakan yang mengalir secara bergantian, membentuk gerakan yang lembut dan mengalir antara posisi kucing (Cat Pose) dan posisi sapi (Cow Pose). Cat-Cow Pose membantu mengurangi ketegangan di bagian belakang, meningkatkan kelenturan tulang belakang, serta membantu melancarkan peredaran darah.

Child's Pose adalah gerakan yoga yang populer dan sering dipraktikkan karena efek menenangkan dan merilekskan bagi pikiran dan tubuh.

D

Decidua merupakan sebutan yang diberikan kepada endometrium pada kehamilan

K

Kehamilan merupakan penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Maka, dapat disimpulkan bahwa kehamilan merupakan bertemunya sel telur dan

sperma di dalam atau diluar Rahim dan berakhir dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir.

N

Nyeri punggung adalah nyeri yang terjadi pada area lumbosakral. Nyeri punggung juga bisa disebabkan karena perubahan hormonal yang menimbulkan perubahan pada jaringan lunak penyangga dan penghubung sehingga menurunnya *elastisitas* dan *fleksibilitas* otot.

P

Pelvic Tilts adalah gerakan sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan tulang belakang dan otot panggul.

Pseudocyesis (kehamilan palsu) merupakan keyakinan dimana seorang wanita merasakan dirinya sedang hamil namun sebenarnya ia tidak hamil.

Y

Yoga dalam kehamilan menggabungkan postur khusus dan teknik yang bermanfaat bagi ibu hamil dan membantu menghilangkan ketidaknyamanan yang disebabkan perubahan tubuh selama kehamilan. Terlebih lagi, yoga yang dilakukan ibu hamil dapat membuat tubuh lebih lentur, nyaman, menunjang sirkulasi darah, mengatasi sakit punggung, pinggang hp/photon, pegal dan bengkak

Profil Penulis



Sri ilawati, SST, M.Kes.

Lahir di Sukarama, 17 Juli 1988. Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Program Studi Kebidanan di Akademi Kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai. Setelah menyelesaikan Studi di Akademi Kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai penulis melanjutkan Studi Diploma IV Jurusan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia Medan, Kemudian Melanjutkan Study Magister Kesehatan Masyarakat Di Universitas Respati Indonesia di Jakarta. Penulis Memiliki Profesi Sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan di Program Studi S1 Kebidanan.



Novi Susanti, SST., M.Kes.

Lahir di Medan, 21 Nopember 1989. Penulis menyelesaikan program Diploma III Kebidanan di Akademi Kebidanan Deli Husada Delitua. Setelah lulus dari program Diploma III kebidanan, penulis melanjutkan studi di Program Diploma IV Bidan Pendidik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia. Setelah menyelesaikan program Diploma IV Bidan pendidik, penulis melanjutkan studi magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Sumatera Utara dan lulus Tahun 2015. Sambil menyusun buku ini, penulis memiliki kesibukkan lain sebagai Dosen di Program Studi Kebidanan Universitas Deztron Indonesia. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan workshop.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

novisusanti7788@gmail.com

Motto: "Failure is the key to success"

Profil Penulis



Namiroh Falah Hasibuan, S.Tr.Keb., MKM

Lahir di Medan 10 November 1992
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Program Studi Kebidanan di Akademi Kebidanan
Bakti Inang Persada Medan. Setelah
menyelesaikan Studi di Akademi Kebidanan Bakti
Inang Persada Medan penulis melanjutkan Studi
Diploma IV Jurusan Kebidanan di Institut

Kesehatan Helvetia Medan, Kemudian Melanjutkan Study Magister
Kesehatan Masyarakat Di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Penulis
Memiliki Profesi Sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Sehati Medan di Program Studi Bidan Profesi.

SINOPSIS BUKU

Kehamilan merupakan proses alami dan normal. Selama hamil seorang ibu mengalami perubahan-perubahan fisik yang terjadi maupun psikologis. Perubahan tersebut menyebabkan ibu hamil mengalami ketidaknyamanan.

Dalam buku ini di bahas tentang cara mengurangi nyeri punggung pada ibu hamil. Nyeri punggung pada ibu hamil sering terjadi pada trimester III. Dalam buku ini menyajikan

tentang Prenatal Yoga yang dapat mengurangi nyeri Punggung pada ibu hamil dan juga merupakan olahraga yang sangat aman dan efektif untuk membantu ibu hamil mengurangi nyeri punggung bawah. Dengan melakukan prenatal yoga secara rutin akan menghasilkan hasil yang signifikan terhadap penurunan nyeri punggung ibu hamil.

Prenatal yoga juga merupakan modifikasi dari gerakan senam yoga yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Prenatal yoga memiliki efek positif untuk ibu hamil yaitu mengurangi stress, kecemasan, rasa sakit saat kehamilan, ketidaknyamanan dan mengurangi nyeri persalinan.

.Prenatal yoga efektif menurunkan nyeri punggung bawah pada ibu hamil, dilakukan dengan durasi 30 – 60 menit dan frekuensi satu minggu sekali selama dua minggu Teknik yang digunakan pada saat yoga membawa keseimbangan pada aspek tubuh, pikiran, dan kepribadian yang berbeda sehingga penggunaanya penuh dengan energi , kekuatan dan kejelasan tujuan hidup Nyeri punggung disebabkan karena bertambahnya berat badan ibu hamil, dan ketidakstabilan sendi-sendi yang diakibatkan melenturnya ligament-ligament, gangguang kurva spinlis, dan meregangnya otot abdomen. Prenatal yoga juga memiliki banyak manfaat yaitu Mengurangi ketidaknyamanan pada ibu hamil, kecemasan, Stress, persiapan persalinan, hubungan sosial dan komplikasi maternal.

Kehamilan merupakan proses alami dan normal. Selama hamil seorang ibu mengalami perubahan-perubahan fisik yang terjadi maupun psikologis. Perubahan tersebut menyebabkan ibu hamil mengalami ketidaknyamanan. Dalam buku ini di bahas tentang cara mengurangi nyeri punggung pada ibu hamil. Nyeri punggung pada ibu hamil sering terjadi pada trimester III. Dalam buku ini menyajikan tentang Prenatal Yoga yang dapat mengurangi nyeri Punggung pada ibu hamil dan juga merupakan olahraga yang sangat aman dan efektif untuk membantu ibu hamil mengurangi nyeri punggung bawah. Dengan melakukan prenatal yoga secara rutin akan menghasilkan hasil yang signifikan terhadap penurunan nyeri punggung ibu hamil. Prenatal yoga juga merupakan modifikasi dari gerakan senam yoga yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Prenatal yoga memiliki efek positif untuk ibu hamil yaitu mengurangi stress, kecemasan, rasa sakit saat kehamilan, ketidaknyamanan dan mengurangi nyeri persalinan. Prenatal yoga efektif menurunkan nyeri punggung bawah pada ibu hamil, dilakukan dengan durasi 30 – 60 menit dan frekuensi satu minggu sekali selama dua minggu Teknik yang digunakan pada saat yoga membawa keseimbangan pada aspek tubuh, pikiran, dan kepribadian yang berbeda sehingga penggunaanya penuh dengan energi, kekuatan dan kejelasan tujuan hidup Nyeri punggung disebabkan karena bertambahnya berat badan ibu hamil, dan ketidakstabilan sendi-sendi yang diakibatkan melenturnya ligament-ligament, gangguan kurva spinlis, dan meregangnya otot abdomen. Prenatal yoga juga memiliki banyak manfaat yaitu Mengurangi ketidaknyamanan pada ibu hamil, kecemasan, Stress, persiapan persalinan, hubungan sosial dan komplikasi maternal.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta