

史济怀《数学分析教程》下册习题整理

OrangeCat

Jan.27th 2026 - ???

1 多重积分

1.1 矩形区域上的积分

习题1 若 f 和 g 都在 $[0, 1]$ 上可积, 证明 $f(x)g(y)$ 在 $[0, 1]^2$ 上可积, 并且

$$\iint_{[0,1]^2} f(x)g(y) dx dy = \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 g(y) dy \right).$$

解答: 从基本定义出发, $f(x)g(y)$ 在 $[0, 1]^2$ 上可积 $\Leftrightarrow \exists a \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \left| \sum_{i=1}^k f(x_i)g(y_i) \sigma_i - a \right| = 0.$$

σ_i 为小块面积。我们将 $[0, 1]^2$ 切成 n^2 块, 每块是

$$\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \times \left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n} \right] \quad (1 \leq i, j \leq n, \text{ 边界不计}).$$

在第 (i, j) 块取点 (x_i, y_j) , 则有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{n^2} f(x_i)g(y_j) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n g(y_j) \right).$$

而由一元可积性,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) dx, \quad \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n g(y_j) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g(y) dy.$$

故

$$\iint_{[0,1]^2} f(x)g(y) dx dy = \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 g(y) dy \right). \quad \square$$

习题2 计算积分

$$\iint_{[0,1] \times [0,1]} e^{x+y} dx dy.$$

解答: 直接运用上一题结论,

$$\iint_{[0,1]^2} e^{x+y} dx dy = \left(\int_0^1 e^x dx \right) \left(\int_0^1 e^y dy \right) = (e-1)^2. \quad \square$$

习题3 设 $a > 0$, $I = [-a, a] \times [-a, a]$, 求证:

$$\iint_I \sin(x+y) dx dy = 0,$$

并试从几何上说明这一结果。

解答:

$$\begin{aligned} \iint_I \sin(x+y) dx dy &= \iint_I (\sin x \cos y + \sin y \cos x) dx dy \\ &= \left(\int_{-a}^a \sin x dx \right) \left(\int_{-a}^a \cos y dy \right) + \left(\int_{-a}^a \sin y dy \right) \left(\int_{-a}^a \cos x dx \right). \end{aligned}$$

而 $\sin t$ 是奇函数, 故

$$\int_{-a}^a \sin x dx = \int_{-a}^a \sin y dy = 0.$$

因此积分值为0。□

几何上: (x_0, y_0) 处与 $(-x_0, -y_0)$ 处函数值相反, 区域关于原点中心对称且有界, 故积分值为0。

习题4 证明定理10.1.8。

「定理10.1.8」设 f 在 $I = [a, b] \times [c, d]$ 上有界, 那么以下四个条件等价:

- (1) f 在 I 上可积;
- (2) $\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k \omega_i \sigma_i = 0$, 其中 $\omega_i = M_i - m_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$), M_i 和 m_i 分别为 f 在 σ_i 上的上、下确界;
- (3) 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 I 的一个分割 π , 使得 $\overline{S}(f, \pi) - \underline{S}(f, \pi) < \varepsilon$;
- (4) $\int_I f d\sigma = \overline{\int_I f d\sigma}$.

解答: 由基本定义有 $(2) \Leftrightarrow (3) \Leftrightarrow (4)$.

$$(1) \Leftrightarrow \exists a \in \mathbb{R}, \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \left| \left(\sum_{i=1}^k f(x_i, y_i) \cdot \sigma_i \right) - a \right| = 0. \quad x_i, y_i \text{ 为 } \sigma_i \text{ 对应面积内任一点.}$$

$$\Leftrightarrow \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k f(x_i, y_i) \cdot \sigma_i = a. \quad \text{我们证明这与(4)等价.}$$

$$(1') \Rightarrow (4): \int_I f d\sigma = \min \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k f(x_i, y_i) \cdot \sigma_i = a = \max \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k f(x_i, y_i) \cdot \sigma_i = \overline{\int_I f d\sigma}.$$

$$(4) \Rightarrow (1'): \text{取 } a := \int_I f d\sigma = \overline{\int_I f d\sigma}. \Rightarrow \int_I f d\sigma \leq \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k f(x_i, y_i) \cdot \sigma_i = \overline{\int_I f d\sigma} \Rightarrow \text{积分值为 } a$$

故 $(1) \Leftrightarrow (1') \Leftrightarrow (4)$. □

习题5 证明: 闭矩形上的连续函数可积。

解答: 由连续性, 对任意给定 $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $x_1, x_2 \in I$ 且 $\|x_1 - x_2\| < \delta$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

将 I 切成若干小矩形 R_1, R_2, \dots, R_t , 使每个 R_i 的直径 $< \delta$, 则对任意 $x_1, x_2 \in R_i$ 有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, 即每块的振幅 $\omega_i < \varepsilon$ 。于是

$$\overline{S}(f, \pi) - \underline{S}(f, \pi) = \sum_{i=1}^t \omega_i \sigma_i < \varepsilon \sum_{i=1}^t \sigma_i = \varepsilon \text{Area}(I).$$

故可令上、下和之差任意小, 由定理10.1.8知 f 在 I 上可积。□

1.2 Lebesgue定理

习题1 设点列 $\{p_n\}$ 在 \mathbb{R}^2 中有极限, 求证: 点集 $B = \{p_n\}$ 是零面积集。

解答: 设点列 $\{p_n\}$ 极限是 p 。对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n \in \mathbb{Z}^+$, $\forall N > n$ 有

$$d(p_N, p) < \varepsilon$$

而 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 是有限点集, 面积为0。

$$\Rightarrow B \subset \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \cup B(p, \varepsilon),$$

其中 $B(p, \varepsilon)$ 为以 p 为中心、半径 ε 的圆盘，于是

$$\text{Area}(B) \leq \pi \varepsilon^2.$$

而 ε 可任取，故 B 是零面积集。□

习题2 设有界集 $B \subset \mathbb{R}^2$ 且 B' 是零面积集，求证： \overline{B} 也是零面积集。

解答：我们只用考察并证明 $\overline{B} \setminus B'$ 也是零面积集即可。我们证明一个加强结论：这个集合只有有限个点。

若非如此，设 $\overline{B} \setminus B'$ 是无限点集。由于 B 有界， $\overline{B} \setminus B'$ 也有界，设为 $[-N, N] \times [-N, N]$ 。

将 $[-N, N] \times [-N, N]$ 划分成4份：

$$[-N, 0] \times [-N, 0], \quad [-N, 0] \times [0, N], \quad [0, N] \times [-N, 0], \quad [0, N] \times [0, N].$$

由抽屉原理， $\overline{B} \setminus B'$ 在其中一个小区域里面积有无穷个点；再细分四份，仍有无穷个点。

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists (x_0, y_0) \in (-N, N) \times (-N, N)$ 使得 $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon] \times [y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon] \cap (\overline{B} \setminus B')$ 是无穷。

\Rightarrow 存在极限点在 $\overline{B} \setminus B'$ 内，但这与 B' 的定义矛盾！□

习题3 证明： $[0, 1]^2$ 中的全体有理点所成的集不是零面积集，但是零测集。

解答：先证它不是零面积集：若是，则我们取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$ ，存在有限个长方形 P_1, P_2, \dots, P_m

使得有理点集被 $\bigcup_{i=1}^m P_i$ 包含。且

$$\text{Area}\left(\bigcup_{i=1}^m P_i\right) \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \text{Area}\left([0, 1]^2 \setminus \bigcup_{i=1}^m P_i\right) \geq \frac{1}{2}.$$

而

$$\left([0, 1]^2 \setminus \bigcup_{i=1}^m P_i\right)^\circ$$

是面积为正的开集。

任取 $([0, 1]^2 \setminus \bigcup_{i=1}^m P_i)^\circ$ ， $\exists \varepsilon_0 > 0$ ，使得

$$B(p_0, \varepsilon_0) \subset [0, 1]^2 \setminus \bigcup_{i=1}^m P_i.$$

由有理点稠密性矛盾，故证毕。零测性由可数性显然。□

习题4 设闭矩形 $J \subset I$ ，且 f 在 I 上可积，求证： f 在 J 上也可积。

解答：若 f 在 I 上可积，由定理10.1.8，我们将条件转写成叙述为(2)：

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k \omega_i \sigma_i = 0,$$

其中 $\omega_i = M_i - m_i$ 为第 i 块区域的上、下确界之差， σ_i 是 I 的一个划分。

我们只需要在划分的时候“稍加留意”，把 J 的边界也作为划分痕迹：

$$\Rightarrow \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k \omega_i \sigma_i \geq \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{j=1}^t \omega_{J(j)} \sigma_{J(j)},$$

$J(1), J(2), \dots, J(t)$ 是 J 在划分中的对应块。故有

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{j=1}^t \omega_{J(j)} \sigma_{J(j)} = 0.$$

由定理10.1.8, (2) \Rightarrow (1)有 f 在 J 上可积。□

习题5 设在 I 上可积函数 $f > 0$, 求证: $\int_I f d\sigma > 0$ 。

解答: 堪忧, 这还要证? Trivial. □

习题6 研究定义在区域 $[0, 1]^2$ 上的函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \sin \frac{1}{xy}, & x \neq 0 \text{ 且 } y \neq 0, \\ 0, & x = 0 \text{ 或 } y = 0, \end{cases}$$

的可积性。

解答: 原函数在定义域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 的不连续点集为

$$\{0\} \times [0, 1] \cup [0, 1] \times \{0\}.$$

这明显是零测集 (甚至是零面积集), 从而由Lebesgue定理, f 在 $[0, 1]^2$ 上可积。□

习题7 设 I 是一个有界的矩形, $B = \{p_1, p_2, \dots, p_n, \dots\} \subset I$, 定义函数

$$f(p) = \begin{cases} 0, & p \notin B, \\ \frac{1}{n}, & p = p_n \ (n \in \mathbb{N}^*). \end{cases}$$

研究函数 f 在 I 上的可积性。

解答: B 至多可数从而零测。间断点是零测集, 由Lebesgue定理知可积。□

习题8 设函数 f 和 g 在 I 上可积, 求证: fg 在 I 上也可积; 当 g 在 I 上不取零值且 f/g 在 I 上有界时, f/g 在 I 上也可积。

解答: fg 和 f/g 的间断点为 f 的间断点和 g 的间断点的并集的子集。

(f/g 在 g 不取0时可以这样论证) 仍然是零测集, 由Lebesgue定理知可积。□

习题9 设 f 在 I 上可积, 证明: $|f|$ 在 I 上也可积, 并且

$$\left| \int_I f d\sigma \right| \leq \int_I |f| d\sigma.$$

解答: $|f|$ 的间断点是 f 的间断点的子集, 而它是零测, 由Lebesgue定理知 $|f|$ 也可积。而

$$\left| \int_I f d\sigma \right| = \left| \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k f(x_i) \sigma_i \right| \leq \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k |f(x_i)| \sigma_i = \int_I |f| d\sigma. \quad \square$$

问题1 设 $\int_I f d\sigma > 0$, 求证: 存在闭矩形 $J \subset I$, 使得 $f > 0$ 在 J 上成立。

解答: 我们采取反证法。若不存在这样的小矩形 J : 对 $\forall x \in I$ 满足 $f(x) > 0$, 我们可知 f 在 x 处必不连续。

从而 $\{x \mid f(x) > 0\}$ 是不连续点集的子集。取 $P = \{x \mid f(x) > 0\}$ 。

由Lebesgue定理知 P 是零测集。从而 $\int_I f d\sigma = \int_{I/P} f d\sigma < 0$, 矛盾。□

问题2 对 $(x, y) \in [0, 1]^2$, 定义

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{m} + \frac{1}{q}, & x = \frac{n}{m}, y = \frac{p}{q}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

证明: f 在 $[0, 1]^2$ 上可积, 这里 $m, n, q, p \in \mathbb{N}^*$ 。

解答: 我们考虑间断点集, 发现它是 $(\mathbb{Q} \cap [0, 1])^2$ 。

因为但凡函数值为0的点集都不是间断点: 取 ε 足够小, 以 ε 为半径的圆内的有理数分母会任意大。

而 $(\mathbb{Q} \cap [0, 1])^2$ 可数, 从而零测。由Lebesgue定理, 原函数可积。□

1.3 矩形区域上二重积分的计算

习题1 计算下列积分:

- (1) $\iint_I \frac{x^2}{1+y^2} dx dy, I = [0, 1]^2;$
- (2) $\iint_I x \cos(xy) dx dy, I = [0, \pi/2] \times [0, 1];$
- (3) $\iint_I \sin(x+y) dx dy, I = [0, \pi]^2.$

解答:

- (1) $\iint_I \frac{x^2}{1+y^2} dx dy = \left(\int_0^1 x^2 dx \right) \left(\int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy \right) = \left(\frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 \right) \left(\arctan y \Big|_0^1 \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}. \square$
- (2) $\iint_I x \cos(xy) dx dy = \int_0^1 x \cdot \left(\int_0^{\pi/2} \cos(xy) dy \right) dx.$
 而 $\int_0^{\pi/2} \cos(xy) dy = \frac{1}{x} \sin(xy) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{x} \sin \frac{\pi x}{2} \Rightarrow \int_0^1 x \left(\int_0^{\pi/2} \cos(xy) dy \right) dx = \int_0^1 \sin \frac{\pi x}{2} dx = 1. \square$
- (3) $\iint_I \sin(x+y) dx dy = \iint_I \sin x \cos y dx dy + \iint_I \sin y \cos x dx dy$
 $= \left(\int_0^\pi \sin x dx \right) \left(\int_0^\pi \cos y dy \right) + \left(\int_0^\pi \cos x dx \right) \left(\int_0^\pi \sin y dy \right) = 0. \square$

习题2 设函数 f 在矩形 $I = [a, b] \times [c, d]$ 上有连续的二阶偏导数, 计算积分 $\iint_I \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x, y) dx dy$.

解答:

$$\begin{aligned} \iint_I \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x, y) dx dy &= \int_a^b \left(\int_c^d \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x, y) dy \right) dx \\ &= \int_a^b \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \Big|_{y=c}^{y=d} \right) dx = \int_a^b \left(\frac{\partial f(x, d)}{\partial x} - \frac{\partial f(x, c)}{\partial x} \right) dx = f(b, d) + f(a, c) - f(a, d) - f(b, c). \square \end{aligned}$$

习题3 计算积分 $\int_I f d\sigma$ ($I = [0, 1]^2$):

- (1) $f(x, y) = \begin{cases} 1, & y \leq x^2, \\ 0, & y > x^2; \end{cases}$
- (2) $f(x, y) = \begin{cases} x+y, & x^2 \leq y \leq 2x^2, \\ 0, & y < x^2 \text{ 或 } y > 2x^2. \end{cases}$

解答:

- (1)
$$\int_I f d\sigma = \int_0^1 \left(\int_0^{x^2} 1 dy \right) dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}. \square$$
- (2)
$$\begin{aligned} \int_I f d\sigma &= \int_0^{\sqrt{2}/2} \left(\int_{x^2}^{2x^2} (x+y) dy \right) dx + \int_{\sqrt{2}/2}^1 \left(\int_{x^2}^1 (x+y) dy \right) dx \\ &= \int_0^{\sqrt{2}/2} \left(x^3 + \frac{3}{2} x^4 \right) dx + \int_{\sqrt{2}/2}^1 \left(\frac{1}{2} + x - x^3 - \frac{1}{2} x^4 \right) dx \\ &= \left(\frac{1}{4} x^4 + \frac{3}{10} x^5 \right) \Big|_0^{\sqrt{2}/2} + \left(\frac{1}{2} x + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{10} x^5 \right) \Big|_{\sqrt{2}/2}^1 = \left(\frac{1}{16} + \frac{3\sqrt{2}}{80} \right) + \left(\frac{37}{80} - \frac{19\sqrt{2}}{80} \right) = \frac{21}{40} - \frac{\sqrt{2}}{5}. \square \end{aligned}$$

习题4 利用定理10.3.4中的Minkowski不等式, 证明: 对 $a_k \geq 0, b_k \geq 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$), $p \geq 1$, 有不等式

$$\left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{1/p}.$$

「定理10.3.4」(Minkowski不等式) 设 f 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上非负、连续, $p \geq 1$, 那么

$$\left(\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right)^p dx \right)^{1/p} \leq \int_c^d \left(\int_a^b f^p(x, y) dx \right)^{1/p} dy.$$

当 $p > 1$ 时, 等式成立的充分必要条件是

$$f(x, y) = u(x)v(y).$$

解答: 我们取

$$f_\varepsilon(x, y) \leq \begin{cases} h(x), & 0 \leq y \leq 1 - \varepsilon, \\ g(x), & 1 + \varepsilon \leq y \leq 2, \\ \frac{1}{2\varepsilon}(1 + \varepsilon - y)h(x) + \frac{1}{2\varepsilon}(y - 1 + \varepsilon)g(x), & 1 - \varepsilon \leq y \leq 1 + \varepsilon. \end{cases}$$

则 f_ε 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上非负连续, $p > 1$ 。由Minkowsky不等式有:

$$(\varepsilon \rightarrow 0) \quad \left(\int_a^b (h(x) + g(x))^p dx \right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b h^p(x) dx \right)^{1/p} + \left(\int_a^b g^p(x) dx \right)^{1/p}.$$

我们再取 $g(x) = a_i$ ($i - 1 \leq x < i$) ($1 \leq i \leq k$), $h(x) = b_i$ 。取积分上下限 $a = 0$, $b = k$, 即有:

$$\left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{1/p}. \quad \square$$

习题5 设 f, g 都在 $[a, b]$ 上可积, 利用二重积分不等式

$$\iint_{[a, b]^2} (f(x)g(y) - f(y)g(x))^2 dx dy \geq 0,$$

证明Cauchy-Schwarz不等式:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$$

$$\begin{aligned} \text{解答: } & \iint_{[a, b]^2} (f(x)g(y) - f(y)g(x))^2 dx dy = \iint_{[a, b]^2} (f^2(x)g^2(y) + f^2(y)g^2(x) - 2f(x)f(y)g(x)g(y)) dx dy \\ & = 2 \iint_{[a, b]^2} (f^2(x)g^2(y) - f(x)g(x)f(y)g(y)) dx dy \geq 0. \\ & \Rightarrow \iint_{[a, b]^2} f^2(x)g^2(y) dx dy \geq \iint_{[a, b]^2} f(x)g(x)f(y)g(y) dx dy. \\ & \Rightarrow \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \left(\int_a^b g^2(y) dy \right) \geq \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2. \quad \square \end{aligned}$$

问题1 设 f 是问题10.2的第2题中定义的函数。证明:

(1) $f(x, p/q)$ 对 $x \in [0, 1]$ 上不可积;

(2) $f(n/m, y)$ 对 $y \in [0, 1]$ 上不可积。

解答: (1) 我们证明 $f(x, p/q)$ 在 $x \in [0, 1]$ 上处处不连续:

其实由于有理数集和无理数集都是稠密的, 故而在任何一个极小的区间内, 都存在有理点和无理点。

f 值也在0和 $> 1/q$ 之间变动。故 f 在 $[0, 1]$ 上处处不连续, 从而不可积(两问思路完全一致)。 \square

问题2 对 $(x, y) \in [0, 1]^2$, 定义

$$g(x, y) = \begin{cases} 1, & x = \frac{n}{m}, y = \frac{p}{m}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

证明: $\int_0^1 dx \int_0^1 g(x, y) dy$ 和 $\int_0^1 dy \int_0^1 g(x, y) dx$ 都存在, 但 g 在 $[0, 1]^2$ 上不可积。

解答: $\int_0^1 dx \int_0^1 g(x, y) dy$ 中, $\int_0^1 g(x, y) dy$ 恒为 0:

若 x 无理, 这一点显然; 若 x 有理, 我们考虑 Lebesgue 积分, $\int_0^1 g(x, y) dy$ 为 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 的测度, 即为 0。

$$\Rightarrow \int_0^1 dx \int_0^1 g(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_0^1 g(x, y) dx = 0.$$

但 g 在 $[0, 1]^2$ 上处处不连续, 故在矩形上不可积。□

1.4 有界函数上的二重积分

习题1 证明定理 10.4.5。

定理 10.4.5 设有界集 $B \subset \mathbb{R}^2$, 则 B 有面积当且仅当 B 的边界 ∂B 是一零面积集。

解答: 首先证明一个引理:

[lemma] ∂B 是闭集。

[prove] 我们反过来证明 $\mathbb{R}^2 / \partial B$ 是开集: 任取 $x_0 \in \mathbb{R}^2 / \partial B$ 。

若对 $\forall \varepsilon > 0$ 均存在 $x_\varepsilon \in \partial B$ 使 $d(x_0, x_\varepsilon) < \varepsilon$, 则 $x_0 \in \overline{\partial B} = \partial B \Rightarrow$ 矛盾!

回到原题: ∂B 零面积 $\Leftrightarrow \partial B$ 零测

\Leftrightarrow 取

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin B, \\ 1, & x \in B. \end{cases}$$

间断点零测 $\Leftrightarrow \int_B 1 d\sigma$ 可积 $\Leftrightarrow B$ 有面积。□

习题2 证明:

$$1.96 < \iint_{|x|+|y|\leq 10} \frac{dx dy}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} < 2.$$

解答: 在整个区域上, $\frac{1}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y}$ 的取值在 $\left[\frac{1}{102}, \frac{1}{100}\right]$ 内。

而其面积为 $\frac{1}{2} \times 20 \times 20 = 200$, \Rightarrow

$$\iint_{|x|+|y|\leq 10} \frac{dx dy}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} \in \left[\frac{200}{102}, \frac{200}{100}\right) \subset (1.96, 2). \quad \square$$

习题3 证明: 设 $B \subset \mathbb{R}^2$ 是一有界集, 那么 B 有面积的充要条件是: 对 $I \supset B$ 的矩形 I 的任何矩形网分割 π , 均有

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{I_i \cap B \neq \emptyset} \sigma(I_i) = \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{I_i \subset B} \sigma(I_i).$$

解答: B 有面积等价于 $\int_B 1 d\sigma$ 可积。我们取

$$f_B(x) = \begin{cases} 1, & x \in B, \\ 0, & x \notin B. \end{cases}$$

则 $\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{I_i \cap B \neq \emptyset} \sigma(I_i)$ 是 $\int_I f_B d\sigma$ 的上和, $\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{I_i \subset B} \sigma(I_i)$ 是 $\int_I f_B d\sigma$ 下和。上下和相等 \Leftrightarrow 可积。□

1.5 有界集合上积分的计算