

НИУ ИТМО
Факультет ПИиКТ

Лабораторная работа №2
Вычислительная математика
Вариант №5

Преподаватель **Наумова Надежда Александровна**
Подготовил **Лоскутов Прохор Александрович**

Санкт - Петербург 2026

Оглавление

Оглавление	2
1 Вычислительная реализация задачи	3
1.1 Решение нелинейного уравнения	3
1.2 Решение системы нелинейных уравнений	6
2 Программная реализация задачи	10

1 Вычислительная реализация задачи


1.1 Решение нелинейного уравнения



Дано нелинейное уравнение с тремя корнями:

$$y = -2.7 \cdot x^3 - 1.48 \cdot x^2 + 19.23 \cdot x + 6.35$$

1.1.1 Отделить корни заданного нелинейного уравнения графически

Построим графическое изображение уравнения в Desmos:





1.1.2 Определить интервалы изоляции корней

По изображениям, мы можем выделить три отрезка, в которых лежат наши корни:

$$x \in [-3; -2]$$

$$x \in [-1; 0]$$

$$x \in [2; 3]$$

1.1.3 Уточнить корни нелинейного уравнения с точностью $\varepsilon = 10^{-2}$.

В качестве методов нужно использовать:

Расположения корня	Метод уточнения
Левый	Простые итерации
Центральный	Секущие
Правый	Хорды

1.1.4 Таблицы с расчётами значений

Таблица 1

Уточнение корня уравнения методом простых итераций

№	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$ x_{k+1} - x_k $
1	-3.000	-2.816	0.756	0.184
2	-2.816	-2.799	0.143	0.017
3	-2.799	-2.796	0.028	0.003
4	-2.796	-2.795	0.006	0.001

1.1.4.1 Проверка достаточного условия сходимости для итерационного метода.

$$f(x) = -2.7x^3 - 1.48x^2 + 19.23x + 6.35$$

$$f'(x) = -8.1x^2 - 2.96x + 19.23$$

Возьмём интервал локализации

$$[a, b] = [-3.0; -2.5]$$

На этом интервале

$$f'(x) < 0$$

Выберем

$$\lambda = \frac{1}{\max_{x \in [a, b]} |f'(x)|}$$

$$|f'(-3.0)| = 44.79, \quad |f'(-2.5)| = 24.645$$

$$\max_{x \in [a, b]} |f'(x)| = 44.79$$

$$\lambda = \frac{1}{44.79} \approx 0.0223$$

Итерационная функция:

$$\varphi(x) = x + \lambda f(x)$$

$$\varphi'(x) = 1 + \lambda f'(x)$$

Проверим условие сходимости на концах интервала:

$$\varphi'(-3.0) = 1 + 0.0223 \cdot (-44.79) \approx 0$$

$$\varphi'(-2.5) = 1 + 0.0223 \cdot (-24.645) \approx 0.450$$

Следовательно,

$$|\varphi'(x)| \leq q$$

$$q = \max_{x \in [a, b]} |\varphi'(x)| \approx 0.450 < 1$$

Достаточное условие сходимости выполняется, следовательно метод простой итерации сходится, **Q.E.D.**

Таблица 2

Уточнение корня уравнения методом секущих

№	x_{k-1}	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$ x_{k+1} - x_k $
1	-0.500	-0.499	-0.324	0.065	0.176
2	-0.499	-0.324	-0.327	-0.001	0.003

Таблица 3

Уточнение корня уравнения методом хорд

№	a	b	x	$f(a)$	$f(b)$	$f(x)$	$ a - b $
1	2.000	3.000	2.438	17.290	-22.180	5.308	1.000
2	2.438	3.000	2.547	5.308	-22.180	1.134	0.562
3	2.547	3.000	2.569	1.134	-22.180	0.222	0.453
4	2.569	3.000	2.573	0.222	-22.180	0.043	0.431
5	2.573	3.000	2.574	0.043	-22.180	0.008	0.427


1.2 Решение системы нелинейных уравнений

1.2.1 Отделение корней заданной системы

По варианту:

Система	Метод
$\begin{cases} \tan(x \cdot y + 0.3) = x^2 \\ 0.9x^2 + 2y^2 = 1 \end{cases}$	Метод Ньютона

1.2.2 Графическое изображение



1.2.3 Анализ графика функции

Как видно из графика, система имеет 4 решения. Заметим, что первая функция – чётная, как и вторая. Это значит, что нам достаточно проанализировать две точки пересечения слева, а две – справа будут просто симметрией относительно центра, т.к. $f(-x, -y) = f(x, y)$.

Вот два отрезка, на которых мы будем уточнять корни.

$$x \in [-0.9; -0.8]$$

$$x \in [-0.4; -0.2]$$

1.2.4 Уточнение корней.

1. Отрезок $x \in [-0.6; -0.5]$:

$$\begin{cases} \tan(x \cdot y + 0.3) = x^2 \\ 0.9x^2 + 2y^2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases} \rightarrow$$
$$\begin{cases} \tan(x \cdot y + 0.3) - x^2 = 0 \\ 0.9x^2 + 2y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Построим матрицу Якоби:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{\cos^2(x \cdot y + 0.3)} y - 2x, \quad \frac{\partial g}{\partial x} = 1.8x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\cos^2(x \cdot y + 0.3)} x, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = 4y$$

Решаем систему:

$$J(x, y) \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{\cos^2(x \cdot y + 0.3)} y - 2x \right) \Delta x + \left(\frac{1}{\cos^2(x \cdot y + 0.3)} x \right) \Delta y = x^2 - \tan(x \cdot y + 0.3) \\ 1.8x \Delta x + 4y \Delta y = 1 - 0.9x^2 - 2y^2 \end{cases}$$

1.2.4.1 Выберем начальное приближение: $x_0 = -0.9, y_0 = -0.4$.

На первой итерации система будет иметь вид:

$$\begin{cases} 1.159\Delta x - 1.442\Delta y = 0.034 \\ -1.620\Delta x - 1.600\Delta y = -0.049 \end{cases}$$

Решаем систему:

$$\begin{cases} 1.159\Delta x - 1.442\Delta y = 0.034 \\ -1.620\Delta x - 1.600\Delta y = -0.049 \end{cases}$$

$$\Delta x \approx 0.030$$

$$\Delta y \approx 0.000$$

Новое приближение:

$$x_1 = x_0 + \Delta x = -0.900 + 0.030 = -0.870$$

$$y_1 = y_0 + \Delta y = -0.400 + 0.000 = -0.400$$

Вторая итерация:

$$x_1 \approx -0.870, \quad y_1 \approx -0.400$$

Подставляем в систему:

$$\begin{cases} 1.112\Delta x - 1.368\Delta y = 0.001 \\ -1.566\Delta x - 1.598\Delta y = -0.001 \end{cases}$$

Решение системы:

$$\Delta x \approx 0.001$$

$$\Delta y \approx 0.000$$

Новое приближение:

$$x_2 = x_1 + \Delta x \approx -0.870 + 0.001 \approx -0.869$$

$$y_2 = y_1 + \Delta y \approx -0.400 + 0.000 \approx -0.400$$

Так как $|x_2 - x_1| = 0.001 < 0.01$, также как и $|y_2 - y_1| = 0.000 < 0.01$, то мы достигли необходимой точности, значит корень $A(-0.869, -0.400)$

1.2.4.2 Теперь возьмём приближение $x_0 = -0.3, y_0 = 0.7$:

На первой итерации система будет иметь вид:

$$\begin{cases} 1.306\Delta x - 0.302\Delta y = 0.000 \\ -0.540\Delta x + 2.800\Delta y = -0.061 \end{cases}$$

Решаем систему:

$$\begin{cases} 1.306\Delta x - 0.302\Delta y = 0.000 \\ -0.540\Delta x + 2.800\Delta y = -0.061 \end{cases}$$

$$\Delta x \approx -0.005$$

$$\Delta y \approx -0.023$$

Новое приближение:

$$x_1 = x_0 + \Delta x = -0.300 - 0.005 = -0.305$$

$$y_1 = y_0 + \Delta y = 0.700 - 0.023 = 0.677$$

Вторая итерация:

$$x_1 \approx -0.305, \quad y_1 \approx 0.677$$

Подставляем в систему:

$$\begin{cases} 1.294\Delta x - 0.308\Delta y = 0.000 \\ -0.550\Delta x + 2.709\Delta y = -0.001 \end{cases}$$

Решение системы:

$$\Delta x \approx 0.000$$

$$\Delta y \approx 0.000$$

Новое приближение:

$$x_2 = x_1 + \Delta x \approx -0.305 + 0.000 \approx -0.305$$

$$y_2 = y_1 + \Delta y \approx 0.677 + 0.000 \approx 0.677$$

Так как $|x_2 - x_1| = 0.000 < 0.01$, также как и $|y_2 - y_1| = 0.000 < 0.01$, то мы достигли необходимой точности, значит корень $B(-0.305, 0.677)$

Значит всего 4 точки, являющиеся корнями системы:

$$A(-0.869, -0.400), B(-0.305, 0.677),$$

$$A'(0.869, 0.400), B'(0.305, -0.677),$$

2 Программная реализация задачи