

VITA TERRA

BİTKİ MÜHAFİZƏ TƏRƏFDAŞINIZ · YOUR PLANT PROTECTION PARTNER

Məhsul Kataloqu

Product Catalogue

Bitki Mühafizə Məhsulları · Crop Protection Portfolio

İSPANIYA CERRADO SOL · EKSKLÜZİV DİSTRİBÜTOR

2026

İspaniyanın elmi, sizin tarlanız

Spain's science, your fields

Vita Terra — İspaniyada formula edilmiş Cerrado Sol bitki mühafizə məhsullarının regiondakı eksklüziv distribütorudur. Biz dünya səviyyəli kənd təsərrüfatı elmini, adi pestisidlərdən daha yaxşısına layiq olan fermerlərə çatdırmaq üçün mövcuduq. Vita Terra is the exclusive regional distributor of Cerrado Sol — Spanish-formulated plant protection products — bringing world-class agricultural science to farmers who deserve more than ordinary pesticides.

Missiyamız / Mission

Regional fermerlərə ekspert aqronomik dəstəklə premium Avropa bitki mühafizəsini çatdırmaq.

Deliver premium European crop protection to regional farmers, backed by expert agronomic support.

Vizyonumuz / Vision

Cənubi Qafqazda ən etibarlı bitki mühafizəsi tərəfdaşı olmaq.

To be the most trusted plant protection partner across the South Caucasus.

Etibar · Trust

Orijinal məhsullar,
sertifikatlı kanallar.
Authentic products,
certified channels.

Elm · Science

EU-da tənzimlənən,
sahədə sınaqdan keçmiş
formulalar.
EU-regulated, field-tested
formulations.

Məsuliyyət · Stewardship

Doğru məhsul, doğru
doza, doğru vaxt.
Right product, right dose,
right time.

İrs · Heritage

Cerrado Sol-un İspan
ustalığı.
Spanish craftsmanship
from Cerrado Sol.

Adi satıcı deyil — etibarlı tərəfdaş

Not just a reseller — a trusted partner

01

Premium Avropa Formulları / Premium European formulations

Cerrado Sol-un İspan laboratoriyalarında hazırlanmış, müasir təsiredici maddələrlə yüksək effektivlik.

03

EU Sertifikat Uyğunluğu / EU regulatory compliance

Bütün məhsullar Avropa İttifaqının pestisid qaydalarına və təhlükəsizlik standartlarına tam uyğundur.

05

Ekspert Aqronomik Dəstək / Expert agronomic support

Doza, vaxtlama və integrasiya olunmuş zərərverici idarəetməsi üzrə peşəkar məsləhət.

02

Eksklüziv Cerrado Sol Distribütoru / Exclusive Cerrado Sol distributor

Regionda Cerrado Sol məhsullarını təqdim etmək üçün eksklüziv hüquq — hər partiya mənbəyinə qədər izləne bilər.

04

Orijinallıq Zəmanəti / Guaranteed authenticity

Sertifikatlı kanallar vasitəsilə import — saxta və keyfiyyətsiz məhsul riski olmadan.

06

Sürətli Regional Çatdırılma / Fast regional delivery

Mövsümün kritik anlarında etibarlı tədarük və yerli anbar dəstəyi.

Məhsul portfeli

Product portfolio

Meyvə bağları üçün tövsiyə olunan həllər — bax: **Meyvə bölməsi (s.5)** · Recommended solutions for fruit orchards — see the fruit section

İnsektisidlər

Insecticides · 21

Odysseus 480 SC	Thiacloprid	7	Lamar 500 WG	Pirimicarb	17
Razor 280 SC	Imidacloprid	8	Argola 250 EC	Deltamethrin	18
Inclinar 100 WG	Emamectin	9	Anillito 200 SP	Acetamiprid	19
Tocar 247 SC	Thiamethoxam	10	Corro 240 SC	Spirodiclofen	20
Coger 100 EC	Pyriproxyfen	11	Zumbar 100 SC	Spirotetramat	21
Atrapar 50 WG	Abamectin	12	Detectar 200 EC	Bifenthrin	22
Curar 250 EC	Cypermethrin	13	Cosido 480 SC	Diflubenzuron	23
Mandriguera 100 CS	Lambda-cyhalothrin	14	Tapiar EC	Hexythiazox	24
Ajustar 200 WP	Pyridaben	15	Amurallar 110 SC	Etoazazole	25
Curador 200 SC	Chlorantraniliprole	16	Corriente 480 SC	Spinosad	26
			Parador 240 SC	Spirodiclofen	27

Fungisidlər

Fungicides · 20

Baiar 550 SC	Difenoconazole	29	Lamada 700 WP	Thiophanate	39
Predador 220 EC	Tebuconazole	30	Tono 400 SC	Dodine	40
Divisar 750 WG	Cyprodinil	31	Coronilla 800 WG	Fosetyl	41
Pyrat 800 WG	Captan	32	Alianza 760 WG	Ziram	42
Copiar 800 WP	Mancozeb	33	Hornillo 500 WG	Trifloxystrobin	43
Guarura 800 WG	Thiram	34	Camarilla 380 WG	Boscalid	44
Afrontar 250 ME	Bupirimate	35	Cercado 625 WG	Cyprodinil	45
Tratar 700 WG	Dithianon	36	Lumbre 250 EC	Difenoconazole	46
Silex 500 WG	Kresoxim	37	Sonos 300 SC	Pyrimethanil	47
Estrellar 100 EC	Penconazole	38	Arco 250 EC	Tebuconazole	48

Akarisid və Spesifik Həllər

Acaricides & Specialty · 1

Acarus 240 SC	Bifenazate	50
---------------	------------	----

Bitki Böyümə Tənzimləyiciləri

Plant Growth Regulators · 3

ZILAR 250 SC	Paclobutrazol	52	Ramon SL	1-Naphthylacetic	53
			Lancet SL	6-Benzylaminopurine	54

Meyvə bağları üçün həllər

Solutions for fruit orchards

Qarışıq meyvə bağları — alma, armud, şaftalı, nektarin, gilə, gavalı, erik, nar, heyva və digər meyvələr — üçün portfelimizin geniş çeşidi: zərərvericilər, meyvəyeyənlər, hörümçək gənəsi və əsas xəstəliklərə (qotur, monilioz, un şəhi) qarşı. Nektarin müalicə baxımından şaftalı qrupuna daxildir. Konkret bağ üçün tətbiq proqramı və dozalar üçün VitaTerra aqronomu ilə əlaqə saxlayın.

A broad selection from our portfolio for mixed fruit orchards — apple, pear, peach, nectarine, cherry, plum, pomegranate, quince and more: against pests, fruit-borers, spider mites and the main diseases (scab, brown rot, powdery mildew). Nectarine follows the peach group. Contact the VitaTerra agronomist for the orchard programme and doses.

Alma və Armud

Apple & Pear

Tocar 247 SC	Thiamethoxam 141 g/l + Lambda-Cyhalothrin 106 g/l	s.10
Curador 200 SC	Chlorantraniliprole 200 g/L SC	s.16
Razor 280 SC	Imidacloprid 200 g/L + Lambda Cyhalothrin 80 g/L	s.8
Predador 220 EC	Tebuconazole 125 g/L + Triadimefon 100 g/L	s.30
Pyrat 800 WG	Captan 800 g/kg	s.32
Divisar 750 WG	Cyprodinil 750 g/kg	s.31

Çayirdəkli meyvələr

Stone fruits

Corriente 480 SC	Spinosad 480 g/l	s.26
Detectar 200 EC	Bifenthrin 200 g/l	s.22
Sonos 300 SC	Pyrimethanil 300 G/L	s.47
Cercado 625 WG	Cyprodinil 375 g/kg + Fludioxonil 250 g/kg WG	s.45
Lumbre 250 EC	Difenoconazole 250 g/l	s.46
Estrellar 100 EC	Penconazole 100 g/l EC	s.38

Hörümçək gənəsi — bütün meyvələr

Spider mites — all orchards

Ajustar 200 WP	Pyridaben 200 g/kg WP	s.15
Acarus 240 SC	Bifenazate 240 g/l	s.50
Corro 240 SC	Spirodiclofen 240 g/L SC	s.20
Tapiar EC	Hexythiazox 50 g/l	s.24
Amurallar 110 SC	Etoxazole 110 g/l	s.25
Parador 240 SC	Spirodiclofen 222 g/L + Abamectin 18 g/L	s.27

Nar, Heyva və digər

Pomegranate, Quince & more

Inclinar 100 WG	Emamectin Benzoate, 100 g/kg	s.9
Baiar 550 SC	Difenoconazole 200 g/l + Thiamethoxam 350 g/l SC	s.29
Afrontar 250 ME	Bupirimate 250 g/l ME	s.35
Hornillo 500 WG	Trifloxystrobin 500 G/KG	s.43
Lumbre 250 EC	Difenoconazole 250 g/l	s.46
Tono 400 SC	Dodine 400 g/l SC	s.40



BÖLMƏ 01

İnsektisidlər

Insecticides

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət
Reliable insect pest control

21 MƏHSUL · 21 PRODUCTS



Odysseus 480 SC

THIACLOPRİD 480 G/L

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

ODYSSEUS 480 SC, xloronikotin sinfinə aid sistemli bir insektisiddir və həm kontakt, həm də mədə-bağırsaq yolu ilə təsir göstərir. Tərkibində 480 q/l tiakloprid fəal maddəsi olan suspenziya konsentratıdır.

ODYSSEUS 480 SC is a systemic insecticide with contact and stomach action belonging to the chloronicotinyl class.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Üzüm (yarpaqbükənlər) və meyvə ağacları (alma meyvəyeyəni, yarpaqbükənlər) üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həm soran, həm də gəmirən zərərvericilərə qarşı effektivdir.

Grapes (Leafrollers), Fruit trees (Codling moth, Leafrollers)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Üzüm bağlarında 0,3–0,4 l/ha, meyvə ağaclarında isə 0,3–0,45 l/ha normasında vegetasiya dövründə püskürtmə yolu ilə tətbiq edilir, maksimum 2 dəfə işlənir. İş məhlulu istifadə günü hazırlanmalı, tank yarıya qədər su ilə doldurulmalı, qarışdırıcı işləyərkən preparat əlavə edilməli, sonra qalan su tamamlanmalıdır.

Apply by spraying during the vegetation period at 0.3–0.4 l/ha for grapes and 0.3–0.45 l/ha for fruit trees, with a maximum of 2 applications.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

40 days (grapes), 14 days (fruit trees)

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Thiacloprid 480 g/l**

FORMULYASIYA · FORM. **SC**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 L**

KATEQORIYA · CATEGORY **İnsektisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Razor 280 SC

İMİDACLOPRİD 200 G/L + LAMBDA CYHALOTHRİN 80 G/L

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

RAZOR 280 SC iki təsiredici maddədən — İmidaklopid və Lambda Sihalotrin — ibarət kombinəedilmiş insektisiddir və suspenziya konsentratı formasında buraxılır.

RAZOR 280 SC is a combined insecticide containing two active ingredients, Imidacloprid and Lambda Cyhalothrin, in suspension concentrate form.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Üzüm (mənənə) və meyvə ağacları (alma meyvəyeyəni, mənənə) üçün nəzərdə tutulmuşdur; həm gəmirici, həm də soran həşəratlara qarşı effektivdir.

Grapes (aphids), Fruit trees (codling moth, aphids) — targeting both chewing and sucking insects

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Preparat vegetasiya dövrü ərzində püskürtmə yolu ilə tətbiq edilir. Üzüm üçün 0,2–0,3 l/ha, meyvə ağacları üçün isə 0,3–0,45 l/ha normasında istifadə olunur. İş məhlulu emal günü hazırlanmalı, bak yarıya qədər su ilə doldurulmalı, qarışdırıcı işləyən vəziyyətdə lazımı miqdarda preparat əlavə edilməli, sonra qalan su tamamlanmalıdır.

Apply by spraying during the vegetation period. For grapes, use 0.2–0.3 L/ha; for fruit trees, use 0.3–0.45 L/ha. The working solution should be prepared on the day of application, with the tank half-filled...

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

14 days (2 applications)

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Imidacloprid 200 g/L + Lambda Cyhalothrin 80 g/L**

FORMULYASIYA · FORM. **SC**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 L**

KATEQORIYA · CATEGORY **İnsektisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Inclinar 100 WG

EMAMECTİN BENZOATE, 100 G/KG

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

INCLINAR 100 WG — Emamectin Benzoate (100 q/kg) təsiredici maddəsi əsasında hazırlanmış, suda həll olan qranul formasında qeyri-sistemik insektisiddir.

INCLINAR 100 WG is a non-systemic insecticide in water-dispersible granule form containing Emamectin Benzoate at 100 g/kg.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Preparat Lepidoptera dəstəsinə aid zərərvericiləri (kəpənəklər və onların sürfələri) məhv etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur; həmin zərərvericilərin yayıldığı kənd təsərrüfatı bitkilərində tətbiq edilir.

Lepidoptera (caterpillars and moths); general crops where Lepidoptera pests are present

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Preparat tövsiyə edilən dozalarda su ilə qarışdırılaraq istifadə edilməlidir. Yarpaqların tam örtülməsinə diqqət yetirilməlidir, çünki məhsul translaminar üsulla təsir göstərir. Mühafizəedici təsirin müddəti 2-6 həftə təşkil edir.

Apply at recommended doses as a water-dispersible granule formulation mixed with water. The product acts transimarily, so thorough leaf coverage is important.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Emamectin Benzoate, 100 g/kg
FORMULYASIYA · FORM.	WG
QABLAŞDIRMA · PACK	500 g
KATEQORIYA · CATEGORY	Insektisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Tocar 247 SC

THIAMETHOXAM 141 G/L + LAMBDA-CYHALOTHRIN 106 G/L

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

TOCAR 247 SC — iki təsiredici maddədən ibarət kombinəedilmiş insektisiddir: sistemik və kontakt-bağırsaq təsirli, translaminar aktivliyə malik preparatdır.

TOCAR 247 SC is a combined insecticide containing two active substances with systemic and contact-intestinal action and translaminar activity.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Üzüm (*Psylla pyri* L. — üzüm bitlisi əleyhinə) və meyvə ağacları (*Cydia pomonella* — alma meyvəyeyəni, *Psylla pyri* L. — armud bitlisi, *Aphidoidea* — qan mənənəsi əleyhinə) üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Grapevine (against *Psylla pyri* L.), Fruit trees (against *Cydia pomonella*, *Psylla pyri* L., *Aphidoidea*)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Üzüm bağlarında vegetasiya dövründə 0,2–0,3 l/ha, meyvə ağaclarında isə 0,3–0,45 l/ha normasında çiləmə yolu ilə tətbiq edilir. İş məhlulu işlənmə günü hazırlanmalı, bak yarıya qədər su ilə doldurulmalı, qarışdırıcı işləyərkən preparat əlavə edilməli, sonra qalan su tamamlanmalıdır.

Apply by spraying during the vegetation period at a rate of 0.2–0.3 L/ha for grapevines and 0.3–0.45 L/ha for fruit trees.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

14 days

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Thiamethoxam 141 g/l + Lambda-Cyhalothrin 106 g/l
FORMULYASIYA · FORM.	SC
QABLAŞDIRMA · PACK	1 L
KATEQORIYA · CATEGORY	Insektisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Coger 100 EC

PYRİPROXYFEN 100 G/L

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

COGER 100 EC — 100 q/l piriprosifən təsiredici maddəsi olan emulsiya konsentratı formasında insektisiddir. Preparat juvenil hormon analoqları qrupuna aid olub həm kontakt, həm də bağırsaq təsir mexanizminə malikdir.

COGER 100 EC is an emulsifiable concentrate insecticide containing Pyriproxyfen at 100 g/l. It acts as a juvenile hormone analogue with both contact and intestinal modes of...

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Pyriproxyfen 100 g/l**

FORMULYASIYA · FORM. **EC**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 L**

KATEQORIYA · CATEGORY **İnsektisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Üzüm (yarpaqbükənlər) və meyvə ağacları (alma meyvəyeyəni, yarpaqbükənlər, qalxanlı bitlər) üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Grapes (Leafrollers), Fruit trees (Codling moth, Leafrollers, Scale insects)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Preparat vegetasiya dövrü ərzində 1,0 l/ha normasında püskürtmə yolu ilə tətbiq edilir. İş məhlulu emal günü xüsusi təchiz olunmuş sahələrdə hazırlanmalı, bak yarıya qədər su ilə doldurulub qarışdırıcı işə salındıqdan sonra preparat əlavə edilməlidir. Qarışdırıcı preparat tam həll olunana qədər və püskürtmə zamanı işləməlidir.

Apply by spraying during the vegetation period at a rate of 1.0 l/ha. The working solution should be prepared on the day of application using a properly equipped mixing area, filling the tank halfway with...

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

14 days (1 application)



Atrapar 50 WG

ABAMECTİN 50 G/KG WDG

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

Cerrado Sol premium formulasi. Ətraflı texniki məlumat təsdiq mərhələsindədir.

Premium Cerrado Sol formulation. Active ingredient: Abamectin 50 g/kg WDG.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · **Abamectin 50 g/kg**
ACTIVE WDG

FORMULYASIYA · FORM. WDG

QABLAŞDIRMA · PACK 500 g

KATEQORIYA · CATEGORY İnsektisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Curar 250 EC

CYPERMETHRİN 250 G/L EC

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

CURAR 250 EC, 250 q/l Sipermetrin təsirli maddəsi əsasında hazırlanmış emulsiyalaşan konsentrat formunda kontakt və sistemli insektisiddir.

CURAR 250 EC is a contact and systemic insecticide formulated as an emulsifiable concentrate containing Cypermethrin 250 g/l.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Alma (Cydia pomonella, Tortricidae), üzüm (Tortricidae), örtülü sahələrdə pomidor, bibər və xiyar (Phloeothripidae — trips, Aphididae — mənənə) bitkilərinin zərərvericilərinə qarşı nəzərdə tutulmuşdur.

Apple (Cydia pomonella, Tortricidae), Grape (Tortricidae), Tomatoes, peppers, cucumbers in protected areas (Phloeothripidae, Aphididae)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Alma və üzüm üçün vegetasiya dövründə 3 dəfə 0,25–0,38 l/ha dozasında, pomidor, bibər və xiyar (örtülü sahələr) üçün isə 2 dəfə 0,64–0,8 l/ha dozasında çiləmə yolu ilə tətbiq edilir. İş məhlulu emal günü hazırlanmalı, tank yarıya qədər su ilə doldurulmalı, qarışdırıcı işləyərkən lazımı miqdarda CURAR 250 EC əlavə edilməli və qalan su tamamlanmalıdır.

Apply by spraying during the growing season: for apple and grape 3 times at 0.25–0.38 l/ha, and for tomatoes, peppers, and cucumbers (protected areas) 2 times at 0.64–0.8 l/ha.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE
Cypermethrin 250 g/l EC

FORMULYASIYA · FORM. EC

QABLAŞDIRMA · PACK 1 L

KATEQORIYA · CATEGORY İnsektisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Mandriguera 100 CS

LAMBDA-CYHALOTHRIN 100 G/L CS

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

MANDRIGUERA 100 CS kontakt və mədə təsirli insektisiddir, kapsul suspensiyası (CS) formasında 100 q/l Lambda-sihalotrin təsiredici maddəsi ilə hazırlanmışdır.

MANDRIGUERA 100 CS is a contact and stomach insecticide formulated as a capsule suspension containing Lambda-cyhalothrin at 100 g/l.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Alma (meyvə güvəsi — Codling moth, Tortricidae) və kartof (Kolorado kartof böcəyi) bitkilərini zərərvericilərdən qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Apple (Codling moth, Tortricidae), Potato (Colorado potato beetle)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Məhsul vegetasiya dövrü ərzində, mövsümdə 2 dəfə olmaqla, püskürtmə üsulu ilə tətbiq edilir. Alma üçün 0,2 l/ha, kartof üçün isə 0,1 l/ha doza ilə istifadə olunur. İş məhlulu istifadə günü hazırlanmalı, tank yarısına qədər su ilə doldurulmalı, MANDRIGUERA 100 CS əlavə edilməli, sonra qalan su tökülməli və qarışdırıcı tam həll olana qədər işlədilməlidir.

Apply by spraying during the growing season, twice per season. Use 0.2 l/ha for apple crops and 0.1 l/ha for potato crops.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · **Lambda-cyhalothrin 100**
ACTIVE g/l CS


FORMULYASIYA · FORM. **CS**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 L**

KATEQORIYA · CATEGORY **İnsektisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Ajustar 200 WP

PYRIDABEN 200 G/KG WP

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

Ajustar 200 WP, hər kiloqramda 200 q Pyridaben təsiredici maddəsi olan isladılan toz (WP) formasında kontakt insekto-akarısiddir.

Ajustar 200 WP is a contact insecto-acaricide containing Pyridaben at 200 g/kg in wettable powder formulation.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Məhsul müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərini zərərli həşəratlara və gənələrə (akarlar) qarşı qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kontakt təsir mexanizmi ilə həşərat və gənə zərərvericilərinə qarşı effektiv mübarizə aparır.

Insects and mites (acaricide); general crop protection against insect and mite pests

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Məhsul tövsiyə olunan dozalarda su ilə qarışdırılaraq çiləmə yolu ilə istifadə edilir. Qoruyucu təsir müddəti 30 günə qədərdir. İstifadə zamanı etiket üzərindəki təlimatlara ciddi əməl edilməlidir.

Apply as a wettable powder mixed with water at recommended doses. The protection period lasts up to 30 days after application. Use strictly according to label instructions to avoid phytotoxicity.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ ·
ACTIVE

Pyridaben 200 g/kg
WP

FORMULYASIYA · FORM.

WP

QABLAŞDIRMA · PACK

1 kg

KATEQORIYA · CATEGORY

İnsektisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Curador 200 SC

CHLORANTRANİLİPROLE 200 G/L SC

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

CURADOR 200 SC, Xlorantraniliprol 200 q/L tərkibli yeni nəsil insektisiddir və suspenziya konsentratı (SC) formasında istehsal olunur.

CURADOR 200 SC is a new generation insecticide formulated as a Suspension Concentrate containing Chlorantraniliprole 200 g/L.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Gavalı və şaftalı üçün: *Cydia funebrana*, *Grapholitha molesta*. Alma və üzüm üçün: *Ancylis variegana*, *Ancylis achatana*, *Adoxophyes orana*, *Spilonota ocellana*, *Cydia pomonella*, *Lithocolletis* spp., *Grapholitha molesta*, *Lobesia botrana* zərərvericilərinə qarşı istifadə olunur.

Plum, Peach: *Cydia funebrana*, *Grapholitha molesta*. Apple, Grape: *Ancylis variegana*, *Ancylis achatana*, *Adoxophyes orana*, *Spilonota ocellana*, *Cydia pomonella*, *Lithocolletis* spp.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Gavalı və şaftalıda 0,175 l/ha dozada vegetasiya dövründə 2 dəfə çiləmə yolu ilə tətbiq edilir. Alma və üzümdə isə 0,15–0,3 l/ha dozada vegetasiya dövründə 1–2 dəfə çiləmə aparılır. İş məhlulu istifadə günü hazırlanmalı, çən yarıya qədər su ilə doldurulmalı, lazımi miqdarda CURADOR 200 SC əlavə edilməli və qalan su tökülərək qarışdırıcı işə salınmalıdır.

For plum and peach, apply at 0.175 l/ha by spraying during the growing season (2 times). For apple and grape, apply at 0.15–0.3 l/ha by spraying during the growing season (1–2 times).

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Chlorantraniliprole 200 g/L SC
FORMULYASIYA · FORM.	SC
QABLAŞDIRMA · PACK	1 L
KATEQORIYA · CATEGORY	İnsektisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Lamar 500 WG

PİRİMİCARB 500 G/KG WG

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

LAMAR 500 WG, aktiv maddəsi Pirimicarb (500 q/kg) olan, Karbamat kimyəvi sinifinə aid su dispersiyalı qranul insektisiddir. Məhsul meyvə, taxıl, yem və tərəvəz bitkilərindəki mənənə növlərinin əksəriyyətinə, o cümlədən fosforüzvi...

LAMAR 500 WG is a water dispersible granule insecticide belonging to the Carbamate chemical class, with Pirimicarb as its active ingredient at 500 g/kg concentration.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Məhsul meyvə, taxıl, yem və tərəvəz bitkilərini zədələyən əksər mənənə növlərinə, xüsusilə fosforüzvi insektisidlərə qarşı davamlılıq qazanmış mənənələrə qarşı nəzərdə tutulmuşdur.

Most aphid species (including organophosphate-resistant aphids) on fruit, cereal, forage, and vegetable crops.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Məhsul tövsiyə edilən dozalarda istifadə edildikdə bitkiyə zərər vermir və fitotoksiklik müşahidə edilmir. Tətbiq zamanı, hava şəraitinə və zərərverici növünə görə qoruyucu təsir 3–4 həftə davam edir. Tətbiqdən bir neçə dəqiqə sonra, ən gec 2–3 saat ərzində sürətli təsir başlayır.

Apply at recommended doses to avoid phytotoxicity; the product does not cause plant damage when used correctly. Protection lasts 3 to 4 weeks depending on insect type, weather conditions, and timing of...

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Pirimicarb 500 G/KG WG
FORMULYASIYA · FORM.	WG
QABLAŞDIRMA · PACK	500 g
KATEQORIYA · CATEGORY	İnsektisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Argola 250 EC

DELTAMETHRİN 25 G/L EC

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

Argola 25 EC, 25 q/l Deltametrin təsiredici maddəsi olan piretroid sinifli emulsialaşan konsentrat insektisiddir. Məhsul həşəratlara həm udma, həm də birbaşa təmas yolu ilə təsir edərək sinir membranlarında natrium ion kanalının...

Argola 25 EC is an emulsifiable concentrate insecticide belonging to the pyrethroid chemical class, containing Deltamethrin at 25 g/l.

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE Deltamethrin 25 g/l EC

FORMULYASIYA · FORM. EC

QABLAŞDIRMA · PACK 1 L

KATEQORIYA · CATEGORY İnsektisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Xiyar (pambıq mənənəsi, trips, delia platura), Taxıl (zərərli tısbağa, mənənələr, taxıl zəlisi, trips, taxıl böcəyi, taxıl milçəyi, bürğələr, taxıl gecəquşu), Qarğıdalı (pambıq gecəquşu, qarğıdalı zolaqlısı), Pomidor (kolorado böcəyi, kələm kəpənəyi, gecəquşu), Kələm (gecəquşular, güvələr, bürğələr, kəpənəklər, mənənələr),...

Cucumbers (cotton aphid, thrips, delia platura), Cereals (harmful tortoise, louses, grain leech, thrips, grain beetle, grain flies, fleas, grain noctuid), Maize (cotton noctuid, maize stripe), Tomato...

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

İş məhlulu emal günündə hazırlanır: çənin yarısu ilə doldurulur, qarışdırıcı işləyərkən lazımi miqdarda Argola 25 EC əlavə edilir, sonra qalan su tökülür. Məhsul vegetasiya dövründə bitki növündən asılı olaraq 1-2 dəfə, hektara 0,15-0,7 l normasında çiləmə yolu ilə tətbiq edilir.

The working solution is prepared on the day of application by half-filling the tank with water, adding the required amount of Argola 25 EC while the mixer is running, then adding the remaining water.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]



Anillito 200 SP

ACETAMİPRİD 200 G/KG SP

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

ANILLITO 200 SP — Asetamiprid 200 q/kq tərkibli suda həll olan sistematik, kontakt və mədə insektisididir. Məhsul Suda Həll Olan Toz (SP) formasında hazırlanmış olub, hava şəraitindən və tətbiq vaxtından asılı olaraq 3 həftəyə...

ANILLITO 200 SP is a water-soluble systemic, contact and stomach insecticide containing Acetamiprid at 200 g/kg.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Pambıq bitkisindeki yarpaq birəsi və tripsə, kartof bitkisindeki kolorado böcəyinə, istixanada yetişdirilən pomidor və xiyardakı ağ sürfəyə (ağca qanad) qarşı effektivdir.

Cotton (leaf flea, louse thrips), Potato (colorado beetle), Tomato and Cucumber in hothouse (white fly)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Məhsul vegetasiya dövründə püskürtmə yolu ilə tətbiq edilir: pambıq üçün 0,1 kq/ha (2 dəfə), kartof üçün 0,06 kq/ha (1-2 dəfə), istixanada pomidor və xiyar üçün 0,3 kq/ha (1 dəfə). İş məhlulu istifadə günü hazırlanmalı, tank yarısına qədər su ilə doldurulmalı, lazımi miqdarda preparat əlavə edilməli və qarışdırıcı işə salınaraq qalan su əlavə edilməlidir.

The product is applied by spraying during the growing season. Application rates vary by crop: 0.1 kg/ha for cotton (2 times), 0.06 kg/ha for potato (1-2 times), and 0.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE Acetamiprid 200 g/kg SP

FORMULYASIYA · FORM. SP

QABLAŞDIRMA · PACK 500 g

KATEQORIYA · CATEGORY İnsektisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Corro 240 SC

SPİRODICLOFEN 240 G/L SC

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

CORRO 240 SC — aktiv maddəsi Spirodiclofen 240 q/L olan suspenziya konsentratı formasında insekto-akarısiddir. Preparat əsasən kontakt təsir mexanizminə malikdir və müxtəlif gənə növlərinə qarşı effektiv şəkildə istifadə olunur.

CORRO 240 SC is a suspension concentrate insecto-acaricide with Spirodiclofen 240 g/L as its active ingredient.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Məhsul ərik, üzüm və şaftalıda iki nöqtəli qırmızı gənəyə; sitrus ağaclarında qırmızı gənə və gümüşü gənəyə; almada isə gənə növlərinə qarşı nəzərdə tutulmuşdur.

Apricot, Grape, Peach (Two dotted red tick); Citrus Tree (Red tick, Silver tick); Apple (Ticks)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Preparat vegetasiya dövründə 0,75 l/ha normasında 2 dəfə çiləmə yolu ilə tətbiq edilir. İş məhlulu istifadə günü hazırlanmalı, çən yarıya qədər su ilə doldurulmalı, CORRO 240 SC əlavə edilməli və qarışdırıcı işə salınmaqla qalan su tamamlanmalıdır. Mühafizə dövrü 14–21 gün təşkil edir.

Apply at a rate of 0.75 l/ha by spraying during the growing season, twice per season. Working solution should be prepared on the day of application by half-filling the tank with water, adding the required...

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Spirodiclofen 240 g/L SC
FORMULYASIYA · FORM.	SC
QABLAŞDIRMA · PACK	1 L
KATEQORIYA · CATEGORY	İnsektisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Spirotetramat 100 g/l SC
FORMULYASIYA · FORM.	SC
QABLAŞDIRMA · PACK	1 L
KATEQORIYA · CATEGORY	İnsektisid

CERRADO SOL
İspaniya · SpainEU
Uyğunluq · Compliant

Zumbar 100 SC

SPIROTETRAMAT 100 G/L SC

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

ZUMBAR 100 SC, hər litrdə 100 q Spirotetramat təsiredici maddəsi olan sistem təsirli insektisiddir və Suspenziya Konsentratı (SC) formasında hazırlanmışdır.

ZUMBAR 100 SC is a systemic insecticide formulated as a Suspension Concentrate containing Spirotetramat at 100 g/l.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Armut ağaclarında Bəkar zərərvericilərinə və Sitrus ağaclarında Qalxanlı bitlərinə qarşı nəzərdə tutulmuşdur.

Pear (Baker insects), Citrus Tree (Scales)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Məhsul vegetasiya dövründə 0,75 l/ha normasında, 2 dəfə püskürtmə üsulu ilə tətbiq edilir. İş məhlulu istifadə günü hazırlanmalı, tank yarısına qədər su ilə doldurulmalı, lazımı miqdarda ZUMBAR 100 SC əlavə edilməli, sonra qalan su tökülməlidir. Qarışdırıcı tam həll olana qədər işləməlidir.

Apply at a rate of 0.75 l/ha by spraying during the growing season, with 2 applications recommended. The working solution should be prepared on the day of use by half-filling the tank with water, adding the...

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]



DETECTAR 200 EC

BİFENTHRİN 200 G/L

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

DETECTAR 200 EC, aktiv maddəsi 200 q/l Bifentrin olan, piretroid kimyəvi sinifinə aid emulsiyalaşan konsentrat insektisiddir. Preparat həm kontakt, həm də mədə təsiri göstərərək zərərvericilərə qarşı sürətli və uzunmüddətli...

DETECTAR 200 EC is an emulsifiable concentrate insecticide belonging to the pyrethroid chemical class, containing 200 g/l Bifenthrin as its active ingredient.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Pomidor bitkisinə *Myzus persicae* (şəftəli yaprak biti), badımcanda *Tetranychus cinnabarinus* (qırmızı hörümçək gənəsi) və şaftalıda *Myzus persicae* zərərvericilərini məhv etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Tomatoes (*Myzus persicae*), Eggplant (*Tetranychus cinnabarinus*), Peaches (*Myzus persicae*)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

İş məhlulu emal günündə hazırlanmalıdır: çənin yarısı su ilə doldurulur, qarışdırıcı işləyərkən lazımi miqdarda DETECTAR 200 EC əlavə edilir, sonra qalan su tamamlanır. Tətbiq norması bitki və zərərverici növündən asılı olaraq 50–70 mL/100 L su təşkil edir. Vegetasiya dövründə 2–3 dəfə səpilərək istifadə olunur.

Prepare the working solution on the day of application by half-filling the tank with water, adding the required amount of DETECTAR 200 EC while the mixer is running, then topping up with water.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Bifenthrin 200 g/l**

FORMULYASIYA · FORM. **EC**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 L**

KATEQORIYA · CATEGORY **İnsektisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Cosido 480 SC

DİFLUBENZURON 480 G/L

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

COSIDO 480 SC, 480 q/l Diflubenzuron təsirli maddəsi olan suspenziya konsentrat insektisiddir və Benzamid kimyəvi sinifinə aiddir.

COSIDO 480 SC is a suspension concentrate insecticide containing 480 g/l Diflubenzuron, belonging to the Benzamide chemical class.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Alma (daxili qurd), Armud (bəkər), Fındıq (Amerika ağ kəpənəyi), Zeytun (zeytun güvəsi) — bu bitkilərdəki zərərvericilərə qarşı nəzərdə tutulmuşdur. Apple (internal worm), Pear (baker), Hazelnut (American white butterfly), Olive (olive moth)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

İş məhlulu emal günü hazırlanır: çən yarısına qədər su ilə doldurulur, qarışdırıcı işlədikcə lazımı miqdarda COSIDO 480 SC əlavə edilir, sonra qalan su tamamlanır. Əksər bitkilər üçün doza 40 ml/100 l su, fındıq üçün isə 20 ml/100 l sudur; vegetasiya dövrü ərzində 2 dəfə tətbiq edilir. Qoruyucu təsir müddəti 3–4 həftədir.

The working solution is prepared on the day of application by half-filling the tank with water, adding the required amount of COSIDO 480 SC, and topping up with water while the agitator runs.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ ·
ACTIVE

Diflubenzuron 480 g/
I

FORMULYASIYA · FORM.

SC

QABLAŞDIRMA · PACK

1 L

KATEQORIYA · CATEGORY

Insektisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Tapiar EC

HEXYTHIAZOX 50 G/L

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

TAPIAR EC emulsiyalaşan konsentrat formasında hazırlanmış, sistemik olmayan bir akarisiddir. Kontakt və mədə yolu ilə təsir göstərir, yaxşı translaminar aktivliyə malikdir.

TAPIAR EC is a non-systemic acaricide formulated as an emulsifiable concentrate with contact and stomach action.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Xiyar bitkisiində *Tetranychus urticae*, alma və üzümdə *Tetranychus urticae* və *Panonychus ulmi*, istixanada yetişdirilən pomidorda isə *Tetranychus urticae* (adi hörümçək gənəsi) zərərvericilərinə qarşı istifadə edilir.

Cucumber (*Tetranychus urticae*), Apple and Grape (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*), Tomato in greenhouse (*Tetranychus urticae*)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

TAPIAR EC bitkidən asılı olaraq hər 100 litr suya 50–100 ml nisbətində istifadə edilir. Vegetasiya dövründə 1–2 dəfə çiləmə yolu ilə tətbiq olunur. İş məhlulu istifadə günü hazırlanmalı, çən yarım su ilə doldurulduqdan sonra preparat əlavə edilməli, qalan su tamamlanmalı və qarışdırıcı işlədilməlidir.

Apply by spraying 1–2 times during the growing season at rates of 50–100 ml per 100 liters of water depending on the crop.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Hexythiazox 50 g/l**

FORMULYASIYA · FORM. **EC**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 L**

KATEQORIYA · CATEGORY **İnsektisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Amurallar 110 SC

ETOXAZOLE 110 G/L

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

AMURALLAR 110 SC, 110 q/l Etoksazol təsiredici maddəsi olan, Oksazolin kimyəvi sinifinə aid asma konsentrat (SC) akarisiddir. Bu preparat genə artımının inhibitoru kimi fəaliyyət göstərir, yumurta, sürfə və nimfalara təsir edir,...

AMURALLAR 110 SC is a suspension concentrate acaricide containing 110 g/l Etoxazole, belonging to the Oxazoline chemical class.

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Ettoxazole 110 g/l**

FORMULYASIYA · FORM. **SC**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 L**

KATEQORIYA · CATEGORY **İnsektisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Gavalı və alma ağacları üçün nəzərdə tutulmuşdur; Bryobiidae və Tetranychidae (hörümçək gənələri) fəsiləsinə aid zərərvericiləri məhv edir. Plum and apple trees; target pests: Bryobiidae, Tetranychidae (spider mites)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Preparat vegetasiya mövsümündə bir dəfə, 0,5 l/ha normasında çiləmə yolu ilə tətbiq edilir. İş məhlulu istifadə günü hazırlanmalı, tank yarıya qədər su ilə doldurulmalı, qarışdırıcı işləyərkən lazımı miqdarda preparat əlavə edilməli, sonra qalan su tökülməlidir.

Apply at a rate of 0.5 l/ha by spraying, once during the growing season. The working solution should be prepared on the day of application by half-filling the tank with water, adding the required amount of...

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]



Corriente 480 SC

SPINOSAD 480 G/L

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

CORRIENTE 480 SC, 480 q/l Spinosad tərkibli təbii mənşəli həşəratvandır və Spinosyn kimyəvi sinifinə aiddir. Məhsul lepidoptera sürfələrinə qarşı təmas və udma yolu ilə təsir göstərərək onlarda iflic yaradır.

CORRIENTE 480 SC is a naturally derived suspension concentrate insecticide containing 480 g/l Spinosad, belonging to the Spinosyn chemical class.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Alma və armud (Tortricidae, güvələr), şaftalı və gavalı (Grapholita molesta), kartof (Kolorado böcəyi, 1-4 yaşlı yaşıl sürfələr), açıq sahədə pomidor (pambıq sovkası, pomidor güvəsi / Tuta absoluta) əkinləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Apple and pear (Tortricidae, Moths), Peach and plum (Grapholita molesta), Potato (Colorado beetle, 1-4 green larvae), Tomato open area (Cotton noctuid, tomato moth / Tuta absoluta)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

İş məhlulu emal günündə hazırlanır: çən yarıya qədər su ilə doldurulur, lazımı miqdarda CORRIENTE 480 SC əlavə edilir, sonra qalan su tökülür və qarışdırıcı tam həll olana qədər işlədir. Tətbiq normaları: alma/armud və şaftalı/gavalı üçün 20 ml/100 L su, kartof üçün 10 ml/da, pomidor (açıq sahə) üçün 30 ml/100 L su. Vegetasiya mövsümü ərzində 3 dəfə səpilir.

The working solution is prepared on the day of application by half-filling the tank with water, adding the required amount of CORRIENTE 480 SC, then topping up with water while the agitator runs.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Spinosad 480 g/l**

FORMULYASIYA · FORM. **SC**

QABLAŞDIRMA · PACK **500 ml**

KATEQORIYA · CATEGORY **İnsektisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Spirodiclofen 222 g/L + Abamectin 18 g/L
FORMULYASIYA · FORM.	SC
QABLAŞDIRMA · PACK	1 L
KATEQORIYA · CATEGORY	İnsektisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant

Parador 240 SC

SPİRODICLOFEN 222 G/L + ABAMECTİN 18 G/L

Zərərvericilərə qarşı etibarlı nəzarət / Reliable insect pest control

TƏYİNAT · PURPOSE

PARADOR 240 SC, müxtəlif təsir mexanizmlərinə malik iki aktiv maddənin tamamlayıcı üstün effekteinə sahib olan akarisid preparatdır.

PARADOR 240 SC is a suspension concentrate acaricide containing two active substances with complementary and superior modes of action.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Üzüm (iki ləkəli qırmızı gənə – Tetranychus urticae), Alma (Avropa qırmızı gənəsi – Panonychus ulmi; Alça gənəsi – Tetranychus viennensis), Albalı (iki ləkəli qırmızı gənə – Tetranychus urticae), Şaftalı (iki ləkəli qırmızı gənə – Tetranychus urticae) bitkilərindəki zərərli gənə növlərini məhv edir.

Grapes (Two-Spotted red spider – Tetranychus urticae), Apple (European red spider – Panonychus ulmi; Buckthorn mite – Tetranychus viennensis), Cherry (Two-Spotted red spider – Tetranychus urticae), Peach...

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

100 litr suya 20 ml preparat əlavə edilərək işçi məhlul hazırlanır və bitkinin bütün hissələri hava sərin və sakit olduqda püskürdülür. İşçi məhlul istifadə günü hazırlanmalı, tank yarısına qədər su ilə doldurulmalı, PARADOR 240 SC əlavə edilməli, sonra qalan su tamamlanmalı və qarışdırıcı işlədiyi müddətdə həll olunana qədər qarışdırılmalıdır.

Mix 20 ml per 100 liters of water and spray to cover all parts of the plants when the air is cool and calm. Prepare the working solution on the day of use by first half-filling the tank with water, adding the...

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

14 days (table grapes, apple, cherry, peach); 21 days (grape leaves); Cherry spraying should be done on fruitless trees or after harvest



BÖLMƏ 02

Funqisidlər

Fungicides

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər
Protective & curative disease control

20 MƏHSUL · 20 PRODUCTS



Baiar 550 SC

DİFENOCONAZOLE 200 G/L + THIAMETHOXAM 350 G/L SC

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

BAIAR 550 SC iki komponentli suspenziya konsentratıdır: fungisid (difenokonazol) və sistemli insektisid (tiametoksam) birləşməsindən ibarətdir.

BAIAR 550 SC is a dual-component suspension concentrate combining a fungicide (difenoconazole) and a systemic insecticide (thiamethoxam).

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Meyvə ağacları (çəkirdəkli və çəyirdəkli): unlu şəh, yarpaq parşası, meyvə psillası (Psyllia P); Üzüm: oidium (unlu şəh). Preparat həmçinin baş yanıqlığı, kök çürüməsi və toxum kifləşməsinə qarşı da effektivdir.

Fruit trees (pome and stone fruits): Powdery mildew, Leaf scab, Psylla (Psyllia P); Grapes: Oidium, Powdery mildew

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Meyvə ağacları üçün 0,3–0,4 l/ha, üzüm üçün isə 0,4–0,5 l/ha dozasında tətbiq edilməlidir; vegetasiya dövrü ərzində maksimum 2 dəfə işlənir. İş məhlulu işləmə günü hazırlanmalı, bak yarıya qədər su ilə doldurularaq qarışdırıcı işə salınmalı, lazımı miqdarda preparat əlavə edilməli və qalan su tamamlanmalıdır.

Apply at 0.3–0.4 l/ha for fruit trees and 0.4–0.5 l/ha for grapes, with a pre-harvest interval of 14 days and maximum 2 applications per season.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

14 days

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Difenoconazole 200 g/l + Thiamethoxam 350 g/l SC
FORMULYASIYA · FORM.	SC
QABLAŞDIRMA · PACK	1 L
KATEQORIYA · CATEGORY	Funqisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Predador 220 EC

TEBUCONAZOLE 125 g/L + TRIADIMEFON 100 g/L

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

PREDADOR 225 SC həm qoruyucu, həm də müalicəvi təsirə malik sistemli fungisiddir. Tərkibində 125 q/L Tebükonazol və 100 q/L Triadimefon fəal maddələri var.

PREDADOR 225 SC is a systemic fungicide with both protective and curative action containing Tebuconazole 125 g/L and Triadimefon 100 g/L.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Üzüm (Oidium, Mildyu xəstəliklərinə qarşı) və meyvə ağacları — həm toxumlu (alma, armud), həm də çəyirdəkli (şaftalı, giləs) növlər — Oidium xəstəliyinə qarşı nəzərdə tutulmuşdur.

Grapes (Oidium, Mildew), Fruit trees including pome and stone fruits (Oidium)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Üzüm bağlarında Oidium və Mildyuya qarşı 0,5 l/ha normasında, məhsul yığımına 14 gün qalmış (2–3 müalicə) istifadə edilir. Meyvə ağaclarında (toxumlu və çəyirdəkli) Oiduma qarşı 0,4 l/ha normasında, məhsul yığımına 14 gün qalmış (2–3 müalicə) tətbiq olunur.

For grapes, apply at 0.5 L/ha against Oidium and Mildew with a pre-harvest interval of 14 days (2–3 applications). For fruit trees (pome and stone fruits), apply at 0.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

14 days

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Tebuconazole 125 g/L +
Triadimefon 100 g/L**

FORMULYASIYA · FORM. **SC**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 L**

KATEQORIYA · CATEGORY **Funqisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Divisar 750 WG

CYPRODİNİL 750 G/KG

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

DIVISAR 750 WG, hər kq-da 750 q Siprodinil təsiredici maddəsi olan sistemli təsirli fungisiddir. Preparat su ilə həll olunan qranul formasında hazırlanmışdır və bitkinin daxilinə nüfuz edərək xəstəlikləri məhv edir. DIVISAR 750 WG is a systemic fungicide in water-soluble granule form containing Cyprodinil at 750 g/kg concentration.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Tumlu meyvə bitkilərində (alma, armud) dəmgil (parşa), monilioz və alternarioz xəstəliklərinə; çeyirdəkli meyvə bitkilərində (gilas, alça, şaftalı) isə monilioz xəstəliyinə qarşı nəzərdə tutulmuşdur.

Pome fruits (scab, moniliosis, alternariosis) and stone fruits (moniliosis)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Preparat su ilə həll edilərək bitkilərə çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir. Saxlama temperaturu +10°C ilə +35°C arasında olmalı, preparat öz qablaşdırmasında, pestisidlər üçün nəzərdə tutulmuş quru və sərin yerdə saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 5 ildir.

Apply as a water-soluble granule formulation by dissolving in water and spraying on affected crops. Store in original packaging in a dry, cool pesticide storage facility between +10°C and +35°C.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Cyprodinil 750 g/kg**

FORMULYASIYA · FORM. **WG**

QABLAŞDIRMA · PACK **500 g**

KATEQORIYA · CATEGORY **Funqisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Pyrat 800 WG

CAPTAN 800 G/KG

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

PYRAT 800 WG, Ftalimid kimyəvi sinifinə aid olan, həm qoruyucu, həm də müalicəvi təsirə malik sistemik olmayan bir funqisiddir. Preparat patogenlərdə tənəffüsü maneə törədən qeyri-spesifik tiol reaktanı kimi fəaliyyət göstərir.

PYRAT 800 WG is a non-systemic fungicide with both protective and curative action, belonging to the Phthalimide chemical class.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Üzüm, tumlu meyvələr (alma, armud) və çəyirdəkli meyvələr (şaftalı, gavalı) üçün nəzərdə tutulmuşdur; qotur, məxmərəki xəstəlik, boz çürümə və çəyirdəkli meyvələrdə dəşik xəstəliyinə qarşı istifadə olunur.

Scab, downy mildew, brown rot on grapes, pome fruits and stone fruits; shot hole disease on stone fruits

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Optimal qoruma üçün hər 14 gündən bir tətbiq edilməsi tövsiyə olunur. İstifadədən 12 saat sonra preparat patogenlərdə ergosterol biosintezini maneə törətməyə başlayır. Fitotoksikliyin qarşısını almaq üçün tövsiyə olunan dozalarda istifadə edilməlidir.

Apply every 14 days for optimal protection. After 12 hours, the product begins to repress ergosterol biosynthesis in pathogens. Use under recommended doses to avoid phytotoxicity.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Captan 800 g/kg**

FORMULYASIYA · FORM. **WG**

QABLAŞDIRMA · PACK **10 kg**

KATEQORIYA · CATEGORY **Funqisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Copiar 800 WP

MANCOZEB 800 G/KG

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

COPIAR 800 WP — 800 q/kg mankoseb tərkibli geniş spektrli üzvi kontakt fungusiddir. O, kənd təsərrüfatı istehsalında istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Preparat bitkiləri müxtəlif göbələk xəstəliklərindən qoruyur. COPIAR 800 WP is an organic contact fungicide with a broad spectrum of action containing 800 g/kg mancozeb.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Bitkilər: ərzaq və toxumluq kartof, pomidor, üzüm, alma ağacı. Xəstəliklər: fitoftoroz, makrosporo, rizoktoniya, mildyu (nazik şəh), qoturaşı (parşa)
Crops: potato (food and seed), tomatoes, grapes, apple trees. Diseases: late blight (Phytophthora), Macrosporium (alternaria), Rhizoctonia, downy mildew (Peronospora/Plasmopara), scab

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Preparat qablaşdırma ilə birlikdə verilən tövsiyələrə uyğun olaraq göstərilən bitkilərə kontakt fungusid kimi tətbiq edilir. Tətbiq normaları və vaxtı əlavə təlimatlarda göstərilmişdir. Yalnız kənd təsərrüfatı istehsalı üçün nəzərdə tutulmuşdur.

The product is applied as a contact fungicide on the listed crops according to the recommendations provided with the packaging.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Mancozeb 800 g/kg**

FORMULYASIYA · FORM. **WP**

QABLAŞDIRMA · PACK **5 kg**

KATEQORIYA · CATEGORY **Funqisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Thiram 800 g/kg WG
FORMULYASIYA · FORM.	WG
QABLAŞDIRMA · PACK	1 kg
KATEQORIYA · CATEGORY	Funqisid

CERRADO SOL
İspaniya · SpainEU
Uyğunluq · Compliant

Guarura 800 WG

THİRAM 800 G/KG WG

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

GUARURA 800 WG ditiokarbamat kimyəvi sinfine aid kontakt funqisiddir və su dispersiyalı qranul (WG) formasında istehsal edilir. Aktiv maddəsi kimi 800 q/kg Tiram ehtiva edir.

GUARURA 800 WG is a contact fungicide belonging to the dithiocarbamate chemical class, formulated as a water dispersible granule.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Etiketdə konkret bitki növləri göstərilməmişdir; məhsul ümumi funqal xəstəliklərə qarşı kənd təsərrüfatı bitkilərinin mühafizəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

General fungal diseases on crops; specific crops not mentioned on label

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Məhsul su ilə həll edilərək kontakt funqisid kimi tövsiyə olunan dozalarda tətbiq edilməlidir. Qoruyucu təsir müddəti 14 günə qədər davam edir, bundan sonra yenidən müalicə tələb oluna bilər. Fitotoksikliyin qarşısını almaq üçün etiketdəki təlimatlara əməl edilməlidir.

Apply at recommended doses as a contact fungicide dispersed in water. The protective period lasts up to 14 days, after which reapplication may be necessary.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]



Afrontar 250 ME

BUPIRIMATE 250 G/L ME

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

AFRONTAR 250 ME mikro emulsiya formasında 250 q/l Bupimat təsiredici maddəsi olan sistemli fungisiddir. Preparat translaminar hərəkətliyə malik olub ksilem vasitəsilə sistemli translokasiya edir.

AFRONTAR 250 ME is a systemic fungicide containing Bupirimate 250 g/l in micro emulsion formulation.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Alma (*Podosphaera leucotricha* – unlu şəh xəstəliyi) və üzüm (*Uncinula necator* – unlu şəh xəstəliyi) bitkilərinin xəstəliklərinin mübarizəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Apples (*Podosphaera leucotricha* – powdery mildew), Grapes (*Uncinula necator* – powdery mildew)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Alma bağlarında 0,9 l/ha, üzümlüklərdə isə 0,8–1,5 l/ha normasında vegetasiya dövrü ərzində 4 dəfə çiləmə yolu ilə tətbiq edilir. İş məhlulu istifadə günü hazırlanmalı, bak yarıya qədər su ilə doldurulmalı, qarışdırıcı işləyərkən preparat əlavə edilməli və qalan su tamamlanmalıdır. Saxlama temperaturu +5°C ilə +35°C arasında olmalıdır.

Apply by spraying during the growing season up to 4 times at a rate of 0.9 l/ha for apples and 0.8–1.5 l/ha for grapes.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Bupirimate 250 g/l ME
FORMULYASIYA · FORM.	ME
QABLAŞDIRMA · PACK	1 L
KATEQORIYA · CATEGORY	Funqisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Dithianon 700 g/kg WG
FORMULYASIYA · FORM.	WG
QABLAŞDIRMA · PACK	1 kg
KATEQORIYA · CATEGORY	Funqisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant

Tratar 700 WG

DİTHİANON 700 G/KG WG

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

TRATAR 700 WG, hər kiloqramda 700 q Dithianon tərkibli, suda həll olunan qranul (WG) şəklində hazırlanmış yarpaq funqisididir. Məhsul həm qoruyucu, həm də müəyyən dərəcədə müalicəvi təsirə malikdir.

TRATAR 700 WG is a foliar fungicide formulated as a water dispersable granule containing 700 g/kg Dithianon.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Məhsul əsasən alma və digər meyvə bitkiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur; göbələk sporlarına və göbələk xəstəliklərinə qarşı istifadə olunur. Golden Delicious alma sortunda cüzi fitotoksiklik riski qeyd olunur.

Apple and other crops; targets fungal spores and fungal diseases. Slight phytotoxicity risk noted on Golden Delicious apple variety.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Məhsul vegetasiya dövründə 2–3 dəfə tətbiq edilməlidir. Müalicədən sonra bitkilərin üzərində yağışa davamlı qoruyucu təbəqə əmələ gəlir və bu təbəqə göbələk sporlarının cücərməsini effektiv şəkildə maneə törədir. Təvsiyə olunan dozalarda məhsul fitotoksiklik göstərmir, lakin Golden Delicious kimi bəzi alma sortlarında cüzi ləkələnmə baş verə bilər.

The product should be applied 2–3 times during the vegetation period. After treatment, a rain-resistant protective layer forms on plants that effectively inhibits the germination of fungal spores.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]



TƏSİREDİCİ MADDƏ ·
ACTIVE **Kresoxim methyl 500 g/
kg WG**

FORMULYASIYA · FORM. **WG**

QABLAŞDIRMA · PACK **500 g**

KATEQORIYA · CATEGORY **Funqisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant

Silex 500 WG

KRESOXİM METHYL 500 G/KG WG

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

SILEX 500 WG, hər kq-da 500 q Kresoksım-metil təsiredici maddəsi olan sistemik funqisiddir və su dispersiyalı qranul formasında istehsal edilir.

SILEX 500 WG is a systemic fungicide in water dispersible granule formulation containing Kresoxim methyl at 500 g/kg.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Üzüm bitkisinə unlu şəh (xəstəliyi) və oidium, alma bitkisinə isə alma qaşovuna (parşa) qarşı istifadə olunur.

Grape (powdery mildew, oidium), Apple (apple scab)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

İş məhlulu emal günü hazırlanmalıdır: tank yarıya qədər su ilə doldurulur, lazımi miqdarda SILEX 500 WG əlavə edilir və qarışdırıcı işləyərkən qalan su əlavə edilir. Üzüm üçün 0,2–0,3 l/ha, alma üçün 0,25–0,3 l/ha dozada vegetasiya dövründə 2–3 dəfə çiləmə yolu ilə tətbiq edilir. Hər istifadədən əvvəl digər preparatlarla uyğunluğu yoxlanılmalıdır.

The working solution should be prepared on the day of application by half-filling the tank with water, adding the required amount of SILEX 500 WG, and topping up with water while the agitator runs.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]



Estrellar 100 EC

PENCONAZOLE 100 G/L EC

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

ESTRELLAR 100 EC həm qoruyucu, həm də müalicəvi təsirə malik sistemli fungusiddir və aktiv maddə kimi 100 q/l Penkonazol ehtiva edir.

ESTRELLAR 100 EC is a systemic fungicide with both protective and curative action, containing Penconazole 100 g/l as active ingredient in emulsifiable concentrate formulation.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Açıq sahə və istixana xiyarları (unlu şəh), qarağat (unlu şəh, beктаşı üzümü xəstəliyi), üzüm (oidium), şaftalı (unlu şəh, meyvə çürüməsi) və alma (unlu şəh) bitkilərini hədəf alır; həmçinin tənəklər, çərdəkli meyvələr, ornamental bitkilər və tərəvəzlərdə patogen göbələklərə qarşı effektivdir.

Cucumbers (open ground and greenhouse) – powdery mildew; Currants – powdery mildew, gooseberry; Grapes – oidium; Peaches – powdery mildew, fruit rot; Apples – powdery mildew

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

İş məhlulu emal günündə xüsusi təchiz edilmiş ərazilərdə hazırlanır: çən yarıya qədər su ilə doldurulur, qarışdırıcı işə salınır və lazımi miqdarda ESTRELLAR 100 EC əlavə edilir, qalan su tamamlanır.

Working solution is prepared on the day of application in specially equipped areas, with the tank half-filled with water before adding the required amount of ESTRELLAR 100 EC. Application rates vary by crop: 0.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Penconazole 100 g/l EC
FORMULYASIYA · FORM.	EC
QABLAŞDIRMA · PACK	1 L
KATEQORIYA · CATEGORY	Fungisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Lamada 700 WP

THIOPHANATE METHYL 700 G/KG

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

LAMADA 700 WP, hər kiloqramda 700 q Thiophanate methyl təsiredici maddəsi olan sistemik fungisiddir. Məhsul həm profilaktik, həm də müalicəvi təsirə malikdir və geniş spektrli göbələk patogenlərinə qarşı istifadə olunur.

LAMADA 700 WP is a systemic fungicide formulated as a wettable powder containing 700 g/kg Thiophanate methyl.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Geniş spektrli göbələk patogenlərinə qarşı müxtəlif bitkilərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur; yarpaqlar və köklər vasitəsilə udularaq göbələk xəstəliklərini məhv edir.

Wide range of fungal pathogens affecting crops; absorbed through leaves and roots

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Məhsul tövsiyə olunan dozalarda tətbiq edilməlidir, bu zaman bitki üçün zəhərlik riski yoxdur. Mühafizə müddəti xəstəliyin növündən, hava şəraitindən və tətbiq vaxtından asılı olaraq 2–6 həftə təşkil edir. Təsir bir neçə dəqiqədən 2–3 saata qədər müddətdə başlayır.

Apply at recommended doses to avoid phytotoxicity. The protection period lasts 2 to 6 weeks depending on disease type, weather conditions, and application timing.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · **Thiophanate methyl 700**
ACTIVE g/kg

FORMULYASIYA · FORM. **WP**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 kg**

KATEQORIYA · CATEGORY **Funqisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Tono 400 SC

DODİNE 400 G/L SC

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

TONO 400 SC, Guanidin kimyəvi sinifinə aid olan, həm qoruyucu həm də məhvəedici təsirə malik asma konsentrat fungisiddir. Tərkibində 400 q/l Dodin aktiv maddəsi mövcuddur və xəstəliyin növündən, hava şəraitindən asılı olaraq 1–2...

TONO 400 SC is a suspension concentrate fungicide belonging to the Guanidine chemical class, used as both a protectant and eradicator against fungal diseases.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Alma, armud, ərik, albalı, şaftalı və heyva bitkilərini Monilioz və Qoturluq (Scab) xəstəliklərinə qarşı qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Apples, pears, apricots, cherries, peaches, quinces — against Moniliosis and Scab

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Vegetasiya dövründə 1,7–2,25 l/ha normasında, mövsüm ərzində 2–3 dəfə püskürtmə yolu ilə tətbiq edilir. Məhlul istifadə günü hazırlanmalı, çən yarıya qədər su ilə doldurulmalı, qarışdırıcı işləyərkən lazımi miqdarda TONO 400 SC əlavə edilməli, sonra qalan su tamamlanmalıdır. Hər istifadədən əvvəl digər preparatlarla uyğunluq yoxlanılmalıdır.

Apply at a rate of 1.7–2.25 l/ha by spraying during the growing season, 2–3 times per season. The working solution should be prepared on the day of application by half-filling the tank with water, adding the...

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Dodine 400 g/l SC**

FORMULYASIYA · FORM. **SC**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 L**

KATEQORIYA · CATEGORY **Funqisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



TƏSİREDİCİ MADDƏ · Fosetyl aluminium 800 g/
ACTIVE kg WG

FORMULYASIYA · FORM. WG

QABLAŞDIRMA · PACK 5 kg

KATEQORIYA · CATEGORY Funqisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant

Coronilla 800 WG

FOSETYL ALUMİNİUM 800 G/KG WG

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

CORONILLA 800 WG — su ilə dispersiya olunan qranul (WG) formasında hazırlanmış, hər kiloqramında 800 q Fosetil alüminium təsiredici maddəsi olan sistemik fungisiddir.

CORONILLA 800 WG is a systemic fungicide formulated as a water dispersible granule containing 800 g/kg Fosetyl aluminium.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

CORONILLA 800 WG müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərini göbələk xəstəliklərindən qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur; sporların cücərməsini, miseliyanın inkişafını və sporullaşmanı məhv etməklə patogen göbələklərə qarşı mübarizə aparır.

Fungal diseases in various crops; targets spore germination, mycelium development, and sporulation of fungal pathogens.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Məhsul tövsiyə edilən dozalarda istifadə edildikdə fitotoksiklik təhlükəsi yaratmır. Tətbiq müddəti hava şəraitindən və müalicənin vaxtından asılı olaraq 18 günə qədər qoruyucu təsir göstərir. Preparat həm yarpaqlar, həm də köklər vasitəsilə sorulduğundan, müalicəni düzgün doza və vaxtda həyata keçirmək lazımdır.

Apply at recommended doses to avoid phytotoxicity; the protection period lasts up to 18 days depending on weather conditions and timing of application. The product can be absorbed through both leaves and roots.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]



Alianza 760 WG

ZİRAM 760 G/KG WG

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

ALIANZA 760 WG, aktiv maddəsi Ziram 760 q/kg olan, suda həll olunan qranul (WG) formasında istehsal edilmiş kontakt fungisiddir. Dimetilditiokarbamat kimyəvi sinfinə aiddir və bitkiləri göbələk xəstəliklərindən qoruyur.

ALIANZA 760 WG is a contact fungicide formulated as water dispersible granules, containing Ziram 760 g/kg as the active ingredient.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Etiketdə konkret bitki növləri qeyd edilməmişdir, lakin məhsul müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərindəki göbələk xəstəliklərinə qarşı kontakt fungisid kimi istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Fungal diseases on crops; specific target crops not mentioned on label

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Məhsul tövsiyə edilən dozalarda kontakt fungisid kimi tətbiq edilməlidir. Qoruyucu təsir müddəti 14 günə qədərdir, bu müddətdən sonra yenidən müalicə tələb oluna bilər. İstifadə zamanı etiket göstərişlərinə ciddi əməl edilməlidir.

Apply at recommended doses as a contact fungicide. The protection period lasts up to 14 days, after which reapplication may be necessary.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Ziram 760 g/kg WG**

FORMULYASIYA · FORM. **WG**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 kg**

KATEQORIYA · CATEGORY **Funqisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Hornillo 500 WG

TRİFLOXYSTROBİN 500 G/KG

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

HORNILLO 500 WG geniş spektrli mezostemik fungisiddir, həm profilaktik, həm də müəyyən dərəcədə müalicəvi təsirə malikdir və yağışa davamlılıq xüsusiyyəti daşıyır.

HORNILLO 500 WG is a mesostemic, broad-spectrum fungicide with preventive and specific curative action, displaying rain fastness.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Kənd təsərrüfatı və bağçılıq bitkilərinin geniş çeşidi üçün nəzərdə tutulmuşdur; geniş spektrli göbələk xəstəliklərini məhv edir.

Wide range of agricultural and horticultural crops; broad-spectrum fungal diseases

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Məhsul tövsiyə olunan dozalarda yarpaqlara püskürtmə yolu ilə tətbiq edilməlidir. Qoruyucu təsir müddəti xəstəliyin növündən, hava şəraitindən və tətbiq vaxtından asılı olaraq 2–6 həftə təşkil edir. Preparat tətbiqdən bir neçə dəqiqə ilə 2–3 saat ərzində sürətlə işə düşür.

Apply as a foliar spray at recommended doses to prevent phytotoxicity. The protection period lasts 2 to 6 weeks depending on disease type, weather conditions, and application timing.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · Trifloxystrobin 500 G/
ACTIVE KG

FORMULYASIYA · FORM. WG

QABLAŞDIRMA · PACK 1 kg

KATEQORIYA · CATEGORY Funqisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Boscalid 252 g/kg +
Pyraclostrobin 128 g/kg**

FORMULYASIYA · FORM. **WG**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 kg**

KATEQORIYA · CATEGORY **Funqisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant

Camarilla 380 WG

BOSCALİD 252 G/KG + PYRACLOSTROBIN 128 G/KG

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

CAMARILLA 380 WG su dispersiyalı qranul (WG) formada fungusiddir və tərkibində Boscalid 252 q/kq və Pyraclostrobin 128 q/kq fəal maddələri mövcuddur.

CAMARILLA 380 WG is a water dispersible granule fungicide containing Boscalid and Pyraclostrobin as active ingredients.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Açıq sahədə pomidor (erkən yanıqlıq xəstəliyinə qarşı); alma və armud (qaşım, unlu şəh xəstəlikləri və saxlama zamanı meyvə çürüməsinə qarşı) nəzərdə tutulmuşdur.

Tomatoes (open ground) – Early Blight; Apples and Pears – Scab, Powdery Mildew, Rot of fruit in storage

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

İş məhlulu işlənmə günü xüsusi təchiz edilmiş ərazilərdə hazırlanmalıdır; tank yarıya qədər su ilə doldurulmalı, sonra məhsul əlavə edilməlidir.

Pomidor üçün 0,3–0,5 kq/ha dozada vegetasiya dövründə maksimum 3 dəfə çiləmə aparılır.

Working solution is prepared on the day of application in specially equipped areas; the tank should be half-filled with water before adding the product. For tomatoes, apply at 0.3–0.5.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

Not later than 10 days before harvest (for rot of fruit in storage on Apple/ Pears)



Cercado 625 WG

CYPRODİNİL 375 G/KG + FLUDIOXONİL 250 G/KG WG

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

Cercado 625 WG su ilə qarışdırılan qranul (WG) formasında olan funqisiddir və iki aktiv maddə — Cyprodinil (sistemik və yarpaq funqisidi) və Fludioxonil (uzunmüddətli qalıq aktivliyə malik qeyri-sistemik funqisid) ehtiva edir.

Cercado 625 WG is a water dispersible granule fungicide containing two active ingredients: Cyprodinil (systemic and foliar) and Fludioxonil (non-systemic with long residual...

TƏSİREDİCİ
MADDƏ · ACTIVE

Cyprodinil 375 g/kg +
Fludioxonil 250 g/kg WG

FORMULYASIYA · FORM.

WG

QABLAŞDIRMA · PACK

500 g

KATEQORIYA · CATEGORY

Funqisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Alma, armud, ərik, şaftalı, albalı, gilə, sitrus meyvələri, üzüm, çiyələk, moruq və qarağat üçün nəzərdə tutulmuşdur; Botrytis cinerea, Clasterosporium carpophilum, Prunus ssp., Monilia ssp., Charrinia diplodiella və Aspergillus niger van Thieg xəstəliklərinə qarşı effektivdir.

Apples, Pears, Apricots, Peaches, Cherries, Citrus fruits, Grapes, Strawberries, Raspberries, Currants — against Botrytis cinerea, Clasterosporium carpophilum, Prunus ssp., Monilia ssp.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

İş məhlulunu hazırlamaq üçün çiləyicinin çəninini 2/3 hissəsinə qədər su ilə doldurun, lazımı miqdarda preparatı yavaşca əlavə edin, qalan suyu üstəlayın və yaxşıca qarışdırın. Preparat vegetasiya dövrü ərzində 0,8–1,0 kq/ha normasında çiləmə yolu ilə tətbiq edilir.

Prepare the working solution by filling the sprayer tank with water to 2/3 volume, slowly adding the required amount of product, then topping up with remaining water and mixing thoroughly. Apply at a rate of 0.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]



Lumbre 250 EC

DİFENOCONAZOLE 250 G/L

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

LUMBRE 250 EC həm profilaktik, həm də müalicəvi təsirə malik sistemli fungisiddir. O, yarpaqlar tərəfindən udularaq akropetal və güclü translaminat translokasiya ilə yayılır.

LUMBRE 250 EC is a systemic fungicide with both preventive and curative action, formulated as an emulsifiable concentrate.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Alma və armud (unlu şəh, qara ləkə); Şaftalı (yarpaq büzüşməsi, unlu şəh, Sphaerotheca pannosa); Pomidor (erkən yanıqlıq – Alternaria solani, gec yanıqlıq – Phytophthora infestans); Kartof (gec yanıqlıq – Phytophthora infestans, erkən yanıqlıq – Alternaria solani)

Apple and Pear (Powdery mildew, Scab); Peaches (Peach leaf-curl, Powdery mildew, Sphaerotheca pannosa); Tomatoes (Early blight, Late blight); Potatoes (Late blight, Early blight)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

İş məhlulu istifadə günü xüsusi təchiz olunmuş sahələrdə hazırlanır. Bak yarıya qədər su ilə doldurulur, qarışdırıcı işləyərkən lazımı miqdarda LUMBRE 250 EC əlavə edilir, sonra qalan su tökülür. Püskürtmə vegetasiya mövsümündə aparılır: alma və armud üçün 0,2 l/ha, şaftalı üçün 0,2–0,25 l/ha, pomidor üçün 0,5 l/ha, kartof üçün 0,25–0,3 l/ha.

The working solution is prepared on the day of application in specially equipped areas. The tank should be half-filled with water, then the required amount of LUMBRE 250 EC added while the mixer is running,...

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Difenoconazole 250 g/l
FORMULYASIYA · FORM.	EC
QABLAŞDIRMA · PACK	1 L
KATEQORIYA · CATEGORY	Funqisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Sonos 300 SC

PYRİMETHANİL 300 G/L

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

SONOS 300 SC, 300 Q/L Pyrimethanil təsiredici maddəsi olan asma konsentrat fungisiddir və Anilinopirimidin kimyəvi sinifinə aiddir.

SONOS 300 SC is a suspension concentrate fungicide containing Pyrimethanil 300 G/L, belonging to the Anilinopyrimidine chemical class.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Üzüm (*Botrytis cinerea*), Alma (*Venturia inaequalis*, *Monilia fructigena*), Şaftalı (*Clasterosporium carpophilum*, *Monilia spp.*), Gavalı (*Clasterosporium carpophilum*, *Polystigma rubrum*, *Monilia spp.*) bitkilərinin göbələk xəstəliklərinə qarşı nəzərdə tutulmuşdur.

Wine grapes (*Botrytis cinerea*), Apples (*Venturia inaequalis*, *Monilia fructigena*), Peach (*Clasterosporium carpophilum*, *Monilia spp.*), Plum (*Clasterosporium carpophilum*, *Polystigma rubrum*, *Monilia spp.*)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

İş məhlulu istifadə günündə hazırlanmalı, tank yarısına qədər su ilə doldurulmalı, qarışdırıcı işləyərkən lazımi miqdarda SONOS 300 SC əlavə edilməli, sonra qalan su tamamlanmalıdır. Preparatın tətbiq norması: üzüm üçün 1,5–1,65 L/ha, alma üçün 1,125 L/ha, şaftalı və gavalı üçün 0,75 L/ha olmaqla vegetasiya dövründə püskürtmə yolu ilə tətbiq edilir.

The working solution should be prepared on the day of application by half-filling the tank with water, adding the required amount of SONOS 300 SC while the mixer is running, then topping up with water.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Pyrimethanil 300 G/ L
FORMULYASIYA · FORM.	SC
QABLAŞDIRMA · PACK	1 L
KATEQORIYA · CATEGORY	Funqisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Arco 250 EC

TEBUCONAZOLE 250 G/KG

Xəstəliklərə qarşı qoruyucu və müalicəvi həllər /

Protective & curative disease control

TƏYİNAT · PURPOSE

ARCO 250 EC, aktiv maddəsi Tebuconazole 250 q/kg olan sistemik fungusiddir və emulsiyalaşdırıla bilən konsentrat (EC) formasında istehsal edilir.

ARCO 250 EC is a systemic fungicide with protective, curative, and eradivative action containing Tebuconazole 250 g/kg as an emulsifiable concentrate.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Bağçılıq (Alma, Şaftalı) — Podosphaera leucotricha, Monilia fructigena; Üzüm — Uncinula Necator; Çiyələk, Moruq, Qarağat, Dekorativ bitkilər — Uncinula ssp.; Buğda və Arpa — Erysiphe graminis, Puccinia recondita, Septoria tritici, Fusarium sp., Helminthosporium sp.

Horticulture (Apple, Peach) – Podosphaera leucotricha, Monilia fructigena; Grape – Uncinula Necator; Strawberry, Raspberry, Currants, Decorative plants – Uncinula ssp.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

İş məhlulu emal günü xüsusi təchiz edilmiş ərazilərdə hazırlanmalıdır; tank yarısına qədər su ilə doldurulur, qarışdırıcı işləyərkən lazımi miqdarda ARCO 250 EC əlavə edilir, sonra qalan su tamamlanır. Tətbiq norması bitki növündən asılıdır: bağçılıq üçün 0,5 l/ha, üzüm üçün 0,4 l/ha, çiyələk və dekorativ bitkilər üçün 0,8 l/ha, buğda və arpa üçün 0,75 l/ha.

The working solution should be prepared on the day of application in specially equipped areas. The tank should be half filled with water, then the appropriate amount of ARCO 250 EC added while the mixer is...

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE	Tebuconazole 250 g/ kg
FORMULYASIYA · FORM.	EC
QABLAŞDIRMA · PACK	1 L
KATEQORIYA · CATEGORY	Funqisid

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



BÖLMƏ 03

Akarisid və Spesifik Həllər

Acaricides & Specialty

Gənələrə qarşı ixtisaslaşmış mühafizə
Specialised mite control

1 MƏHSUL · 1 PRODUCTS



Acarus 240 SC

BİFENAZATE 240 G/L

Gənələrə qarşı ixtisaslaşmış mühafizə / Specialised mite control

TƏYİNAT · PURPOSE

ACARUS 240 SC, Bifenazate 240 q/l təsiredici maddəsi əsasında hazırlanmış, Karbazat kimyəvi sinifinə aid asma konsentrat (SC) formada akarisiddir.

ACARUS 240 SC is a suspension concentrate acaricide based on Bifenazate 240 g/l, belonging to the Carbazate chemical class.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Pomidor, bibər, badımcın, xiyar və kabak bitkilərində saçaqlı gənələrə (Spider mite) qarşı nəzərdə tutulmuşdur.

Spider mite on tomatoes, bell pepper, eggplant, cucumber, and zucchini

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

İş məhlulu emal günü hazırlanmalı, çən yarıya qədər su ilə doldurulmalı, lazımi miqdarda ACARUS 240 SC əlavə edilməli və qarışdırıcı işə salınarkən qalan su tamamlanmalıdır. Pomidor və bibər üçün tətbiq norması bitki boyuna görə 0,24–0,48 L/ha, badımcın, xiyar və kabak üçün isə 0,4 L/ha təşkil edir.

The working solution is prepared on the day of application by half-filling the tank with water, adding the required amount of ACARUS 240 SC, then topping up with the remaining water while the agitator runs.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Bifenazate 240 g/l**

FORMULYASIYA · FORM. **SC**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 L**

KATEQORIYA · CATEGORY **Akarisid**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



BÖLMƏ 04

Bitki Böyümə Tənzimləyiciləri

Plant Growth Regulators

Böyümənin elmi tənzimlənməsi
Scientific growth management

3 MƏHSUL · 3 PRODUCTS



ZILAR 250 SC

PACLOBUTRAZOL 250 G/L SC

Böyümənin elmi tənzimlənməsi / Scientific growth management

TƏYİNAT · PURPOSE

ZILAR 250 SC tərkibində 250 q/l Paklobutrazol olan təbii bitki böyümə tənzimləyicisidir. Preparat retardant kimi fəaliyyət göstərir — bitkilərdə gibberellin sintezini bloklayaraq vegetativ böyüməni azaldır və kompakt bitki...

ZILAR 250 SC is a natural plant growth regulator containing Paclobutrazol 250 G/L as a suspension concentrate.

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Meyvə ağacları və üzüm bağları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həddindən artıq vegetativ böyüməni məhdudlaşdırmaq məqsədilə istifadə olunur, kompakt və məhsuldar bitki formasının əldə edilməsinə kömək edir.

Fruit trees, Grapevines — controls excessive vegetative growth

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Meyvə ağacları və üzüm üçün 1,0 l/ha normasında, vegetasiya mövsümündə 1–2 dəfə (yazda və payızda məhsul yığımından sonra) tətbiq edilir. İş məhlulu emal günündə hazırlanır: çənin yarısu ilə doldurulur, qarışdırıcı işləyərkən preparat əlavə edilir, sonra qalan su tökülür.

Apply at a rate of 1.0 L/ha for fruit trees and grapes, 1–2 times per season (in spring and in autumn after harvest).

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

Applied in spring and autumn after harvest; 1–2 times per season

TƏSİREDİCİ MADDƏ · ACTIVE **Paclobutrazol 250 G/L SC**

FORMULYASIYA · FORM. **SC**

QABLAŞDIRMA · PACK **1 L**

KATEQORIYA · CATEGORY **Böyümə Tənzimləyicisi**

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant



Ramon SL

1-NAPHTHYLACETIC ACID (NAA) 10 G/L SL

Böyümənin elmi tənzimlənməsi / Scientific growth
management

TƏYİNAT · PURPOSE

RAMON SL təbii bitki böyümə tənzimləyicisidir və həll olunan konsentrat şəklində hazırlanmışdır. Tərkibində 10 Q/L 1-naftilsirkə turşusu (NAA) fəal maddəsi vardır və meyvələrin kimyəvi seyrəldilməsi üçün istifadə olunur.

RAMON SL is a natural plant growth regulator formulated as a soluble concentrate. It contains 1-Naphthylacetic acid (NAA) at 10 G/L and is used for chemical thinning of...

TƏSİREDİCİ MADDƏ ·
ACTIVE

1-Naphthylacetic acid
(NAA) 10 G/L SL

FORMULYASIYA · FORM.

SL

QABLAŞDIRMA · PACK

1 L

KATEQORIYA · CATEGORY

Böyümə Tənzimləyicisi

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Meyvə ağacları üçün nəzərdə tutulmuşdur; 6–11 mm ölçüsündə olan meyvələrin kimyəvi seyrəldilməsi məqsədi ilə istifadə olunur.

Fruit trees; chemical thinning of fruits sized 6–11 mm

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Meyvə ağacları üçün hektara 1,5 litr norması ilə tətbiq edilir; ildə maksimum 2 müalicə aparıla bilər, müalicələr arasında minimum 3 günlük fasilə olmalıdır. İş məhlulu istifadə günü hazırlanmalı, çən yarıya qədər su ilə doldurulmalı, qarışdırıcı işləyərkən preparat əlavə edilməli, sonra qalan su əlavə olunmalıdır.

Apply at a rate of 1.5 L/ha for fruit trees, with a maximum of 2 applications per year and a minimum interval of 3 days between treatments.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

2 treatments per year with minimum 3-day interval between applications



Lancet SL

6-BENZYLAMINOPURINE (6-BA) 19 G/L SL

Böyümənin elmi tənzimlənməsi / Scientific growth management

TƏYİNAT · PURPOSE

LANCET SL tərkibində 19 q/L 6-Benzilaminopurin (6-BA) olan təbii bitki böyümə tənzimləyicisidir. Preparat həll olunan konsentrat şəklində hazırlanmış olub meyvələrin kimyəvi seyrəldilməsi üçün istifadə olunur.

LANCET SL is a natural plant growth regulator formulated as a soluble concentrate. It contains 6-Benzylaminopurine (6-BA) at 19 g/L and is used for chemical thinning of...

TƏSİREDİCİ MADDƏ · 6-Benzylaminopurine (6-BA) 19 G/L SL
ACTIVE

FORMULYASIYA · FORM. SL

QABLAŞDIRMA · PACK 1 L

KATEQORIYA · CATEGORY Böyümə Tənzimləyicisi

CERRADO SOL
İspaniya · Spain

EU
Uyğunluq · Compliant

HƏDƏF BİTKİLƏR VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏR · TARGET CROPS & PESTS

Meyvə ağacları üçün nəzərdə tutulmuşdur; 6-11 mm ölçüsündə meyvələrin kimyəvi seyrəldilməsini təmin edir.

Fruit trees; chemical thinning of fruits (6-11 mm)

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZA · APPLICATION & DOSE

Preparat meyvə ağaclarında 2,0-3,0 l/ha normasında tətbiq edilir. İldə 2-3 dəfə, müalicələr arasında minimum 3 gün fasilə ilə çiləmə aparmaq olar. İş məhlulu istifadə günü hazırlanmalı, bak yarısına qədər su ilə doldurulmalı, preparat əlavə edilməli və qarışdırıcı işləyərkən qalan su əlavə edilməlidir.

Apply at a rate of 2.0-3.0 L/ha on fruit trees. Up to 2-3 applications can be made per year with a minimum interval of 3 days between treatments.

MƏHSUL TOPLAMA İNTERVALI · PRE-HARVEST INTERVAL

[təsdiq tələb olunur · to be confirmed]



Birlikdə daha güclü məhsul

A stronger harvest, together

Vita Terra MMC

A. Bakıxanov pr. 1, Hyatt Conference Center · Bakı, Azərbaycan

vitaterra.az · sales@vitaterra.az

İspaniya Cerrado Sol pestisidlərinin eksklüziv distribütörü

Exclusive distributor of Cerrado Sol pesticides, Spain

Aqronomik məsləhət və sifariş üçün bizimlə əlaqə saxlayın.

Contact us for agronomic advice and orders.

Vacib qeyd / Important. Bu kataloq məlumat xarakteri daşıyır və rəsmi məhsul etiketini əvəz etmir. Bütün doza, təsiredici maddə qatılığı, hədəf bitki/zərərverici və məhsul toplama intervalı məlumatları istehsalçı etiketinə əsaslanır; "[təsdiq tələb olunur]" işarəsi olan sahələr rəsmi qeydiyyat sənədi ilə dəqiqləşdirilməlidir. Pestisidlərdən istifadə edərkən həmişə etiket təlimatlarına və yerli qanunvericiliyə əməl edin, müvafiq mühafizə vasitələrindən istifadə edin.

This catalogue is for information only and does not replace the official product label. All dose, active-ingredient, target and pre-harvest-interval data derive from the manufacturer label; fields marked "[to be confirmed]" must be verified against the official registration. Always follow label directions and local regulations, and use appropriate protective equipment.