## Teoría de Digráficas

## DIGRÁFICAS ACÍCLICAS

## Tarea 5

Osmar Dominique Santana Reyes 21 de Noviembre de 2024

Resuelve con todo detalle cada uno de los siguientes ejercicios.

42. ¿Cómo son todas las digráficas tales que cada vértice forma una base? *Solución*.

Sea *D* una digráfica en la que cada uno de sus vértices forma una base.

Afirmación. D es fuerte.


Sean  $u, v \in V(D)$ , ya que  $\{u\}$  es una base de D, se tiene que, para v, existe una vu – trayectoria en D. De manera similar,  $\{v\}$  es una base de D por lo que, para u, existe una uv – trayectoria en D.

Por lo tanto, *D* es fuerte.

43. Da un ejemplo de una digráfica con exactamente 6 bases y 4 cobases, donde cada base y cada cobase tenga por lo menos dos vértices.

Solución.

Sea D la siguiente digráfica:



Por la Proposición 20, se sabe que los vértices de ingrado 0 pertenencen a cualquier base de una digráfica, por lo que  $u_1$  y  $u_{13}$  están en cualquier base. Luego, por el Teorema 21, no puede haber trayectorias entre dos vértices de una base, por lo que  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_{12}$  y  $u_{14}$  no pueden ser elementos de alguna base, dado que existen las trayectorias  $(u_1, u_3, u_2)$ ,  $(u_1, u_3)$ ,  $(u_{13}, u_{12})$  y  $(u_{13}, u_{12}, u_{14})$ , respectivamente. De esta manera, sea B una base de D, se sabe que  $u_1$ ,  $u_{13} \in B$ , pero  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_{12}$ ,  $u_{14} \notin B$ .

Además, para  $u_4$  no existe ninguna  $u_1u_4$  – trayectoria ni una  $u_{13}u_4$  – trayectoria en D, por lo que B tiene más elementos. Ya que la trayectoria  $T=(u_{11},u_{10},u_9,u_8,u_7,u_6,u_5,u_4)$  contiene a los demás vértices de D, se tiene que solo uno de estos vértices pertenece a B, pues si más de uno perteneciera, entonces es posible hallar una trayectoria contenida en T entre dos vértices de B, lo cual sería a una contradicción al Teorema 21.

Ahora,  $u_4$ ,  $u_5 \notin B$ , ya que no es posible hallar una  $u_4u_6$  – trayectoria ni una  $u_5u_6$  – trayectoria en D. Pero si es posible hallar una  $u_iu_j$  – trayectoria en D para cada  $i=6,\ldots,11$  y para cada  $j=4,\ldots,11$ . De esta forma, las siguientes son bases de D:

$$B_1 = \{u_1, u_6, u_{13}\}$$
,  $B_2 = \{u_1, u_7, u_{13}\}$ ,  $B_3 = \{u_1, u_8, u_{13}\}$ ,  $B_4 = \{u_1, u_9, u_{13}\}$ ,  $B_5 = \{u_1, u_{10}, u_{13}\}$  y  $B_6 = \{u_1, u_{11}, u_{13}\}$ .

Por otro lado, los vértices de ingrado cero y exgrado mayor a cero no pertenecen a ninguna cobase de D, puesto que no hay trayectorias que terminen en estos. Así, sea C una cobase de D, se tiene que  $u_1, u_{13} \notin C$ 

Después, si  $u_4$  o  $u_5$  pertenecen a C, entonces  $u_i \notin C$ , para cada  $i=2,3,6,7,\ldots,11$ , pues  $u_j \rightsquigarrow u_i$ , para cada j=4,5 y para cada i=2,3, además de que  $u_i \rightsquigarrow u_j$ , para cada  $i=6,7,\ldots,11$  y para cada j=4,5. Sin embargo, para  $u_2$ , la única trayectoria que inicia en este vértice es  $(u_2,u_3)$ , pero  $u_3 \notin C$ , lo cual contradice que C sea una cobase. De este modo,  $u_4,u_5\notin C$ .

Luego, si  $u_i \in C$ , para algún i = 6, ..., 11, entonces  $C = \{u_i\}$ , puesto que  $u_i \rightsquigarrow u_j$ , para cada i = 6, 7, ..., 11 y para cada j = 2, 3, 4, 5, 12, 14. Sin embargo, para  $u_5$ , no existe ninguna trayectoria que inicie en este vértice y termine en  $u_i$ , para cada i = 6, ..., 11, lo cual contradice que C sea una cobase. De este modo,  $u_i \notin C$ , para todo i = 6, ..., 11.

De esta forma, ya que para cada  $i=1,4,\ldots,11$  y para cada j=2,3, se da que  $u_i \rightsquigarrow u_j$  en D, además de que  $u_{13} \rightsquigarrow u_{12}, u_{13} \rightsquigarrow u_{14}$  y  $(u_2,u_3), (u_3,u_2), (u_{12},u_{14}), (u_{14},u_{12}) \in F(D)$ , se tiene que las cobases de D son:

$$C_1 = \{u_2, u_{12}\}, C_2 = \{u_2, u_{14}\}, C_3 = \{u_3, u_{12}\} \text{ y } C_4 = \{u_3, u_{14}\}.$$

44. ¿Cómo son todas las digráficas tales que el conjunto de todos los vértices es una base de D. *Solución*.

Sea D una digráfica tal que V(D) es una base de D.

Afirmación. V(D) es la única base de D y  $F(D) = \emptyset$ .

Como V(D) es una base de D, se tiene que V(D) es un conjunto minimal de  $(\mathcal{B}_D, \subseteq)$ , pero todo elemento de este conjunto está contenido en V(D), por lo que  $\mathcal{B}_D = \{V(D)\}$ . Así, V(D) es la única base de D.


Ahora, por el Teorema 21, no puede haber trayectorias entre dos vértices de una base. De este modo, dado que V(D) es la única base de D, se obtiene que entre cualquier par de vértices de D no hay trayectorias, en particular, no hay flechas. Por lo tanto,  $F(D) = \emptyset$ .

45. Da un ejemplo de una digráfica tal que todas sus bases sean también cobases. *Solución*.

Sea D la digráfica de la izquierda. Ya que

$$C = (u_4, u_{10}, u_5, u_6, u_1, u_2, u_6, u_3, u_7, u_8, u_9, u_{10}, u_5, u_6, u_4)$$

es un camino cerrado generador en D, se tiene que D es fuerte. Así, para cada  $u \in V(D)$ , existe una uv – trayectoria y una vu – trayectoria, para todo  $v \in V(D)$ , pues D es fuerte. De esta forma, por el Teorema 21, cualquier base y cobase de D debe tener un solo elemento, más aún, cada vértice de D forma una base y una cobase de D.



- 46. ¿Cómo son todas las digráficas tales que todas sus bases son cobases? *Solución*.
- 47. Dá un ejemplo de una digráfica tal que tenga una base que también sea un conúcleo. *Solución*.
- 48. Decimos que una digráfica es transitiva si para cualesquiera tres vértices distintos u, v, w, tales que  $\{(u, v), (v, w)\} \subseteq F(D)$  se tiene que  $(u, w) \in F(D)$ . Prueba que si D es una digráfica transitiva entonces toda cobase de D es un núcleo de D.

Demostración.

- 49. Prueba que D es una digráfica tal que toda cobase de D es un núcleo entonces D es transitiva. Demostración.
- 50. Para cada  $p \ge 3$ , dá un ejemplo de una digráfica semicompleta con n vértices que no tenga núcleo.

Solución.

51. Sea *D* una digráfica transitiva, demuestra que *D* tiene núcleo.

Demostración.

52. Decimos que una digráfica es núcleo imperfecta crítica si no tiene núcleo pero toda subdigráfica inducida sí tiene núcleo. Prueba que un ciclo dirigido de longitud impar es núcleo imperfecta crítica.

Demostración.