

DAST-10 en Español

Drug Abuse Screening Test — 10 ítems

Instrucciones de aplicación

Autoreporte sobre el **último año** (excepto alcohol y tabaco). 10 preguntas Sí/No. Tiempo: 2 min. Corte ≥ 3 sugiere abuso de sustancias.

Responda Sí o No. No incluya alcohol ni tabaco.

#	Ítem / Pregunta	No	Sí
1	¿Ha usado drogas distintas del alcohol o medicamentos recetados?	☐	☐
2	¿Abusa de más de una droga a la vez?	☐	☐
3	¿No puede dejar de usar drogas cuando quiere?	☐	☐
4	¿Ha tenido «blackouts» o flashbacks como resultado del uso?	☐	☐
5	¿Se siente mal o culpable por su uso de drogas?	☐	☐
6	¿Su cónyuge (o padres) se queja de su uso de drogas?	☐	☐
7	¿Ha descuidado a su familia por su uso de drogas?	☐	☐
8	¿Ha tenido problemas legales por su uso de drogas?	☐	☐
9	¿Ha perdido amigos por su uso de drogas?	☐	☐
10	¿Ha descuidado sus responsabilidades por su uso de drogas?	☐	☐

PUNTAJE TOTAL: ____ / 10 · **Corte:** ≥ 3

Interpretación del puntaje

Puntaje	Nivel	Acción sugerida
0 – 2	Bajo riesgo	Psicoeducación; monitoreo
3 – 5	Moderado	Intervención breve; evaluación clínica
6 – 8	Sustancial	Tratamiento en adicciones
9 – 10	Severo	Derivación urgente a servicios especializados

Tamiza abuso de drogas con DAST-10 en Kalyo — kalyo.io

Skinner HA. The DAST-10. Addict Behav. 1982;7(4):363-371.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.