

MADRS en Español

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale

Instrucciones de aplicación

Heteroaplicada con entrevista clínica (15–20 min). Cada ítem se puntúa 0–6 según criterios anclados. Seguimiento cada 2–4 semanas; respuesta = reducción $\geq 50\%$; remisión < 10 .

0 = No presente · 6 = Severo (consultar manual para descriptores intermedios)

#	Ítem / Pregunta	0	1	2	3	4	5	6
1	Tristeza aparente (observada)	■	■	■	■	■	■	■
2	Tristeza referida (subjetiva)	■	■	■	■	■	■	■
3	Tensión interna	■	■	■	■	■	■	■
4	Sueño reducido	■	■	■	■	■	■	■
5	Apetito reducido	■	■	■	■	■	■	■
6	Dificultad de concentración	■	■	■	■	■	■	■
7	Lassitud / falta de energía	■	■	■	■	■	■	■
8	Incapacidad de sentir	■	■	■	■	■	■	■
9	Pensamientos pesimistas	■	■	■	■	■	■	■
10	Pensamientos suicidas	■	■	■	■	■	■	■

PUNTAJE TOTAL: ____ / 60

Interpretación del puntaje

Puntaje	Severidad	Acción sugerida
0 – 6	Síntomas mínimos	Sin intervención específica
7 – 19	Depresión leve	Monitoreo; psicoterapia según contexto
20 – 34	Depresión moderada	Tratamiento activo (corte ≥ 20 en Colombia)
35 – 60	Depresión severa	Intervención intensiva; evaluar riesgo
< 10	Remisión	Mantenimiento y prevención

Monitorea respuesta al tratamiento con MADRS en Kalyo — kalyo.io

Montgomery SA, Åsberg M. A new depression scale designed to be sensitive to change. Br J Psychiatry. 1979;134:382-389.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.