



BDI-II en Español

Inventario de Depresión de Beck — Segunda Edición

Instrucciones de aplicación

Seleccione la afirmación que mejor describa cómo se ha sentido durante las **últimas 2 semanas, incluido hoy**. Cada ítem se puntúa de 0 a 3. Tiempo estimado: 5–10 minutos. Desde 13 años.

Para cada ítem marque UNA opción: 0 = mínima · 1 = leve · 2 = moderada · 3 = severa (consulte manual BDI-II para enunciados completos por nivel).

#	Ítem / Pregunta	0	1	2	3
1	Tristeza	☐	☐	☐	☐
2	Pesimismo	☐	☐	☐	☐
3	Sentimiento de fracaso	☐	☐	☐	☐
4	Pérdida de placer (anhedonia)	☐	☐	☐	☐
5	Sentimientos de culpa	☐	☐	☐	☐
6	Sentimientos de castigo	☐	☐	☐	☐
7	Decepción con uno mismo	☐	☐	☐	☐
8	Autocrítica	☐	☐	☐	☐
9	Pensamientos o deseos suicidas	☐	☐	☐	☐
10	Llanto	☐	☐	☐	☐
11	Agitación	☐	☐	☐	☐
12	Pérdida de interés	☐	☐	☐	☐
13	Indecisión	☐	☐	☐	☐
14	Desvalorización	☐	☐	☐	☐
15	Pérdida de energía	☐	☐	☐	☐
16	Cambios en patrones de sueño	☐	☐	☐	☐
17	Irritabilidad	☐	☐	☐	☐
18	Cambios en el apetito	☐	☐	☐	☐
19	Dificultad de concentración	☐	☐	☐	☐
20	Cansancio o fatiga	☐	☐	☐	☐
21	Pérdida de interés en el sexo	☐	☐	☐	☐

PUNTAJE TOTAL: _____ / 63

Interpretación del puntaje

Puntaje	Nivel	Acción sugerida
0 – 13	Depresión mínima	Psicoeducación y monitoreo
14 – 19	Leve	Psicoterapia breve o seguimiento activo
20 – 28	Moderada	Tratamiento psicológico activo; valorar farmacoterapia
29 – 63	Severa	Intervención intensiva; evaluar riesgo suicida (ítem 9)

Documenta evolución del BDI-II sesión a sesión con Kalyo — kalyo.io

Beck AT, Steer RA, Brown GK. BDI-II Manual. 1996. Pearson. Adaptación clínica en español — uso profesional.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.