

Racionalización EN R

Objetivo:

Consolidar la definición **Racionalización EN R**

Conocimientos Previos:

Radicación en R

REVISIÓN DEL CONCEPTO DE Racionalización de monomio y binomio EN R

(Racionalizar en breves palabras es eliminar el radical y generalmente es del denominador)

Racionalización de un monomio. $\frac{a}{\sqrt[n]{b^p}} = \frac{a \sqrt[n]{b^q}}{\sqrt[n]{b^p} \cdot \sqrt[n]{b^q}} = \frac{a \sqrt[n]{b^q}}{b}$ (Atención ese q sumado con la p debe ser igual a su índice n o su múltiplo)

$$\text{Ejemplo : } \frac{2}{\sqrt[3]{2^4}} = \frac{2}{\sqrt[3]{2^4}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{2 \sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^6}} = \frac{2 \sqrt[3]{2^2}}{2^2} = \frac{2 \sqrt[3]{2^2}}{4} = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}$$

Racionalización de un binomio (Siempre busca su conjugada del binomio y aplicas diferencia de cuadrados)

$$\frac{a}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} = \frac{a}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \cdot \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{a(\sqrt{x} - \sqrt{y})}{\sqrt{x^2 - y^2}} = \frac{a(\sqrt{x} - \sqrt{y})}{x - y}$$

Racionalización de un binomio con índice mayor que 2. (Cuando busque su conjugada recuerde el binomio de Newton)

$$\frac{a}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}} = \left(\frac{a}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}} \right) \left(\frac{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}}{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}} \right) = \frac{a(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2})}{\sqrt[3]{x^3} + \sqrt[3]{y^3}} = \frac{a(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2})}{x + y}$$

Hoja de Trabajo para consolidar conocimientos

Racionalizar denominador:	Resolviendo el Ejercicio (paso por paso)
$\frac{2}{\sqrt[5]{3^{11}}}$	
$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{24}}$	
$\frac{3\sqrt{2} - 5}{\sqrt{4} + \sqrt{3}}$	
$\frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3}}$	
$\frac{\sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{3}}{\sqrt[5]{7} - \sqrt[5]{3}}$	
$\frac{\sqrt{7} + 1}{2\sqrt{7} - 1}$	