

1 Statistica descrittiva e inferenziale

2 Frequenze

3 Indici di tendenza centrale

1 Statistica descrittiva e inferenziale

- La statistica descrittiva
- Tecniche

2 Frequenze

3 Indici di tendenza centrale

Statistica descrittiva e inferenziale

- **Statistica descrittiva**
 - Riassume, descrive, esplora i dati osservati
 - Prima fase nella valutazione delle proprietà psicometriche di uno strumento
- **Statistica inferenziale**
 - Usa i dati di un **campione** per fare inferenze sulla **popolazione**
 - Confronti tra gruppi, valutazione di interventi, validazione di test

- È utile per controllare, descrivere ed esplorare i dati
- Serve a riassumere i dati attraverso indici statistici, tabelle e grafici
- **Non esiste una buona analisi statistica, senza una buona analisi descrittiva**

- **Distribuzione di frequenza e grafici:** procedure per descrivere tutti i dati in modo conveniente
- **Indici di tendenza centrale/indici di posizione:** singoli numeri che descrivono “dove” si colloca la distribuzione dei punteggi, dove è situato il “centro di gravità” dei punteggi stessi. Nel caso dei quantili (quartili, decili, percentili) si tratta di valori che dividono un insieme di dati ordinati in intervalli uguali, e rappresentano le soglie sotto le quali cade una certa percentuale dei dati.

- **Indici di variabilità:** singoli numeri che descrivono quanto la distribuzione dei punteggi è “sparsa” se i punteggi sono simili tra loro e tendono a variare poco o ppure si differenziano molto e tendono a variare significativamente da soggetto a soggetto.
- **Indici trasformati:** nuovi punteggi che sostituiscono le cifre originarie e permettono di capire rapidamente quanto ogni valore si possa dire buono o no rispetto a tutti gli altri
- **Aree sottese a una curva normale:** proporzioni che dicono la probabilità di ottenere casualmente un punteggio più basso o più alto di quello considerato, data una particolare distribuzione normale o gaussiana

1 Statistica descrittiva e inferenziale

2 **Frequenze**

3 Indici di tendenza centrale

1 Statistica descrittiva e inferenziale

2 Frequenze

- Dati
- Notazioni fondamentali
- Le frequenze assolute semplici
- Le frequenze assolute cumulate
- Le frequenze relative semplici
- Le frequenze relative cumulate
- Visualizzazione

3 Indici di tendenza centrale

Dati

Il dataset raccoglie i dati rilevati su 20 intervistati sulla base della seguente codifica: 1= per niente, 2=poco, 3=abbastanza, 4=completamente

```
# installlo
#> install.packages("dplyr")
# carico pacchetti
library(dplyr)
# carico il dataset
load("data/data_hr.rda")
```

```
tibble(data_hr) #visualizzo il dataset
```

```
# A tibble: 20 x 3
```

	id reparto	accordo
	<int> <chr>	<dbl>
1	1 HR	1
2	2 HR	3
3	3 Commerciale	3
4	4 IT	1
5	5 Commerciale	4
6	6 Commerciale	3
7	7 Commerciale	3
8	8 HR	1
9	9 Commerciale	2
10	10 Commerciale	4
11	11 Produzione	3
12	12 IT	1
13	13 HR	3
14	14 Produzione	3
15	15 Produzione	4

Verifico il tipo di dato codificato:

```
str(data_hr)
```

```
'data.frame':  20 obs. of  3 variables:
 $ id      : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ reparto: chr  "HR" "HR" "Commerciale" "IT" ...
 $ accordo: num  1 3 3 1 4 3 3 1 2 4 ...
```

Trasformo **id** e **reparto** a fattore, attraverso la funzione `as.factor()`

```
data_hr$id = as.factor(data_hr$id)
data_hr$reparto = as.factor(data_hr$reparto)
```

Trasformo **accordo** a fattore, attribuendoci delle labels, quindi attraverso la funzione `factor()`:

```
data_hr$accordo = factor(data_hr$accordo,  
                           levels=c(1,2,3,4),  
                           labels=c("per_niente", "poco", "abbastanza", "molto"))
```

```
data_hr$accordo
```

```
[1] per_niente abbastanza abbastanza per_niente molto      abbastanza  
[7] abbastanza per_niente poco      molto      abbastanza per_niente  
[13] abbastanza abbastanza molto      poco      molto      poco  
[19] abbastanza molto  
Levels: per_niente poco abbastanza molto
```

Factor w/ 4 levels "per_niente","poco",...: 1 3 3 1 4 3 3 1 2 4 ...

```
head(data_hr$accordo,n=4) # le prime 4 unità statistiche
```

```
[1] per_niente abbastanza abbastanza per_niente  
Levels: per_niente poco abbastanza molto
```

```
tail(data_hr$accordo,n=2) # le ultime 2 unità statistiche
```

```
[1] abbastanza molto  
Levels: per_niente poco abbastanza molto
```

```
n = nrow(data_hr) # numerosità campionaria
```

Notazioni fondamentali

- Sia X la variabile grado di accordo
- Sia X_j la modalità j -esima di X , dove $j = 1 \dots 4$
- Sia n il totale delle unità statistiche ($n = 20$)

- La frequenza assoluta semplice di una modalità è il numero naturale di unità statistiche che presentano tale modalità
- La generica frequenza assoluta semplice associata alla modalità j si indica con il simbolo f_j :

f_j = numero di unità statistiche con modalità j

Ad esempio nel nostro caso, come calcolo la frequenza assoluta semplice della modalità 2 (ie. poco)?

```
# vettore di TRUE e FALSE, TRUE quando accordo è poco
data_hr$accordo=="poco"
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE
[13] FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE
```

```
# Sommo tutti i TRUE, perchè TRUE = 1
sum(data_hr$accordo=="poco")
```

```
[1] 3
```

$f_2 = 3$, indica che 3 rispondenti hanno espresso la modalità poco d'accordo.

Se vogliamo calcolare le frequenze assolute semplici per ogni modalità, possiamo utilizzare la funzione `table()`, oppure la funzione `count()`

```
table(data_hr$accordo)
```

per_niente	poco	abbastanza	molto
4	3	8	5

```
data_hr |> count(accordo, name = "fj")
```

	accordo	fj
1	per_niente	4
2	poco	3
3	abbastanza	8
4	molto	5

Le frequenze assolute cumulate

- La frequenza assoluta cumulata di una modalità è la somma delle frequenze assolute semplici delle modalità precedenti alla modalità data più la frequenza assoluta semplice della modalità data
- La generica frequenza assoluta cumulata associata alla modalità j si indica con il simbolo F_j

$$F_j = \sum_{i \leq j} f_i$$

Quanti hanno espresso un grado di accordo inferiore o uguale a poco d'accordo?

```
data_hr |> count(accordo, name = "fj")
```

	accordo	fj
1	per_niente	4
2	poco	3
3	abbastanza	8
4	molto	5

```
# sommo quanti hanno risposto per niente a quanti poco  
sum(data_hr$accordo=="per_niente") + sum(data_hr$accordo=="poco")
```

```
[1] 7
```

Ad esempio, $F_2 = 7$, indica che 7 rispondenti hanno espresso un grado di accordo inferiore o uguale a poco d'accordo

Attraverso la funzione `cumsum()` possiamo calcolare la somma cumulata, in questo caso le frequenze assolute cumulate

```
table(data_hr$accordo)
```

per_niente	poco	abbastanza	molto
4	3	8	5

```
cumsum(table(data_hr$accordo))
```

per_niente	poco	abbastanza	molto
4	7	15	20

Attraverso la funzione `cumsum()` possiamo calcolare la somma cumulata, in questo caso le frequenze assolute cumulate

```
data_hr |> count(accordo, name = "fj")
```

	accordo	fj
1	per_niente	4
2	poco	3
3	abbastanza	8
4	molto	5

```
data_hr |> count(accordo, name = "fj") |>  
  mutate(Fj = cumsum(fj)) #aggiungo una variabile
```

	accordo	fj	Fj
1	per_niente	4	4
2	poco	3	7
3	abbastanza	8	15
4	molto	5	20

Le frequenze relative semplici

- La frequenza relativa semplice è data dal rapporto tra la **frequenza assoluta semplice di tale modalità** e **il numero totale** di unità statistiche osservate
- La generica frequenza relativa semplice associata alla modalità j si indica con il simbolo p_j

$$p_j = \frac{f_j}{n}$$

Come calcolo la frequenza assoluta semplice?

```
table(data_hr$accordo)
```

per_niente	poco	abbastanza	molto
4	3	8	5

Qual'è il numero totale di unità statistiche?

```
n
```

```
[1] 20
```

```
nrow(data_hr)
```

```
[1] 20
```

```
length(data_hr$accordo)
```

```
[1] 20
```

```
sum(data_hr$accordo=="abbastanza")/n
```

[1] 0.4

Ad esempio, $p_3 = 0.40$ indica che il 40% dei rispondenti ha manifestato un grado d'accordo pari a abbastanza.

Qual'è frequenza relativa semplice associata alla tutte le modalità?

```
table(data_hr$accordo)/n
```

per_niente	poco	abbastanza	molto
0.20	0.15	0.40	0.25

Una frequenza relativa semplice varia sempre tra 0 e 1.

Le frequenze relative cumulate

- La frequenza relativa cumulata di una modalità è la somma delle frequenze relative semplici delle modalità precedenti alla modalità data più la frequenza relativa semplice della modalità data
- La generica frequenza relativa cumulata associata alla modalità j si indica con il simbolo P_j

$$P_j = \sum_{i \leq j} p_i$$

Come prima, attraverso la funzione `cumsum()`, possiamo calcolare le frequenze relative **cumulate**

```
# frequenze relative semplici  
table(data_hr$accordo)/n
```

per_niente	poco	abbastanza	molto
0.20	0.15	0.40	0.25

```
# frequenze relative cumulate  
cumsum(table(data_hr$accordo))/n
```


per_niente	poco	abbastanza	molto
0.20	0.35	0.75	1.00

Ad esempio, $P_2 = 0.35$, indica che il 35% dei rispondenti ha espresso un grado di accordo inferiore o uguale a poco d'accordo.


Una frequenza relativa cumulata varia sempre tra 0 e 1.

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻


```
barplot(table(data_hr$accordo), ylab="?",  
        xlab="Accordo") # diagramma a barre
```




```
barplot(table(data_hr$accordo)/n, ylab="?",  
        xlab="Accordo") # diagramma a barre
```




Accordo

```
barplot(cumsum(table(data_hr$accordo)), ylab="?",  
        xlab="Accordo") # diagramma a barre
```



Accordo

```
barplot(cumsum(table(data_hr$accordo))/n, ylab="?",  
        xlab="Accordo") # diagramma a barre
```



1 Statistica descrittiva e inferenziale

2 Frequenze

3 Indici di tendenza centrale

1 Statistica descrittiva e inferenziale

2 Frequenze

3 Indici di tendenza centrale

- Dati
- La moda
- La media aritmetica
- La mediana
- Indici di tendenza centrale e scale di misura

Indici di tendenza centrale

Un indice di tendenza centrale è un valore che descrive e riassume il centro di una distribuzione di dati

Dati

I dati che seguono rappresentano un esempio simulato di valutazioni di prestazione in un test di **problem solving** raccolte su $n = 20$ dipendenti appartenenti a quattro reparti (Produzione, Commerciale, HR, IT). Il punteggio è dato dal numero di risposte corrette su 10 ed è ricondotto a quattro fasce (A,B,C,D).

Prestazione	Risposte corrette	Numero
Intervento immediato (D)	0–4	0
Richiesta di attenzione (C)	5–6	2
Buono (B)	7–9	17
Ottimo (A)	10	1

Ad esempio, rispetto ai dati relativi “alle capacità di problem solving”, la moda è

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ◀ ↺ 🔍 ↻

Ad esempio, rispetto ai dati relativi “alle capacità di problem solving”, la moda è

Prestazione	Risposte corrette	Numero
Intervento immediato (D)	0-4	0
Richiesta di attenzione (C)	5-6	2
Buono (B)	7-9	17
Ottimo (A)	10	1

la moda è la modalità "Buono" a cui è associata una frequenza di 17

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

```
# carico il data set
load("data/data_ps.rda")
```

Che funzione posso usare per ottenere la moda?

```
#visualizzo la struttura/le variabili
```

```
str(data_ps)
```

```
'data.frame':  20 obs. of  15 variables:
```

```
$ id          : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
```

```
$ reparto     : chr  "HR" "HR" "Commerciale" "IT" ...
```

```
$ accordo     : num  1 3 3 1 4 3 3 1 2 4 ...
```

```
$ p1          : int  1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 ...
```

```
$ p2          : int  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
$ p3          : int  1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 ...
```

```
$ p4          : int  0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 ...
```

```
$ p5          : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
$ p6          : int  1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
```

```
$ p7          : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
$ p8          : int  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
$ p9          : int  1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 ...
```

```
$ p10         : int  1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 ...
```

```
$ problem_solving_0_10: int  9 8 9 6 8 8 7 9 7 10 ...
```

```
$ fascia_ps   : chr  "Sufficiente (B)" "Sufficiente (B)" "Sufficiente
```

Criterio raggiunto (A)	Richiesta di attenzione (C)
1	2
Sufficiente (B)	
17	

La media aritmetica di una distribuzione di dati rilevati sulla variabile X , è data dalla somma dei dati divisa per il numero di unità statistiche:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

```
data_ps$problem_solving_0_10
```

```
[1] 9 8 9 6 8 8 7 9 7 10 8 8 8 9 9 7 9 7 5 9
```

Calcolo della media

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{20} X_i}{20}$$

```
n = length(data_ps$problem_solving_0_10)
n
```

[1] 20

```
sum(data_ps$problem_solving_0_10)/n
```

[1] 8

```
mean(data_ps$problem_solving_0_10)
```

[1] 8

- La mediana di una distribuzione di dati ordinati rilevati sulla variabile X , è il dato che occupa la posizione centrale rispetto alla distribuzione dei dati.
- La mediana si indica con il simbolo **Mdn**.


```
nrow(data_ps)
```

[1] 20

```
data_dispari = data_ps[-c(sample(1:nrow(data_hr), size = 1)),]
```

```
nrow(data_dispari)
```

[1] 19

A set of small navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

```
x_order[i] # estraggo l'elemento in posizione i
```

```
median(data_dispari$problem_solving_0_10)
```

[1] 8


```
n = nrow(data_ps)
```

[1] 20

$$i_inf = n/2$$

i_inf

[1] 10

$$i_sup = (n/2) + 1$$
 i_{sup}

[1] 11

```
x_order = sort(data_ps$problem_solving_0_10)
```

x_order

```
[1] 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
```

Come trovo la mediana?

```
# estraggo gli elementi in posizione i_inf e i_sup
x_order[i_inf:i_sup]
```

[1] 8 8

In questo esempio il valore in posizione i_{inf} equivale al valore in posizione i_{sup} , quindi possiamo dire che la mediana = 8.

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺

La mediana

```
voto = c(24, 29, 30, 22, 22, 26) #creo vettore voti  
n = length(voto) # quante osservazioni ho?  
voto_ordinato = sort(voto) #ordino gli elementi  
voto_ordinato
```

```
[1] 22 22 24 26 29 30
```

```
voto_ordinato[n/2] #  $i_{inf} = n/2$ 
```

```
[1] 24
```

```
voto_ordinato[(n/2) + 1] #  $i_{sup} = (n/2) + 1$ 
```

```
[1] 26
```

```
(24+26)/2
```

```
[1] 25
```

Potremmo concludere che la mediana stia tra 24 e 26, e quella stimata sia 25.

