

多元函数可导不一定连续

多元函数连续的充要条件

多元函数 $f(x, y)$ 在某点 (a, b) 处连续的充要条件是其在点 (a, b) 处的极限存在且与路径无关。形式化地说， $f(x, y)$ 在 (a, b) 处连续的充要条件是：

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = f(a, b)$$

多元函数可导的充要条件

多元函数可导的充要条件可以用偏导数来表述。设 $f(x, y)$ 是定义在某个区域内的二元函数，那么 $f(x, y)$ 在某点 (a, b) 处可导的充要条件是：

- 存在偏导数 $f_x(a, b)$ 和 $f_y(a, b)$ ；
- $f(x, y)$ 在 (a, b) 处沿任意方向的方向导数存在且连续，即沿任意单位向量 $(\cos \theta, \sin \theta)$ ， $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h \cos \theta, b + h \sin \theta) - f(a, b)}{h}$ 存在且与方向 θ 无关。

多元函数可微的充要条件

多元函数可微的充要条件可以使用偏导数和全微分来表述。设 $f(x, y)$ 是定义在某个区域内的二元函数，那么 $f(x, y)$ 在某点 (a, b) 处可微的充要条件是：

- 存在偏导数 $f_x(a, b)$ 和 $f_y(a, b)$ ；
- $f(x, y)$ 在 (a, b) 处沿任意方向的方向导数存在。
- 存在常数 A 和 B 使得在 (a, b) 附近有如下成立：

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} [f(x, y) - f(a, b) - f_x(a, b)(x - a) - f_y(a, b)(y - b)] = 0$$

多元函数可微的证明方法

证明多元函数 $f(x, y)$ 在某点 (a, b) 处可微的一个常见方法如下：

$$\text{已知全微分为 } df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

这里， $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 分别表示 f 对 x 和 y 的偏导数， dx 和 dy 分别表示自变量 x 和 y 的微小变化量。

我们又知道，当使用 Δx 和 Δy 表示自变量的微小变化时，函数 $f(x, y)$ 的增量可以表示为：

$$\Delta z = A \Delta x + B \Delta y + o(\rho)$$

因此，满足如下公式的时候，多元函数可微分：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{df}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy - f(a,b)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

多元函数偏导数

对于多元函数 $f(x, y)$ ，其偏导数连续、可导、可微的充要条件可以总结如下：

偏导数连续的充要条件：

充分条件：

如果 $f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在某个区域内连续，则 $f(x, y)$ 在该区域内偏导数连续。

必要条件：

如果 $f(x, y)$ 在某点处可微分，则该点的偏导数存在且连续。

可导的充要条件：

充分条件：

如果 $f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在某个区域内存在且连续，则 $f(x, y)$ 在该区域内可导。

必要条件：

如果 $f(x, y)$ 在某点处可导，则该点的偏导数存在。

可微的充要条件：

充分条件：

如果 $f(x, y)$ 在某点处的偏导数存在且连续，那么 $f(x, y)$ 在该点处可微。

必要条件：

如果 $f(x, y)$ 在某点处可微，则 $f(x, y)$ 在该点处可导，且偏导数存在且连续。