BIOLOGY

Chapter 13 – 14 - 15


2DO

SECONDARY





ASESORIA






Ascaris lumbricoides







Infección por huevos




Ciclo evolutivo del Necator americanus



Ciclo biológico de la Trichinella spiralis






1. Según las capas embrionarias son considerados

- A) monoblásticos
- B) diblásticos
- C) triblásticos
- D) tetrablásticos
- E) pentablásticos

Triblásticos



RESPUESTA: C

Los triblásticos o triploblásticos son animales en cuyo desarrollo embrionario temprano se diferencian tres hojas embrionarias o capas de tejido embrionario: ectodermo, endodermo y mesodermo.

2. Nematodo causante de la ascariasis.

- A) Oxiuro
- B) Lombriz intestinal
- C) Triquina
- D) Filaria
- E) Tenia


RESPUESTA: B

Gusano parásito de cuerpo cilíndrico y delgado de hasta 25 cm de largo, sin segmentos ni patas, que se aloja en el intestino del ser humano y de otros vertebrados al ingerir agua o alimentos contaminados con huevos de este animal; la hembra pone sus huevos en el ano del huésped, lo que provoca intensa picazón; hay muchas especies.



3. Los nematelmintos realizan la función excretora gracias a una estructura anatómica conocida como

- A) metanefridio.
- B) riñones.
- C) túbulos en "H".
- D) glándula verde.
- E) protonefridios



RESPUESTA: c

Los túbulos en H o renete son estructuras presentes en los gusanos cilíndricos (nematodos) para cumplir la fisiología excretora.

4.Oxiuriasis afecta más a


- A) los perros.
- B) los hombres
- C) las mujeres.
- D) los niños.
- E) los gatos.



RESPUESTA: D

La oxiuriasis es una infestación parasitaria producida por Enterobius vermicularis. La enfermedad tiene una distribución mundial y afecta a todas las edades aunque es más frecuente en niños pequeños que habitan, cursando en forma de brotes familiares o en instituciones cerradas como colegios, guarderías o residencias.

Ciclo evolutivo del *Necator* americanus



5. El nombre común de Necator americanus es

- A) la lombriz.
- B) anquilostoma.
- C) el oxiuro.
- D) gusano intestinal.
- E) la triquinela.

RESPUESTA: B

Anquilostoma americano, anquilostoma del nuevo mundo o uncinaria del nuevo mundo. Parásito. Necator americanus es un gusano redondo, blanquecino, intestinal; que pertenece al filo de los Nematodos y a la familia Ancylostomatidae.

6. Triquinosis se obtiene consumiendo



- A) consumo de dulces.
- B) besar a las mascotas.
- C) ingesta de carne de cerdo mal cocida.
- D) consumir agua embotellada.
- E) acariciar al cerdo.

RESPUESTA: c

La triquinelosis (también llamada triquinosis o triquiniasis) es una enfermedad parasitaria causada por un nematodo del género Trichinella, que se adquiere al consumir carne con larvas del parásito.

7. ¿Cuál es la forma de respiración de la lombriz de tierra?



A) Branquial

B) Traqueal

C) Pulmonar

D) Cutánea

E) Filotraqueal



Se lleva a cabo a través de la piel. Para ello es necesario que la piel sea muy fina y esté húmeda. Este tipo de respiración la realizan los gusanos como la lombriz de tierra y los anfibios aunque en estos últimos se completa con la respiración pulmonar.

RESPUESTA: d

La respiración de la lombriz de tierra se realiza por la piel, posee una cutina delgada y húmeda que facilita el intercambio de gases.

8. La excreción en los anélidos es por medio


A) de sistema de protonefridos.

B) de sistema de metanefridios.

C) de difusión.

D) de los riñones.

E) bronquial.



RESPUESTA: b

Los anélidos tienen un sistema desarrollado de excreción y es por medio de metanefridios.

9.Es una características de los anélidos

intestino (endodermo)
órganos internos
peritoneo (mesodermo)
CELOMA
músculo (mesodermo)
ectodermo


CELOMADOS

- A) Acelomados
- B) Tienen respiración traqueal
- C) Diblásticos
- D) Celomados
- E) Tuvo digestivo incompleto

RESPUESTA: d

Los celomados son animales triblásticos poseedores de celoma, al menos durante las fases embrionarias. En estos animales el mesodermo se ahueca y en su interior se forma una cavidad, llamada celoma, que forma la cavidad general interna del animal.

10. Un estudiantes presenta un severo cuadro clínico de infestación por nematodo. El Dr. Gonzales diagnóstico elefantiasis. ¿Qué parásito es el responsable de la patología antes citada?



Filariasis
(Wuchereria bancrofti

RESPUESTA: B

Patogenéticamente los responsables de la afección conocida como elefantiaisis o también llamada filariasis es por acción de Wuchereria, nematodo de climas tropicales.

 Adults produce sheathed microfilariae that migrate

into lymph and blood