
ARITHMETIC

2° GRADE OF SECONDARY

ASESORIA TOMO 5 Y 6





¿Cuántas fracciones propias e irreductibles con denominador 20 existen?

Resolución:

Se tiene la fracción:

$$\frac{a}{20} < 1$$





Descomponiendo: 20=2²x5...DC

a≠2 **y a**≠5



Los valores que toma a:

1;3;7;9;11;13;17;19

∴ Existen 8 fracciones



Halle el valor de x-y, si

$$0,\overline{xy} = \frac{23}{25}$$

Resolución:

$$0,\overline{XY} = \frac{25}{25}$$

Fracción generatriz:

$$\frac{\overline{xy}}{100} = \frac{23}{25}$$

Despejando: $\overline{xy} = 23 \times 4$

$$\overline{xy} = 9$$

$$\therefore x - y = 7$$

ESTO ES IMPOBIANTE



SLOTHTLDA.COM

HELICO JASESORIA

En un torneo de ajedrez por cada 4 varones participantes hay 7 mujeres, y además hay 21 mujeres más que varones. ¿Cuántos participantes hay en total en dicho torneo?

Resolución:

$$\frac{N^{\circ} \text{ varones}}{N^{\circ} \text{ mujeres}} = \frac{4}{7} = \frac{4}{K}$$



Total de participantes:

$$7k + 4k = 11(7)$$

∴ En total hay 77 participantes


4.

Las edades de cuatro hermanos forman una proporción aritmética. Si los menores tienen 19; 15 y 11, ¿qué edad tendrá el mayor de ellos?

Resolución:



Recordar:



Proporción aritmética discreta (términos medios diferentes)

: El mayor tendrá 23 años

5.

En una serie de tres razones geométricas equivalentes, los consecuentes son: 3; 4 y 7, y la suma de los antecedentes es 560. Halle el antecedente de menor valor.

Resolución:


Sabemos
$$\frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{7} = k$$



Por condición:

$$a + b + c = 560$$
14k = 560
k = 40

El menor valor es:



∴El menor valor es 120

M es DP a N; cuando M =30, N=5.Halle el valor de M cuando N=18.

Resolución:

Sabemos:

M DP N



valor de M valor de N Por condición:

$$\frac{30}{5} = \frac{M}{18}$$



$$540 = 5M$$

$$M = 108$$

∴ El valor de M es 108

7. Si la suma de los términos extremos de una proporción aritmética continua es 18, ¿qué valor tendrá la media diferencial?

Resolución:

Proporción aritmética continua (términos medios iguales)

Recordar:
$$a - b = b - c$$

Suma de extremos
$$(a + c)$$
 = Suma de medios $(b + b)$

Considerando:
$$a + c = 18$$
 $2b = 18$
 $b = 9$

∴ La media diferencial es 9



HELICO | ASESORIA

8.

La cantidad de panes que compra un comedor es DP al cuadrado de días que han transcurrido en la semana. Si el día 5 de la semana han adquirido 150 panes, ¿cuántos panes comprarán el onceavo día?


Resolución:

Sabemos:




$$\frac{\mathsf{N}^{\circ}\mathsf{Panes}}{(\mathsf{N}^{\circ}\mathsf{Dias})^2} = \mathsf{k}$$

$$\frac{150}{(5)^2} = \frac{P}{(11)^2}$$



∴ Comprarán el onceavo día 726 panes



HELICO | ASESORIA

9.

El perímetro de un triángulo es 420. Si los lados son entre sí como 21; 28 y 35, halle su área.

Resolución:

Sean los lados:

$$\frac{a}{21} = \frac{b}{4} = \frac{c}{28} = k$$

Por condición:

$$p = 3k + 4k + 5k$$

$$420 = 12k$$
 $k = 35$
 $a = 3(35)$
 $b = 4(35)$

Además:

$$\text{Área} = \frac{105.140}{2}$$

∴ El Área es 7350

10

Si C² es IP a $\sqrt[3]{D}$, además cuando C es igual a 35, D vale 27, ¿cuánto vale C cuando D valga 343?

Resolución:

Sabemos:

$$C^2 IP \sqrt[3]{D}$$



$$(valor C)^2(\sqrt[3]{valor D}) = k$$

Por condición:

$$(6)^2 (\sqrt[3]{64}) = (C)^2 (\sqrt[3]{729})$$



∴ El valor de C es 4

