


**CHAPTER 22** 

**5TO SECONDARY** 



**SISTEMA INMUNE Y LINFATICO** 





https://www.youtube.com/watch?v=1hbn4PaZvRo



**SECONDARY 3ero** 

## **SISTEMA LINFATICO**











https://www.youtube.com/watch?v=zrUjUtWAoDM


### **HELICO | THEORY**




LINFA: es un líquido resultado de agua sobrante, restos orgánicos de los tejidos y productos metabólicos de desecho




TEJIDO LINFÁTICO: está formado por varios tipos diferentes de células, principalmente linfocitos, que trabajan juntas para combatir una infección.




VASO LINFÁTICO: Son conductos delgados que transportan el líquido linfático a través del cuerpo.




GANGLIO LINFÁTICO: Se encuentran debajo de la axila, en la ingle, en el cuello, en el pecho y en el abdomen








## **MEDULA OSEA ROJA**



## **TIMO**









## **BAZO**

### **FUNCION-BAZO**

### Función:


- Almacén de sangre (autotransfusión 125 ml). Filtración de la sangre.
- Hemocateresis (destrucción de los eritrocitos y trombocitos dañados).
- ·Metabolismo del fierro.
- Linfopoyesis y activación de linfocitos. Presentación de antígenos e inicio de la respuesta inmune
- Producción de anticuerpos.
- •Eliminación de antígenos macromoleculares de la sangre





## **GANGLIO LINFATICO**

#### Ganglio linfático



Fuente: Pedro Francisco Valencia Mayoral, Jesús Ancer Rodríguez: Patología, www.accessmedicina.com

Derechos @ McGraw-Hill Education. Derechos Reservados.

## Funciones de los Ganglios linfáticos

Filtrar la linfa de sustancias extrañas, como bacterias y células cancerosas, y destruirlas.

Producir glóbulos blancos, como linfocitos, monocitos y células plasmáticas, encargados de destruir a las sustancias extrañas.

Cuando hay una infección en el organismo, los ganglios linfáticos aumentan su tamaño debido a la producción adicional de glóbulos blancos para hacer frente a la misma.



**SECONDARY 3ero** 

## **SISTEMA INMUNE**





### SISTEMA INMUNE


El conjunto de estructura biológicas (células y moléculas) responsables de la inmunidad.

### **INMUNIDAD**

Protección (defensa) frente a las enfermedades infecciosas y alteración de células propias.

### **RESPUESTA INMUNE**

Respuesta global y coordinada del Sistema Inmune ante un antígeno (Ag) o cuerpo extraño.



	INMUNIDAD INNATA O INESPECÍFICA	INMUNIDAD ADQUIRIDA O ADAPTATIVA O ESPECÍFICA
DEFINICIÓN	Mecanismos propios del organismo, con los cuales nace, o forma libremente, para protegerse antes de que ocurra la infección	Mecanismos producidos por el cuerpo al infectarse.
RESISTENCIA	No aumenta ante infecciones repetidas	Aumenta ante infecciones repetidas
ESPECIFICIDAD	No dirigida hacia agentes patógenos específicos	Respuesta dirigida por elementos específicos
FACTORES SOLUBLES	Lisozima, complemento, proteínas de fase aguda, interferón y citosinas.	Anticuerpos (Ac)
CÉLULAS	Leucocitos fagocitarios Linfocitos NK	Linfocitos T y B
BARRERAS QUÍMICAS Y FÍSICAS	Piel, epitelio mucoso, sustancias químicas antimicrobianas	Sistema mucoso, inmunológico y cutáneo, anticuerpos secretados

# INMUNIDAD INNATA O INESPECIFICA

### <u>Células</u> <u>fagociticas</u>

- Neutrófilos
- Eosinófilos
- Monocitos (macrófagos)
  - •Fagocitan microbios.
  - •Fagocitan complejos antígeno - anticuerpo.
  - Presentan antígenos.

### Complemento

Proteínas que

- Permiten al Opsonización.
- •Generan la Quimiotaxia.
- •Generan la Anafilaxia.

### Defensas del organismo frente a la infección: Mecanismos innatos

Nacemos con ellos. Actúan de manera no específica (contra cualquier patógeno).

Mecanismos innatos externos:	Barreras Físicas	-Piel, efecto barrera. La descamación evita que los microorganismos se asienten. Sólo los espirilos pueden atravesar las mucosas.
-Presentes en todos los organismos. -Tienden a evitar la entrada de los patógenos.	Barreras Químicas	-Moco, engloba partículas extrañas, engaña a los virusLágrimas y saliva, efecto de lavado, también contienen sustancias antimicrobianas.
	Flora autóctona	Las bacterias intestinales impiden que los patógenos se instalen.
Mecanismos innatos internos:	Células asesinas naturales (natural Killer).	Destruyen a células extrañas y a células infectadas o tumorales produciendo agujeros en ellas mediante <b>perforina</b> .
- Actúan cuando los patógenos ya han entrado	Interferón	Proteínas segregadas por células infectadas por virus que actúan sobre otras células haciéndolas producir sustancias que inhiben la replicación viral.
	Complemento	Complejos macromoleculares de proteínas que provocan la lisis de las células o atraen a los fagocitos.

## INMUNIDA ADQUIRIDA O ESPECIFICA

Mecanismos de defensa específicos a cargo de linfocitos T y B, encargados de la inmunidad celular y humoral

Linfocitos T	Linfocitos B
•T citotóxicos •T supresores	Forman células plasmáticas
•T auxiliares	Producen anticuerpos
	Destruyen células infectadas por microbios
Inmunidad mediada	Bloquean o inactivan toxinas o microbios
por células	Inmunidad mediada por anticuerpos

	Inmunidad humoral	Inmunidad celular	
Microbio	Microbios extracelulares	Microbios extracelulares  Microbios fagocitados que pueden vivior dentro de los macrófagos  Microbios intracelulares (p.ej., virus que se replican dentro de una célula infectada	
Linfocitos respondedores	Linfocito B	Linfocito T cooperador Linfocito T citotóxico	
Mecanismo efector	Anticuerpo secretado	Macrófago activado  Neutrófilo  Célula infectada muerta	
Funciones	Bloquea infecciones y elimina microbios extracelulares	Fagocitos activados matan a los microbios  Mata células infectadas y elimina reservorios de la infección	

<sup>\*</sup>En la inmunidad humoral, los linfocitos B secretan anticuerpos que evitan las infecciones y eliminan los microbios extracelulares.


<sup>\*</sup>En la inmunidad celular, los linfocitos T cooperadores activan los macrófagos para que maten a los microbios fagocitados, o los linfocitos T citotóxicos destruyen directamente las células infectadas.

## **INMUNIDAD CELULAR**

T (T4H)
Auxiliares
Activan
cel. T y B

T8 citotóxico Asesino mata cel. Infectadas

T8 supresor Suprimen la respuesta inmune específica



## **INMUNIDAD HUMORAL**


Invasión de patógenos

Linfocito B competente activado se divide y diferencia a

Cel. Plasmática

Cél. De memoria Inmunidad futura

Producen anticuerpos específicos



### **HELICO | THEORY**

### Ig M

Es el primer anticuerpo secretado en la reacción inmune.

### Ig G

Es el anticuerpo mas abundante en la sangre. Activa complemento. Protege al feto.

### Ig A

Es secretada desde la circulación a la saliva, lágrimas y moco.

### Ig E

anticuerpos de las alergias, de protección contra parásitos.

### Ig D

Anticuerpo que se halla unido a la superficie de linfocitos B. Función desconocida.





**SECONDARY 3ero** 

## **HELICOPRACTICA**





- 1. ¿Cuáles son los tipos de órganos linfoides?
- Son, la médula ósea roja, el timo, el bazo, los ganglios linfáticos.
- 2. ¿Qué linfocitos maduran en el timo y quiénes en la médula ósea roja?
- En el timo, los linfocitos tipo T, y en la MOR, los linfocitos tipo B.
- 3. ¿Cuáles son las hormonas producidas por el timo y sus funciones?
- Timosina, que permite la maduración de los linfocitos tipo T.
- 4. Mencione las funciones del bazo.
- Hemocateresis, almacén temporal de sangre, pone en contacto a los linfocitos tipo B con antígenos.
- 5. Mencione el nombre del monocito que se encuentra en
- a. Pulmones: Macrófago alveolar.
- b. Hígado: Célula de Kpuffer.
- c. Riñones: Célula Mesangial.
- d. Huesos: Osteoclasto.
- e. Tejido nervioso: Microglía.

- 6. ¿Cuál es la diferencia entre los linfocitos T8 citotóxico y supresor?
- El citotóxico ataca células infectadas, mientras que el supresor inhibe la respuesta inmune específica.
- 7. Un niño recién nacido por descuido de los padres fue picado por una araña, al ser transportado de emergencia por un proceso febril al hospital, el médico residente determinó inmediatamente la aplicación de un suero para prevenir complicaciones hemofílicas del veneno y además sugirió que la madre se quede con el niño para garantizar durante los 3 días de internado, la lactancia del menor, después de seis horas el niño presentó un leve cuadro de ictericia.

Analice este caso clínico y determine qué tipos de inmunidad se dieron.

- A) Activa natural y pasiva natural B) Pasiva artificial e innata
- C) Activa artificial y natural específica D) Pasiva artificial y natural
- E) Activa natural y artificial
- 8. Glóbulo blanco de segunda línea defensa
- A) Neutrófilo B) Eosinófilo C) Basófilo D) Monocito E) Linfocito