

ALGEBRA

Chapter 21

4th



FUNCIONES II: FUNCIONES
ESPECIALES

 **SACO OLIVEROS**

HELICO

MOTIVATING



APLICACIONES

El crecimiento de las ventas de un producto que ya a logrado un nicho de mercado , la variación poblacional de alguna universidad que ya lleva algunos años de funcionamiento, la clientela consolidada de un banco probablemente debe modelarse mediante una **función logarítmica**

HELICO THEORY


CHAPTER 21

FUNCIONES II

I) FUNCIÓN CONSTANTE

Es aquella función de la forma: $f(x) = k$ con $k \in \mathbb{R}$

Donde k es una **constante**, cuya gráfica es:



Donde:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$


$$\text{Ran}(f) = k$$

II) FUNCIÓN IDENTIDAD


Es aquella función de la forma:

$$f(x)=x$$

Cuya gráfica es:



$$y=-x$$



Donde:

$$\text{Dom}(f)=\mathbb{R}$$



$$\text{Ran}(f)=\mathbb{R}$$

III) FUNCIÓN LINEAL

HELICO | THEORY

Es aquella función de la forma: $f(x) = ax + b$

Cuya gráfica es:



Donde:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$


$$\text{Ran}(f) = \mathbb{R}$$

IV) FUNCIÓN VALOR ABSOLUTO

HELICO | THEORY

Es aquella función de la forma:
Cuya gráfica es:

$$y = |x - h| + k$$




$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

$$\text{Ran}(f) = [k; +\infty >$$

$$f(x) = \pm |x - h| + k$$

$$y = -|x - h| + k$$




$$\text{Ran}(f) = < -\infty; k]$$

v) FUNCIÓN RAÍZ CUADRADA

Es aquella función de la forma:
Cuya gráfica es:

$$f(x) = \sqrt{x}$$



$$y = \sqrt{x}$$

Donde:

$$\text{Dom}(f) = [0; +\infty >$$

$$\text{Ran}(f) = [0; +\infty >$$


VI) FUNCIÓN CUADRÁTICA

HELICO |
THEORY

Es aquella función de la forma:
Con $a \neq 0$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$


$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

LA PARÁBOLA



$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

$$\text{Ran}(f) = [k; +\infty)$$




$$\text{Ran}(f) = (-\infty; k]$$

Desplazamientos de gráficas


1) $y = (x + 5)^2 - 3$

→ $x = -5$ → $y = -3$



2) $y = |x - 4| + 2$
vértice del valor absoluto es:

$x - 4 = 0$ → $x = 4$ → $y = 2$



1) si $f(x) = x^2 - 6x + 13$

Podemos conocer su **rango** y **vértice** completando cuadrados

$$y = (x - 3)^2 + 4$$

Es una parábola hacia arriba



$$Ran(f) = [4; +\infty >$$



$$Vértice = (3; 4)$$

HELICO PRACTICE

CHAPTER 21

Si H representa la función identidad
 $H = \{(x+3; 2x-1), (y-2; 3y-6), (x; 2z-6)\}$ Calcule $x+y+z$

Resolución

$$x + 3 = 2x - 1$$

$$\Rightarrow 4 = x$$

$$y - 2 = 3y - 6$$

$$\Rightarrow 4 = 2y$$

$$\Rightarrow 2 = y$$

$$x = 2z - 6$$

$$\Rightarrow 4 = 2z - 6$$

$$\Rightarrow 5 = z$$

$$\Rightarrow x + y + z = 11$$

Siendo $F(4)+4F(7)+7F(3)=24$

Calcule: $F(2014)+3F(2015)$ Siendo F función constante

Resolución

F es constante: $F(x) = k$

$$F(4) = k \quad F(7) = k \quad F(3) = k$$

$$\Rightarrow 12k = 24 \Rightarrow k = 2$$

$$\begin{aligned} &F(2014) + 3F(2015) \\ \Rightarrow &k + 3k \\ \Rightarrow &8 \end{aligned}$$

Grafique la función:


$F(x)=|x-9|+12$ y Halle su rango.

Resolución

$$y = |x - 9| + 12$$

➡ $x=9$

➡ $y=12$



$$Ran(f) = [12; +\infty >$$

Grafique la función:

$P(x) = x^2 + 10x + 28$.Halle el vértice de la parábola y el rango de $P(x)$

Resolución


$$y = x^2 + 10x + 28$$

$$y = x^2 + 10x + 25 + 3$$

$$y = (x + 5)^2 + 3$$

El vértice de la parábola es:

$$x+5=0 \Rightarrow x=-5 \Rightarrow y=3$$



$$\text{Ran}(P) = [3; +\infty >$$

PROBLEMA 5

Si P es una función lineal en la cual se cumplen los siguientes valores:

x	2	7
y	7	32

Calcule $P(3)+P(2)$

Resolución

RECORDAR: FUNCIÓN LINEAL
FORMA : $P(x) = a x + b$

DEL CUADRO

$$I) P(2) = 2a + b$$

$$7 = 2a + b \dots\dots\dots (1)$$

$$II) P(7) = 7a + b$$

$$32 = 7a + b \dots\dots\dots (2)$$

de (1) y (2)

$$7 = 2a + \cancel{b} \dots\dots\dots (1)$$

$$32 = 7a + \cancel{b} \dots\dots\dots (2) \quad (-)$$

$$25 = 5a$$

$$a = 5$$

Remplazando en (1)

$$\Rightarrow 2a + b = 7$$

$$2(5) + b = 7 \quad \Rightarrow \quad b = -3$$

$$\Rightarrow P(x) = 5x - 3$$

$$\text{piden: } P(3) + P(2)$$

$$5(3) - 3 + 5(2) - 3$$

$$12 + 7 = 19$$

Rpta: 19

PROBLEMA 6

El costo de una licuadora es $5T$ soles, donde T está determinado por la suma de los valores enteros que toma el dominio de la función:

$$M(x) = \sqrt{12 - x} + \sqrt{x - 5}$$

¿Cuál es el costo de dicha licuadora?

Resolución

RECORDAR FUNCIÓN RAÍZ CUADRADA

$$M(x) = \sqrt{x}; \forall x \geq 0$$

→ $M(X) = \sqrt{12 - X} + \sqrt{X - 5}$

→ CALCULAMOS EL DOMINIO:

→ $12 - X \geq 0 \wedge X - 5 \geq 0$

→ $12 \geq X \wedge X \geq 5$

$5 \leq X \leq 12$

$x \in [5; 12]$

$Dom(M) = [5; 12]$

Calculando T:

$$T = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12$$

T=68

El costo de la licuadora es $5T$

$$5T = 5(68) = 340$$

Rpta=340 soles

Grafique la función:

$$F(x) = -|x - 4| + 3$$

Resolución

$$y = -|x - 4| + 3$$

Calculamos su vértice

$$\rightarrow x - 4 = 0$$

$$\rightarrow x = 4$$

REEMPLAZANDO

$$y = -|4 - 4| + 3$$



$$y = 3$$

$$(h;k) = (4, 3)$$

Recordar

$$y = -|x - h| + k$$

La Gráfica es



Grafique la función:


$$H(x) = \sqrt{x - 7} + 4$$

Y halle su rango

Resolución

Recordar

$$H(x) = \sqrt{x}; \forall x \geq 0$$



❖ **Dominio:**

$$x - 7 \geq 0$$

$$x \geq 7$$

$$\text{Dom}(H) = [7; +\infty >$$

Su gráfica:

❖ **Rango:**

$$\sqrt{x - 7} \geq 0$$

$$\sqrt{x - 7} + 4 \geq 4$$

(+4)

$$\text{Rango} = [4 + \infty >$$

