



TRIGONOMETRY

TOMO VII

2nd
SECONDARY

Feedback



 **SACO OLIVEROS**



PROBLEMA 1

Indique cuáles de los siguientes pares de ángulos son coterminales.

- I. 475° y -245°
- II. 180° y -170°
- III. 390° y 30°



Para dos ángulos coterminales cuyas medidas son x e y , se cumple:

$$x - y = 360^\circ n; n \in \mathbb{Z}$$

Resolución:

I. $475^\circ - (-245^\circ) = 475^\circ + 245^\circ = 720^\circ$

Si son ángulos coterminales

II. $180^\circ - (-170^\circ) = 180^\circ + 170^\circ = 350^\circ$

No son ángulos coterminales

III. $390^\circ - 30^\circ = 360^\circ$

Si son ángulos coterminales

I y III son coterminales



PROBLEMA 2

Si los ángulos ω y β son las medidas de dos ángulos coterminales, reduzca:

$$S = \frac{3\cos\omega}{2\cos\beta} + 2\tan\omega \cdot \cot\beta$$



Para dos ángulos coterminales cuyas medidas son θ y α se cumple:

$$R.T.(\theta) = R.T.(\alpha)$$

$$\tan x \cdot \cot x = 1$$

Resolución:

Como ω y β son coterminales, se cumple:

$$\cos\beta = \cos\omega$$

$$\cot\beta = \cot\omega$$

Reemplazando:

$$S = \frac{3\cancel{\cos\omega}}{2\cancel{\cos\omega}} + 2 \tan\omega \cdot \cot\omega$$

1


$$S = \frac{3}{2} + 2$$

$$S = \frac{7}{2}$$



PROBLEMA 3

Del gráfico:



Efectúe: $M = 4\sin^2 \alpha - \sec \alpha$

Resolución:

Del gráfico, α y 60° son las medidas de dos ángulos coterminales, por lo tanto:

$$\sin \alpha = \sin 60^\circ$$

$$\sec \alpha = \sec 60^\circ$$


Reemplazando:

$$M = 4 \sin^2 60 - \sec 60^\circ$$

$$M = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 - 2$$

$$M = 4 \left(\frac{3}{4} \right) - 2$$

$$M = 1$$






PROBLEMA 5

Reducir:

$$K = 5\operatorname{sen}(90^\circ + x) - 2\cos(180^\circ + x)$$

RECORDA

R



$$RT\left(\frac{180^\circ}{360^\circ} \pm \alpha\right) = \pm RT(\alpha)$$

$$RT\left(\frac{90^\circ}{270^\circ} \pm \alpha\right) = \pm CO - RT(\alpha)$$

Resolución:

$$K = 5 \underbrace{\operatorname{sen}(90^\circ + x)}_{IIC} - 2 \underbrace{\cos(180^\circ + x)}_{IIC}$$

$$K = 5 \cdot (\cos x) - 2 (-\cos x)$$

$$K = 5\cos x + 2\cos x$$

$$K = 7\cos x$$






PROBLEMA 6

Reducir:

$$P = \frac{\tan(180^\circ + x) \cdot \sec(90^\circ + x)}{\tan x \cdot \csc(360^\circ - x)}$$

RECORDAR



$$RT(180^\circ \pm \alpha) = \pm RT(\alpha)$$

$$RT(90^\circ \pm \alpha) = \pm CO - RT(\alpha)$$

Resolución:

$$P = \frac{\overbrace{\tan(180^\circ + x)}^{IIC} \cdot \overbrace{\sec(90^\circ + x)}^{IIC}}{\underbrace{\tan x \cdot \csc(360^\circ - x)}_{IVC}}$$

$$P = \frac{(\cancel{\tan x}) (\cancel{-\csc x})}{(\cancel{\tan x}) (\cancel{-\csc x})}$$

$$P = 1$$






PROBLEMA 7

Calcular:

$$D = \frac{\tan 225^\circ}{\sen 330^\circ}$$

RECORDAR



$$RT(180^\circ \pm \alpha) = \pm RT(\alpha)$$

Resolución:

$$\tan 225^\circ = \tan(180^\circ + 45^\circ)$$

IIC

$$\tan 225^\circ = \tan 45^\circ$$

$$\sen 330^\circ = \sen(360^\circ - 30^\circ)$$

IVC

$$\sen 330^\circ = -\sen 30^\circ$$

Reemplazando:

$$D = \frac{\tan 45^\circ}{-\sen 30^\circ}$$

$$D = \frac{1}{-\frac{1}{2}}$$

$$D = -2$$




PROBLEMA 8

Calcular:

$$L = \frac{\cos 233^\circ \cdot \csc^2 120^\circ}{\tan 315^\circ}$$

RECORDAR



$$RT\left(\frac{180^\circ}{360^\circ} \pm \alpha\right) = \pm RT(\alpha)$$

Resolución:

$$L = \frac{\overbrace{\cos(180^\circ + 53^\circ)}^{\text{IIC}} \cdot \overbrace{\csc^2(180^\circ - 60^\circ)}^{\text{IIC}}}{\underbrace{\tan(360^\circ - 45^\circ)}_{\text{IVC}}}$$

$$L = \frac{(\swarrow \cos 53^\circ) (\csc^2 60^\circ)}{(\swarrow \tan 45^\circ)}$$

$$L = \frac{\left(\frac{3}{5}\right) \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2}{(1)}$$

$$L = \left(\frac{3}{5}\right) \left(\frac{4}{3}\right)$$

$$L = \frac{4}{5}$$






PROBLEMA 9

Calcular:

$$M = \cos 20^\circ + \cos 80^\circ + \cos 100^\circ + \cos 160^\circ$$

RECORDAR



$$RT\left(\frac{180^\circ}{360^\circ} \pm \alpha\right) = \pm RT(\alpha)$$

Resolución:

$$M = \cos 20^\circ + \cos 80^\circ + \cos 100^\circ + \cos 160^\circ$$


$$\cos 100^\circ = \cos(\underbrace{180^\circ - 80^\circ}_{\text{IIC}}) = -\cos 80^\circ$$

$$\cos 160^\circ = \cos(\underbrace{180^\circ - 20^\circ}_{\text{IIC}}) = -\cos 20^\circ$$

Reemplazando:

$$M = \cancel{\cos 20^\circ} + \cancel{\cos 80^\circ} + \cancel{(-\cos 80^\circ)} + \cancel{(-\cos 20^\circ)}$$

$$M = 0$$






PROBLEMA 10

El gasto diario de Luis en pasajes es “B” soles. ¿Cuál será el gasto total a la semana?

$$B = 5\sin 143^\circ - \sqrt{3} \cdot \cot 300^\circ$$

RECORDAR



$$RT\left(\frac{180^\circ}{360^\circ} \pm \alpha\right) = \pm RT(\alpha)$$

Resolución:

Resolvemos:

$$B = 5\sin 143^\circ - \sqrt{3} \cdot \cot 300^\circ$$

$$\sin 143^\circ = \sin(\underbrace{180^\circ - 37^\circ}_{\text{IIC}}) = +\sin 37^\circ$$

$$\cot 300^\circ = \cot(\underbrace{360^\circ - 60^\circ}_{\text{IVC}}) = -\cot 60^\circ$$

Reemplazamos $B = 5\sin 37^\circ - \sqrt{3} \cdot (-\cot 60^\circ)$:

$$B = 5\left(\frac{3}{5}\right) - \sqrt{3} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \Rightarrow \boxed{B = 4}$$

∴ Luis gasta 28 soles a la semana