



ARITHMETIC

TOMO 8

5th
SECONDARY

RETROALIMENTACIÓN



 **SACO OLIVEROS**



1.

Halle el valor de la moda, mediana y media en: 06; 14; 14; 06; 15; 17; 06; 14; 12; 18. Dar la suma de los

Resultados

Del dato tenemos:

✱ Media: $\bar{x} = \frac{3(06) + 12 + 3(14) + 15 + 17 + 18}{10} = \frac{122}{10}$ $\boxed{\bar{x} = 12,2}$

✱ Mediana: ordenamos los datos N° datos par

06; 06; 06; 12; 14; 14; 14; 15; 17; 18. \Rightarrow $Me = \frac{14 + 14}{2}$ $\boxed{Me = 14}$

✱ Moda: dato de mayor frecuencia

06; 06; 06; 12; 14; 14; 14; 15; 17; 18. (*bimodal*) \Rightarrow $\boxed{Mo = 06 \text{ y } 14}$

$\therefore \bar{x} + Me + Mo = 40,2 \text{ y } 32,2$



2.

Del siguiente cuadro.
Calcule la media (\bar{x}) y
la mediana.

x_i	f_i	F_i	h_i	$x_i \cdot f_i$
4	6	6		24
5	8	14	0,16	40
6	7	21		42
7	14	35		98
8	15	50		120
$n = 50$				324

Me



Resolución

Del dato tenemos:

$$\ast 0,16 = \frac{8}{n} = \frac{16^2}{100} \rightarrow [n = 50]$$

$$\ast \text{Media: } \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i f_i}{n} = \frac{324}{50}$$

$$\therefore \bar{x} = 6,48$$

\ast Mediana:


depende de $50/2$ inmediato superior es 35

$$\therefore Me = 7$$



3.

En el gráfico siguiente, Calcule la moda.



Resolución

n

Moda (Mo)

$$\Rightarrow \frac{Mo - 8}{40 - 20} = \frac{12 - Mo}{40 - 16}$$

simplificamos

$$6 \cdot Mo - 48 = 60 - 5 \cdot Mo$$

$$\Rightarrow 11 \cdot Mo = 108$$

valor de la moda

$$\therefore Mo = 9,81$$

9,81




4.

¿Cuántas palabras con sentido o no se pueden formar con todas las letras de la palabra AMARRADA?

Resolución

Del dato :



aplicamos permutación con repetición

$$P_{n_1, n_2, n_3, \dots, n_k}^n = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot n_3! \cdot \dots \cdot n_k!}$$

$$P.R \begin{matrix} 8 \\ (4; 2; 1; 1) \end{matrix} = \frac{8!}{4! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!}$$

$$\frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cancel{4!}}{\cancel{4!} \cdot 2} = 56 \cdot 15$$

Nº palabras con sentido o no

∴ 840
palabras



5.


Rubén y su enamorada van al cine, acompañados de 6 amigos y encuentran una fila de 8 butacas. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar si Rubén y su enamorada siempre se sientan juntos?

Resolución

Del dato:

Un bloque

8 butacas



1 pareja + 6 amigos = 7 elementos

aplicando permutación
lineal $7! = 5040$

N° de maneras diferentes

Total = $5040 \times 2!$

$\therefore 10080$

1080 maneras




6.

A una reunión de amigos acuden 6 parejas de esposos. ¿De cuántas maneras pueden sentarse alrededor de una mesa redonda de modo que los esposos siempre se sienten juntos?

Resolución

Del dato:

6 parejas de esposos
(se sientan juntas)



Permutación circular

$$Pc_{(6)} = (6 - 1)!$$

$$Pc_{(6)} = 5! = 120$$

como son 5
parejas

$$120 \times 2! \times 2! \times 2! \times 2! \times 2! \times 2!$$

número de maneras

7680



7. En una reunión hay 10 hombres y 6 mujeres, se desea formar grupos de 3 personas. ¿De cuántas maneras podrán hacerlo si deben de haber, por lo menos, 2 mujeres en el grupo?

Resolución

como no interesa el orden
aplicamos combinaciones

Del dato tenemos:
al menos dos mujeres

$$\begin{array}{c} \text{⌘} \\ C_2^6 \times C_1^{10} \\ \hline \frac{6!}{(6-2)! \cdot 2!} \times \frac{10!}{(10-1)! \cdot 1!} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{3} \\ \cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4!} \\ \hline \cancel{2} \cdot \cancel{4!} \end{array} \times \begin{array}{c} \cancel{10} \cdot \cancel{9!} \\ \hline 1 \cdot \cancel{9!} \end{array} = 150$$

$$\begin{array}{c} \text{⌘} \text{ además: } C_3^6 \times C_0^{10} \\ \hline \frac{6!}{(6-3)! \cdot 3!} \times \frac{10!}{(10-0)! \cdot 0!} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3!} \\ \hline \cancel{3!} \cdot \cancel{3!} \end{array} \times \begin{array}{c} \cancel{10!} \\ \hline 1 \cdot \cancel{10!} \end{array} = 20$$

número de maneras

$$150 + 20 = 170$$

170



8.

Se lanzan dos dados simultáneamente. ¿Cuál es la probabilidad que la suma de resultados de sus caras superiores sea 5?

Resolución

Nº casos posibles $n(\Omega)$

Dado 1 Dado 2

1 1
2 2
· ·
· ·
· ·
6 6

6 \times 6 = $n(\Omega)$

$n(\Omega) = 36$

Del dato tenemos:

Dado 1 + Dado 2 = 5

Nº casos favorables n

(A)

Dado 1 Dado 2

1 + 4

2 + 3

3 + 2

4 + 1



$n(A) = 4$

sabemos:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

Reemplazamos:

$$P(A) = \frac{4}{36}$$

$$\therefore P(A) = \frac{1}{9}$$

$$P(A) = \frac{1}{9}$$



9.

De todos los números de dos cifras se escoge uno al azar.
¿Cuál es la probabilidad de que este número sea capicúa?

Resolución

Nº casos posibles: $n(\Omega)$

$$\Omega = \{10; 11; 12; \dots; 99\}$$



$$n(\Omega) = 99 - 9$$

$$n(\Omega) = 90$$

Del
dato:

Evento A: resulte capicúa

Nº casos favorables: $n(A)$

$$A = \{11; 22; 33; \dots; 99\}$$



$$n(A) = 9$$

sabemos:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

Reemplazamos:

$$P(A) = \frac{9}{90}$$

Piden:

$$\therefore P(A) = \frac{1}{10}$$

$$\boxed{1/10}$$



10.

De una baraja de 52 cartas se extraen 2 al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esas cartas sean no menores a 10?

Resolución

Nº casos posibles: $n(\Omega)$

De una baraja de 52 cartas se extraen 2

$$n(\Omega) = C_2^5 = \frac{52!}{(52-2)! 2!}$$

$$n(\Omega) = \frac{\overset{26}{\cancel{52}} \cdot 51 \cdot \cancel{50!}}{\cancel{50!} \cdot \cancel{2}}$$

$$n(\Omega) = 26 \cdot 51$$

$$\Rightarrow n(\Omega) = 1326$$

Del dato tenemos:

Evento A: resultan no menores a 10

Nº casos favorables: $n(A)$

$$A = \{ \underbrace{10; 11; 12; 13}_{\text{cada uno 4 veces}} \} \Rightarrow 4 \cdot 4 = 16 \text{ casos}$$

$$n(A) = C_2^{16} = \frac{16!}{14! 2!} = \frac{\overset{8}{\cancel{16}} \cdot 15 \cdot \cancel{14!}}{\cancel{14!} \cdot \cancel{2}} = 120$$

$$P(A) = \frac{120}{1326} \quad \therefore P(A) = \frac{20}{221}$$

20/221