



TRIGONOMETRY

Chapter 22

5th
SECONDARY

**FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS
INVERSAS**




SACO OLIVEROS



En el diseño de las carreteras y los ferrocarriles, las curvas tienen un peralte (inclinación) para producir una fuerza centrípeta que proporcione seguridad. El ángulo θ optimo, se calcula así:

$$\theta = \arctan\left(\frac{V^2}{R \cdot g}\right)$$

Donde V es la velocidad promedio del vehículo, R es el radio de la curva y g la aceleración de la gravedad.



Pregunta:

Calcule el ángulo θ del peralte, para una velocidad promedio de 20 m/s , radio de la curva de 120 m y $g = 10 \text{ m/s}^2$



Rpta:

18°30'



FUNCIONES TRIGONOMÉTRICA INVERSAS

Notación: **Se lee:**

$\arcsen(x)$ arcoseno de x

$\arccos(x)$ arcocoseno de x

$\arctan(x)$ arcotangente de x

$\text{arccot}(x)$ arcocotangente de x

$\text{arcsec}(x)$ arcosecante de x

$\text{arccsc}(x)$ arcocosecante de x

PROPIEDAD FUNDAMENTAL

$$FT(\theta) = N \Leftrightarrow \theta = \text{arcFT}(N)$$

Ejemplos:

- Si : $\text{sen}\alpha = \frac{1}{3} \Rightarrow \alpha = \arcsen\left(\frac{1}{3}\right)$
- Si : $\cos\beta = \frac{2}{5} \Rightarrow \beta = \arccos\left(\frac{2}{5}\right)$
- Si : $\tan\theta = 1 \Rightarrow \theta = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$





Ejemplos:

- $\alpha = \arcsen\left(\frac{3}{4}\right) \Rightarrow \text{sen}\alpha = \frac{3}{4}$
- $\beta = \arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right) \Rightarrow \tan\beta = \frac{\sqrt{2}}{3}$
- $\theta = \arcsen\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \text{sen}\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$
- $\phi = \arctan(\sqrt{3}) \Rightarrow \tan\phi = \sqrt{3} \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{3}$

Propiedad 1:

$$\arcsen(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2} ; x \in [-1;1]$$

$$\arctan(x) + \text{arccot}(x) = \frac{\pi}{2} ; x \in \mathbb{R}$$

$$\text{arcsec}(x) + \text{arccsc}(x) = \frac{\pi}{2} ; x \in \mathbb{R} - \langle -1;1 \rangle$$


Ejemplos:

- $\arcsen\left(\frac{1}{3}\right) + \arccos\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\pi}{2}$
- $\arctan(4) + \text{arccot}(4) = \frac{\pi}{2}$






1. Función Arcoseno:



- **Dominio:** $-1 \leq x \leq 1$
- **Rango:** $-\frac{\pi}{2} \leq \arcsen(x) \leq \frac{\pi}{2}$

2. Función Arcocoseno:



- **Dominio:** $-1 \leq x \leq 1$
- **Rango:** $0 \leq \arccos(x) \leq \pi$



1. Escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda

a. $\arcsen\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$ () b. $\arcsen\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$ ()



c. $\arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$ ()

Resolución:

a. $\arcsen\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \sen\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (V)

b. $\arcsen\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \sen\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ (V)

c. $\arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ (V)





2. Halle el valor de: $M = \arctan(1) + \arcsen\left(\frac{1}{2}\right)$

Resolución:

$$M = \underbrace{\arctan(1)}_{\alpha} + \underbrace{\arcsen\left(\frac{1}{2}\right)}_{\theta}$$

• $\alpha = \arctan(1) \Rightarrow \tan \alpha = 1 \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$

• $\theta = \arcsen\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \sen \theta = \frac{1}{2} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$

Luego:

$$M = \alpha + \theta = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore M = \frac{5\pi}{12}$$





3. Halle el valor de: $T = \sin \left[\arccos \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right] + \cos [\arctan(1)]$

Resolución:

$$T = \sin \left[\underbrace{\arccos \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)}_{\alpha} \right] + \cos \left[\underbrace{\arctan(1)}_{\theta} \right]$$

$$\bullet \alpha = \arccos \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$$

$$\bullet \theta = \arctan(1) \Rightarrow \tan \theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

Piden: $T = \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{4} \right)$



$$T = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \therefore \boxed{T = \sqrt{2}}$$





4. Halle el valor de: $E = \sqrt{13} \operatorname{sen}[\arctan(\frac{2}{3})] + \sqrt{5} \cos[\arctan(2)]$

Resolución: $E = \sqrt{13} \operatorname{sen}[\underbrace{\arctan(\frac{2}{3})}_{\alpha}] + \sqrt{5} \cos[\underbrace{\arctan(2)}_{\theta}]$



Reemplazando:

$$E = \sqrt{13} \operatorname{sen}(\alpha) + \sqrt{5} \cos(\theta) \Rightarrow E = \cancel{\sqrt{13}} \left(\frac{2}{\cancel{\sqrt{13}}} \right) + \cancel{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{\cancel{\sqrt{5}}} \right) \quad \therefore \boxed{E = 3}$$






5. Halle el valor de: $P = \tan\left[\frac{\pi}{4} + \arcsen\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)\right]$

Resolución:

$$P = \tan\left[\frac{\pi}{4} + \underbrace{\arcsen\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)}_{\alpha}\right]$$



Piden:

$$P = \tan[45^\circ + \alpha]$$

$$P = \frac{\tan 45^\circ + \tan \alpha}{1 - \tan 45^\circ \cdot \tan \alpha} = \frac{1 + \frac{1}{3}}{1 - 1 \cdot \frac{1}{3}}$$

$$P = \left[\frac{\cancel{\frac{4}{3}}}{\cancel{\frac{2}{3}}} \right] = \frac{4}{2}$$


$$\therefore \boxed{P = 2}$$



6. Halle el valor de: $T = \text{sen}[2\arctan(\frac{2}{5})]$

Resolución:

$$T = \text{sen}[\underbrace{2\arctan(\frac{2}{5})}_{\alpha}]$$



Piden:

$$T = \text{sen}[2\alpha]$$

$$T = 2\text{sen}\alpha\cos\alpha$$

$$T = 2 \left(\frac{2}{\sqrt{29}} \right) \left(\frac{5}{\sqrt{29}} \right)$$

$$T = \frac{20}{29}$$

\therefore

$$T = \frac{20}{29}$$





7. Halle el valor de x de la siguiente igualdad :

$$3\arcsen x + 2\arccos x = \frac{7\pi}{6}$$

Resolución:

$$3\arcsen x + 2\arccos x = \frac{7\pi}{6}$$

$$\arcsen x + 2(\arcsen x + \arccos x) = \frac{7\pi}{6}$$

$$\arcsen x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \arcsen x + \pi = \frac{7\pi}{6}$$

$$\Rightarrow \arcsen x = \frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow x = \sen\left(\frac{\pi}{6}\right)$$


$$\Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = \frac{1}{2}$$





8.




Un arqueólogo descubrió un santuario de una determinada cultura, tal como se muestra la figura.

Para lo cual le pide a un matemático hallar el dominio de la función que representa la pared lateral : $f(x) = \arcsen(x+2)$

¿Cuál es el dominio de la función?

Resolución:



Dominio:

$$-1 \leq x \leq 1$$

El dominio de $f(x) = \arcsen(x + 2)$; cumple:

$$\begin{aligned} -1 &\leq x + 2 \leq 1 \\ -3 &\leq x \leq -1 \end{aligned} \quad \begin{matrix} \text{purple arrow} \\ (-2) \end{matrix}$$

∴

$$\text{Dom } f = [-3; -1]$$

