

ALGEBRA

Chapters 1, 2, 3

4th
SECONDARY

Asesoría



 **SACO OLIVEROS**

PROBLEMA 1

Al evaluar $Q(3)$ sabiendo que :

$$P(x) = 4x - 5$$

$$P(Q(x)) = 8x + 3$$

el resultado indica el número de cuadernos que Martín necesita para iniciar sus clases.

¿Cuántos cuadernos necesitará?

Resolución :



Por dato, sabemos que :

$$P(x) = 4x - 5$$

Cambio de variable x por $Q(x)$, es decir :

$$\underbrace{P(x) = P(Q(x))}_{\text{cambio de variable}} \rightarrow x = Q(x)$$

$$\rightarrow P(x) = 4x - 5$$

$$\underbrace{P(Q(x))}_{\text{cambio de variable}} = 4Q(x) - 5$$

$$8x + 3 = 4Q(x) - 5$$

$$\frac{8x + 8}{4} = Q(x) \rightarrow \boxed{Q(x) = 2x + 2}$$

evaluando $Q(3)$ en $Q(x) = 2x + 2$

$$Q(3) = 2(3) + 2$$

$$\boxed{Q(3) = 8}$$

∴ Necesitará 8 cuadernos

PROBLEMA 2

$$(\quad) = 6x^{m-3} + 3x^{m-n} + 4x^{2n-p} + x^{p+q-1}$$

Resolución : Del polinomio, tenemos:

$$M(x) = 6x^{m-3} + 3x^{m-n} + 4x^{2n-p} + x^{p+q-1}$$

$$m-3=0 \rightarrow m=3$$

$$m-n=1 \rightarrow n=2$$

$$2n-p=2 \rightarrow p=2$$

$$p+q-1=3 \rightarrow q=2$$

$$\text{Calcular } mnpq = (3)(2)(2)(2)$$

$$\therefore mnpq = 24 \quad \text{Rpta}$$

Los grados de sus términos deben estar ordenados desde cero hasta el mayor de ellos de forma consecutiva.



Problema 3 Del siguiente polinomio idéntico:
 $8x + 27 \equiv a(x + 4) + b(2x + 3)$; determine el valor de $a + b$.

Resolución

$$8x + 27 \equiv a(x + 4) + b(2x + 3)$$

$$8x + 27 \equiv ax + 4a + 2bx + 3b$$

$$8x + 27 \equiv (a + 2b)x + (4a + 3b)$$

Entonces:

$$\begin{cases} a + 2b = 8 \dots (\alpha) \\ 4a + 3b = 27 \dots (\beta) \end{cases}$$

$$\begin{array}{rcl} 4.(\alpha): 4a + 8b = 32 & \downarrow & (-) \\ 1.(\beta): 4a + 3b = 27 & & \\ \hline & 5b = 5 & \\ & b = 1 & \\ & a = 6 & \end{array}$$

$$\therefore a + b = 7$$

Rpta: 7

PROBLEMA 4

Si $a + b + c = 10$

$$a^2 + b^2 + c^2 = 55$$

Obtenga el valor de

$$E = (a + b)^2 + (a + c)^2 + (b + c)^2$$

Resolución :

Desarrollo del Binomio al Cuadrado

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Trinomio al cuadrado

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$$



$$E = \underbrace{(a + b)^2} + \underbrace{(a + c)^2} + \underbrace{(b + c)^2}$$

Desarrollando:

$$E = a^2 + 2ab + b^2 + a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + 2bc + c^2$$

$$E = \underbrace{a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)} + a^2 + b^2 + c^2$$

$$E = \underbrace{(a + b + c)^2} + a^2 + b^2 + c^2$$

Reemplazando:

$$E = (10)^2 + 55$$

$$\therefore E = 155$$

Rpta

PROBLEMA 5

$$\text{Si } p = \sqrt{3} + 1$$

$$q = \sqrt{3} - 1$$

$$\text{Efectúe } R = p^4 + q^4$$

Resolución :



Desarrollo del Binomio al Cuadrado

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Por el dato $p = \sqrt{3} + 1$ y $q = \sqrt{3} - 1$

$$p + q = \sqrt{3} + 1 + \sqrt{3} - 1$$

$$\rightarrow p + q = 2\sqrt{3}$$

$$\bullet (p + q)^2 = (2\sqrt{3})^2$$

$$p^2 + 2pq + q^2 = 12$$

$$p^2 + q^2 = 8$$

$$\bullet (p^2 + q^2)^2 = (8)^2$$

$$p^4 + 2(p^2q^2) + q^4 = 64$$

$$\therefore p^4 + q^4 = 56$$

Rpta

$$pq = (\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) = 2$$

$$pq = 2 \rightarrow (pq)^2 = 2^2 = 4$$

PROBLEMA 6

Simplifique

$$M = (x - 4)(x - 7)(x + 3)(x + 6) - (x^2 - x - 27)^2$$

Resolución :




Equivalencia de Steven

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$M = (x - 4)(x - 7)(x + 3)(x + 6) - (x^2 - x - 27)^2$$

$$M = (x - 4)(x - 7)(x + 3)(x + 6) - (x^2 - x - 27)^2$$

$$M = (\underbrace{x^2 - x - 12})(\underbrace{x^2 - x - 42}) - (\underbrace{x^2 - x - 27})^2$$



$$x^2 - x = m$$

Reemplazando

$$M = (\underbrace{m - 12})(\underbrace{m - 42}) - (m - 27)^2$$

$$M = m^2 - 54m + 504 - (m^2 - 54m + 729)$$

$$M = m^2 - 54m + 504 - m^2 + 54m - 729$$

$$\therefore M = -225$$

Rpta

PROBLEMA 7

Si $a = \sqrt{7} - \sqrt{3}$

$b = \sqrt{3} - 5$

$c = 5 - \sqrt{7}$

Reduzca $M = \frac{(a^3 + b^3 + c^3)(a^2 + b^2 + c^2)}{6abc(ab + bc + ac)}$

Resolución :

$$\left. \begin{array}{l} a = \sqrt{7} - \sqrt{3} \\ b = \sqrt{3} - 5 \\ c = 5 - \sqrt{7} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Sumando} \\ (+) \end{array}$$

$$a + b + c = 0$$



Si $a + b + c = 0$

$\rightarrow a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$

$\rightarrow a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + bc + ac)$

$$M = \frac{(a^3 + b^3 + c^3)(a^2 + b^2 + c^2)}{6abc(ab + bc + ac)}$$

$$M = \frac{(3abc) \cdot -2(ab + bc + ac)}{6abc(ab + bc + ac)}$$

$$M = \frac{-6}{6}$$

$\therefore M = -1$ **Rpta**

PROBLEMA 8

Si $m + n + p = 6$

$(m + n)(n + p)(m + p) = 42$

Efectúe $H = m^3 + n^3 + p^3$

Resolución :

Recordar

$$(m + n + p)^3 = m^3 + n^3 + p^3 + 3(m + n)(n + p)(m + p)$$



Por dato, sabemos que :

$$m + n + p = 6$$

Elevando al cubo

$$(m + n + p)^3 = (6)^3$$

$$m^3 + n^3 + p^3 + \underbrace{3(m + n)(n + p)(m + p)}_{= 126} = 216$$

Reemplazamos

$$m^3 + n^3 + p^3 + 3(42) = 216$$

$$m^3 + n^3 + p^3 = 216 - 126$$

$$\therefore m^3 + n^3 + p^3 = 90 \quad \text{Rpta}$$

PROBLEMA 9

Si

$$a = \sqrt{5} - \sqrt{3}$$

$$b = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

$$c = \sqrt{2} - \sqrt{5}$$

Determine el valor de

$$N = \frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ac} + \frac{c^2}{ab}$$

Resolución :

Sumando a, b y c

$$a + b + c = 0$$

Homogeneizando en N

$$N = \frac{a^3}{abc} + \frac{b^3}{abc} + \frac{c^3}{abc}$$

$$N = \frac{a^3 + b^3 + c^3}{abc}$$

Recordar las Identidades Condicionales

Si $a + b + c = 0$

Se cumple que: $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$

$$a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + ac + bc)$$

Aplicando Identidades Condicionales

$$N = \frac{\cancel{3(abc)}}{\cancel{abc}}$$

$$N = 3$$

Rpta: 3

PROBLEMA 10

Calcular

$$T = \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2 + (\sqrt{5} - \sqrt{3})^2}{(\sqrt{2} + 1)^2 + (\sqrt{2} - 1)^2}$$

Resolución :

Aplicando la Identidad de Legendre en T

$$T = \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2 + (\sqrt{5} - \sqrt{3})^2}{(\sqrt{2} + 1)^2 + (\sqrt{2} - 1)^2}$$

$$T = \frac{\cancel{2}(\cancel{\sqrt{5}}^2 + \cancel{\sqrt{3}}^2)}{\cancel{2}(\cancel{\sqrt{2}}^2 + 1^2)}$$

$$T = \frac{8}{3}$$

Recordar las Identidades de Legendre

$$\begin{aligned}(a + b)^2 + (a - b)^2 &= 2(a^2 + b^2) \\ (a + b)^2 - (a - b)^2 &= 4ab\end{aligned}$$

Rpta:

$$\frac{8}{3}$$

GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!

El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información
Albert Einstein